

**OCENA PRESJI I POŁOWÓW WĘDKARSKICH W WODACH
UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG MAZOWIECKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
W 2017 ROKU**

Autorzy:

dr inż. Hanna Draszkiewicz-Mioduszevska

prof. dr hab. Arkadiusz Wołos

Zakład Bioekonomiki Rybactwa

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

WPROWADZENIE	4
I. DANE OGÓLNE	7
1. ODŁOWY CAŁKOWITE – WYNIKI WĘDKARZY MAZOWIECKIEGO OKRĘGU PZW (TABELA NR I)	7
II. ŁOWISKA WĘDKARSKIE	7
1. OBWODY RYBACKIE.....	7
1.1. <i>Obwód rybacki Narew Nr 7 (Tabela nr 1, Rys. 1)</i>	7
1.2. <i>Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5 (Tabela nr 2, Rys. 2)</i>	8
1.3. <i>Obwód rybacki Narew Nr 6 (Tabela nr 3, Rys. 3)</i>	8
1.4. <i>Obwód rybacki Wisła Nr 4 (Tabela nr 4, Rys. 4)</i>	9
1.5. <i>Obwód rybacki Narew Nr 8 (Tabela nr 5, Rys. 5)</i>	10
1.6. <i>Obwód rybacki Wisła Nr 3 (Tabela nr 6, Rys. 6)</i>	10
1.7. <i>Obwód rybacki Bug Nr 5 (Tabela nr 7, Rys. 7)</i>	10
1.8. <i>Obwód rybacki Skrwa Prawa Nr 1 (Tabela nr 8, Rys. 8)</i>	11
1.9. <i>Obwód rybacki Elk Nr 45 (Tabela nr 13, Rys. 9)</i>	11
1.10. <i>Obwód rybacki Rozoga Nr 1 (Tabela nr 14, Rys. 10)</i>	12
1.11. <i>Obwód rybacki Orzyc Nr 1 (Tabela nr 15, Rys. 11)</i>	12
1.12. <i>Obwód rybacki Jezioro Nr 1 (Tabela nr 21, Rys. 12)</i>	12
1.13. <i>Obwód rybacki Brok Nr 1 (Tabela nr 22, Rys. 13)</i>	13
1.14. <i>Obwód rybacki Biebrza Nr 3 (Wissa) (Tabela nr 26, Rys. 14)</i>	13
1.15. <i>Obwód rybacki Omulew Nr 1 (Tabela nr 28, Rys. 15)</i>	13
1.16. <i>Obwód rybacki Nurzec Nr 1 (Tabela nr 33, Rys. 16)</i>	14
1.17. <i>Obwód rybacki Rządza Nr 1 (Tabela nr 37, Rys. 17)</i>	14
1.18. <i>Obwód rybacki Utrata Nr 1 (Tabela nr 44, Rys. 18)</i>	14
1.19. <i>Obwód rybacki Orz Nr 1 (Tabela nr 49, Rys. 19)</i>	15
1.20. <i>Obwód rybacki Świder Nr 1 (Tabela nr 53, Rys. 20)</i>	15
1.21. <i>Obwód rybacki Zgłowiączka Nr 2 (Tabela nr 54)</i>	15
1.22. <i>Obwód rybacki Bzura Nr 1 (Tabela nr 82)</i>	16
1.23. <i>Obwód rybacki Jegrznia Nr 11 (Tabela nr 113)</i>	16
1.24. <i>Obwód rybacki Szkwa Nr 1 (Tabela nr 119)</i>	16
2. JEZIORA ZAKŁADU RYBACKIEGO JANOWO	16
2.1. <i>Jezioro Sasek Wielki (Kobylocha) (Tabela nr 10, Rys. 21)</i>	16
2.2. <i>Jezioro Wałpusz (Tabela nr 19, Rys. 22)</i>	17
2.3. <i>Jezioro Sasek Mały (Tabela nr 24)</i>	17
2.4. <i>Jezioro Klimek (Konik) (Tabela nr 29)</i>	17
2.5. <i>Jezioro Malszewskie (Tabela nr 30)</i>	18
2.6. <i>Jezioro Brajnickie (Tabela nr 35)</i>	18
2.7. <i>Jezioro Grom (Tabela nr 45)</i>	18
2.8. <i>Staw Jedwabne (Tabela nr 48, Rys. 23)</i>	19
2.9. <i>Pozostałe jeziora Zakładu Rybackiego Janowo</i>	19
3. INNE ŁOWISKA	20
3.1. <i>Glinianki Zielonka (Tabela nr 9, Rys. 24)</i>	20

3.2. Jezioro Toczyłowo (Tabela nr 11).....	20
3.3. Glinianki Grodzisk (Tabela nr 12, Rys. 25)	21
3.4. Staw Krzywie (Tabela nr 16, Rys. 26).....	21
3.5. Jezioro Ługowskie (Tabela nr 17).....	21
3.6. Jezioro Zdvorskie (Tabela nr 18)	22
3.7. Glinianki Błonie (Tabela nr 20, Rys. 27)	22
3.8. Jezioro Białe (Tabela nr 23, Rys. 28).....	22
3.9. Jezioro Ostrowąs (Plebanka) (Tabela nr 25, Rys. 29)	23
3.10. Stawy w Parku Pruszków (Tabela nr 27, Rys. 30).....	23
3.11. Jezioro Przytomne (Tabela nr 31).....	23
3.12. Jezioro Wikaryjskie (Tabela nr 32).....	24
3.13. Stawy Talar i Montoprzem (Tabela nr 34).....	24
3.14. Jezioro Pomocnia (Tabela nr 36, Rys. 31).....	24
3.15. Zbiornik Chorzele (Tabela nr 38, Rys. 32).....	25
3.16. Jeziórko Moczydło (Tabela nr 39, Rys. 33).....	25
3.17. Jezioro Grójeckie (Tabela nr 40)	25
3.18. Jezioro Ciechomickie (Tabela nr 41)	26
3.19. Glinianki Gołków, Głusków, Zalesie (Tabela nr 42).....	26
3.20. Jezioro Skrzyneckie (Tabela nr 43, Rys. 34)	26
3.21. Jezioro Górskie (Tabela nr 46)	27
3.22. Skoki I (Tabela nr 47).....	27
3.23. Pozostałe łowiska okręgu.....	27

III. PODSUMOWANIE28

WPROWADZENIE

Po zakończeniu sezonu wędkarskiego 2017, do analizy otrzymano prawidłowo wypełnione rejestry z danymi o odłowach wędkarskich uzyskanych przez badanych wędkarzy w następujących obwodach rybackich, użytkowanych przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego:

- **Wisła Nr 3** – odcinek od ujścia rzeki Pilica do ujścia rzeki Narew, jezioro Czerskie, jezioro Gocławskie, jezioro Kamionkowskie, jeziora Rokola, jeziora Wilanowskie, stawy Skaryszewskie;
- **Wisła Nr 4** – odcinek od ujścia rzeki Narew do ujścia rzeki Motława;
- **Narew Nr 6** – odcinek od ujścia rzeki Szkwa do ujścia rzeki Orzyc, jezioro Sieluńskie, starorzecze Zimna Woda;
- **Narew Nr 7** – Zbiornik Zegrzyński, rzeka Narew od ujścia rzeki Orzyc, rzeka Bug od ujścia rzeki Liwiec, Kanał Żerański, jezioro Stawinoga, rzeka Prut;
- **Narew Nr 8** – odcinek od czoła zapory zbiornika Zegrzyńskiego do ujścia do rzeki Wisła;
- **Bug Nr 5** – rzeka Bug na odcinku od ujścia rzeki Nurzec do ujścia rzeki Liwiec;
- **Brok Nr 1** – rzeka Brok od źródeł do ujścia do rzeki Bug;
- **Omulew Nr 1** – rzeka Omulew od wypływu z jeziora Omulew do ujścia do rzeki Narew oraz rzeka Sawica, rzeka Czarka, rzeka Wałpusza, rzeka Lelkowska Struga;
- **Orzyc Nr 1** – rzeka Orzyc od jej źródeł do ujścia do rzeki Narew;
- **Orz Nr 1** – rzeka Orz od źródeł do ujścia do rzeki Narew;
- **Rozoga Nr 1** – rzeka Rozoga od wypływu z jeziora Marksoby do ujścia do rzeki Narew, kanał Wach;
- **Szkwa Nr 1** – rzeka Szkwa od mostu w miejscowości Rozogi do ujścia do rzeki Narew, rzeka Rozoga od wypływu z jeziora Świętajno do mostu w miejscowości Rozogi;
- **Jeziorka Nr 1** – rzeka Jeziorka od źródeł do ujścia do rzeki Wisła, rzeka Kraska oraz zbiorniki Głuchów i Osieczek;
- **Świder Nr 1** – rzeka Świder od źródeł do ujścia do rzeki Wisła;
- **Rządza Nr 1** – rzeka Rządza od źródeł do ujścia do zbiornika Zegrzyńskiego;
- **Utrata Nr 1** – rzeka Utrata od źródeł do ujścia do rzeki Bzura oraz rzeka Rokitnica;
- **Nurzec Nr 1** – rzeka Nurzec od źródeł do ujścia do rzeki Bug;
- **Elk Nr 45** – rzeka Elk na odcinku od jazu piętrzącego elektrowni w miejscowości Nowa Wieś Ełcka do granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego (BNP), Kanał Kuwasy na odcinku od osi

podłużnej mostu w miejscowości Czarna Wieś do rzeki Ełk, Kanał Rudzki na odcinku od rzeki Ełk do granicy BPN;

- **Biebrza Nr 3 (Wissa)** – rzeka Kosodka (Golda) na odcinku od źródeł do granicy BPN, rzeka Klimaszewnica na odcinku od źródeł do granicy BPN, rzeka Wissa na odcinku od źródeł do granicy BPN (m. Łoje Awissa);
- **Jegrznia Nr 11** – rzeka Jegrznia na odcinku od ujścia cieką Zgniłka do granicy BPN;
- **Skrwa Prawa Nr 1** - rzeka Skrwa Prawa od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki. Uwaga: Rezerwaty przyrody „Sikórz” i „Brudzeńskie Jary” w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym zakaz połowu ryb na rzece Skrwa Prawa od miejscowości Sikórz do piętrzenia w miejscowości Radotki;
- **Zgłowiączka Nr 2** - rzeki Zgłowiączka na odcinku od przekroju poprzecznego w odległości 100 m od wypływu z jeziora Rybiny do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, rzeka Chodeczka na odcinku od 50 m poniżej wypływu z jeziora Krukowskie do ujścia do rzeki Zgłowiączka, rzeka Lubieńka na odcinku od 30 m od jej wypływu z jeziora Kaczawka do jej ujścia do rzeki Zgłowiączka wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki, z wyłączeniem jezior oraz z wyłączeniem odcinka rzeki Rakutówka od źródeł do wypływu z jeziora Rakutowskie;
- **Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5** - Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od ujścia rzeki Motława do granicy regionu wodnego Środkowej Wisły i regionu wodnego Dolnej Wisły stanowiącej linię prostopadłą do przeciwległego brzegu w 684+000 km biegu rzeki Wisła, wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Motława, Skrwa Lewa, Skrwa Prawa, Zgłowiączka, Ruda, Zuzanka, Rybniczanka, Wierzniczka, Bętlewianka i Chemiczka;
- **Motława nr 1** - Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Motława od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła
- **Bzura nr 1** - Obwód rybacki obejmuje wody: rzeki Bzura na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Ochnia oraz wody rzeki Ochnia

Oprócz tego, wędkarze zarejestrowali odłowy w innych wodach niebędących składnikami ww. obwodów rybackich. Były to wody:

– jeziora użytkowane przez Zakład Rybacki Janowo:

- **Borówko, Brajnickie, Burda, Fręcki, Głębozec** (w obw. J. Rekowe), **Grom, Jasne, Klimek** (Konik), **Lemańskie, Łażnica, Machniacz, Malszeweckie, Malszewskie, Świętajno** (Narty), **Natać, Płociczno, Rekowe, Sasek Wielki, Sasek Mały, Sędańskie, Skonieczne, Średnie, Wałpusz, Warchaldzkie, Zielonka, Nożyce** – w zlewni rzeki Szkwa nr 3, **Piasutno** (w obw. Rzeki Szkwa nr 4), **Staw Kobylocha** – m. Szczytno;

– oraz pozostałe wody Okręgu Mazowieckiego PZW:

- jeziora: **Białe** – gm. Gostynin, **Białobrzegi** – gm. Bodzanów, **Borowiec (Wildno)** – na cieku Struga Wilenica, gm. Lipno, **Brzeźno** – gm. Koneck, **Bytoń** – gm. Bytoń, **Chojno** – gm. Chrostkowo, **Ciechomickie** – gm. Łąck, **Czarno-Czerskie** – gm. Wielgie, **Głębozec** (na cieku bez nazwy – gm. Brzuze), **Górskie** – gm. Łąck, **Grójeckie** – gm. Boniewo, **Huta** – gm. Rypin, **Karaśnia** – gm. Izbica Kuj., **Kępka Szlachecka** – gm. Kowal, **Lubiechowo** – gm. Kowal, **Lutoborskie** – gm. Chocień, **Łąki Zawistowe** – gm. Boniewo, **Łuba** – gm. Włocławek, **Ługowskie** (w zlewni rzeki Chodeczka nr 5) – gm. Chocień, **Mierucie** – m. Grajewo, **Okonin** – gm. Brzuze, **Ostrowickie** – gm. Brzuze, **Peł** – gm. Chrostkowo, **Plebanka** (Ostrowąs) – gm. Aleksandrów Kuj., **Pomocnia** – m. Błędowo k/Pomiechówka, **Przytomne** – gm. Gostynin, **Rybnica** – gm. Włocławek, **Skrwilno** – gm. Skrwilno, **Skrzyneckie** – gm. Baruchowo, **Szczutkowskie** – gm. Chocień, **Świesz** – gm. Bytoń, **Telażyna** – gm. Włocławek, **Toczyłowo** w zlewni rzeki Ełk nr 43 – gm. Grajewo, **Widoń** – gm. Włocławek, **Wikaryjskie** – gm. Włocławek, **Zdworskie** – gm. Łąck;
- rzeka: **Sierpienica** – dopływ Skrwy Prawej;
- glinianki: **Bagienice** – gm. Chorzele, **Błonie** – m. Błonie, **Borowe** – gm. Zaręby Kościelne, **Golków, Głoków, Zalesie** – miejscowość Piaseczno, **Grodzisk** – m. Grodzisk Mazowiecki, **Szczęśliwickie** – m. Warszawa Ochota, **Włochy** – Warszawa Włochy, **Zielonka** – m. Zielonka k/Wołomina);
- stawy: **Jedwabne** – m. Jedwabne, **Młyński Staw** – gm. Koronowo, **Ruda** – Nadleśnictwo Ruda pow. Włocławek, **Wielgie** – gm. Wielgie, **W Parku Pruszków** – gm. Pruszków, **Staw Krzywie** – gm. Zgierz, **Talar i Montoprzem** – gm. Dobroń, **Wymysłów** – gm. Dobroń;
- inne zbiorniki: **Basen Brwinów** – m. Brwinów, **Basen Kolejniak** – m. Sulejówek, **Chorzele** – gm. Chorzele, **Czarne Baruchowo** – gm. Baruchowo, **Czarne Gostynińskie** – gm. Gostynin, **Czarne Włocławskie** – gm. Włocławek, **Jeziórko Moczydło** – m. Karczew, **Kocioł** – gm. Gostynin, **Skoki I** – gm. Włocławek, **Służewo** – gm. Aleksandrów Kuj., **Radziszewo** – gm.

Baruchowo, **Radzynek** (Paproty) – gm. Brzuze, **Rogal** – m. Nowe Ostrowy, **Trzebowo** – gm. Baruchowo, **Zalew w Makowie Mazowieckim** – m. Maków Mazowiecki.

Wszystkie dane zawarte w kwestionariuszach ankietowych zostały wprowadzone do bazy danych komputera, a następnie poddane stosownym analizom, których wyniki przedstawione są w niniejszym opracowaniu.

W metodyce badań przyjęto, że dla wiarygodnego opracowania wyników odłowu niezbędne jest dysponowanie zbiorem danych, reprezentujących co najmniej 3% całej populacji 72091 wędkarzy, członków Okręgu Mazowieckiego w 2017 roku. Poddana badaniom liczba rejestrów (7809) stanowiła, 10,8% ogólnej liczby członków, a więc spełnia założenia 3-procentowej reprezentatywności.

I. Dane ogólne

1. Odłowy całkowite – wyniki wędkarzy Mazowieckiego Okręgu PZW (Tabela nr I)

Na 1 wędkarza średnio przypadało 10,29 dni wędkowania w ciągu całego roku, natomiast średni roczny odłów wyniósł 5,98 kg, co daje całkowity zarejestrowany odłów w wysokości 46694 kg ryb. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego osiągnął poziom 0,58 kg.

W odłowach wędkarskich wystąpiło ponad 27 gatunków ryb, z czego trzy w zdecydowanie największych ilościach: leszcz (34,4%), płoć (17,3%) i szczupak (13,9%).

W następnych rozdziałach opracowania, podobnie jak w opracowaniu ubiegłorocznym, skupimy się głównie na wynikach dotyczących wszystkich obwodów rybackich wymienionych we „Wprowadzeniu”, następnie jezior będących w gestii Zakładu Rybackiego Janowo i pozostałych łowisk okręgu, gdzie całkowity zarejestrowany odłów był wyższy niż 100 kg.

II. Łowiska wędkarskie

1. Obwody rybackie

1.1. Obwód rybacki Narew Nr 7 (Tabela nr 1, Rys. 1)

Przedstawione poniżej wyniki dotyczą całego obwodu rybackiego Narew Nr 7, w skład którego wchodzi głównie Zbiornik Zegrzyński, ale także dolny odcinek rzek Bug i Narew, jezioro Stawinoga oraz Kanał Żerański i rzeka Prut. W wodach całego obwodu Narew Nr 7 zarejestrowało połowy 1311 wędkarzy. Globalny odłów osiągnął 12946 kg ryb, na 1 wędkującego przypadało średnio 13,40 dni wędkowania w ciągu roku, 9,87 kg złowionych ryb, oraz dzienny odłów w wysokości 0,74 kg. W odłowach z całego obwodu Narew Nr 7 wystąpiło 19 gatunków ryb, co dość dobrze świadczy o bioróżnorodności występującego w wodach obwodu pogłowia ryb (Rys. 1).

Z wyróżnionych grup gatunków, najliczniejsze były mniej cenne karpowate – leszcz, płóc i krap, stanowiące odpowiednio 44,3%, 12,0% i 5,2% (łącznie 61,4%), ale – tak jak w poprzednim sezonie – liczną grupą były także podstawowe gatunki drapieżne (łącznie 33,5%), a więc szczupak (17,2%), okoń (6,7%), sum (5%), sandacz (3,9%), boleń (0,8%) oraz pojedyncze sztuki węgorza. 3% odłowów stanowił lin, a udziały pozostałych gatunków nie przekraczały 1%. Sytuacja powyższa świadczy o korzystnych relacjach między gatunkami drapieżnymi a karpowatymi występującymi w wodach obwodu. Nieznaczne ilości gatunków reofilnych w odłowach wędkarskich wynikają z faktu, że przeważająca część odłowów była rejestrowana w Zbiorniku Zegrzyńskim i Kanale Żerańskim, a więc praktycznie w stagnujących partiach obwodu rybackiego Narew Nr 7. Ich niewielki udział nie przekreśla jednak faktu, że warunki wędkowania panujące w 2017 roku w tych wodach należy ocenić jako korzystne. Wypada stwierdzić za raportem z roku ubiegłego, że pomimo wysokiego poziomu troficznego Zbiornika Zegrzyńskiego, czego wyrazem jest przewaga mniej cennych gatunków karpowatych w pogłowie ryb, umiejętnie prowadzona polityka zarybieniowa, a także odpowiednio sterowana eksploatacja narzędziami rybackimi, pozwalają utrzymać pogłowie ryb we względnej równowadze, a także zapewnić relatywnie wysokie walory wędkarskie wód wchodzących w skład obwodu rybackiego rzeki Narew Nr 7.

1.2. Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5 (Tabela nr 2, Rys. 2)

W roku 2017 w obwodzie rzeki Wisły Nr 5 w Zbiorniku Włocławskim zarejestrowało swoje połowy 411 wędkarzy spędzając na łowisku średnio 13,09 dni. Sumaryczny odłów wyniósł 3707 kg ryb, średni roczny odłów na 1 wędkującego 9,02 kg, a średni odłów dzienny na poziomie 0,69 kg.

Na atrakcyjną strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 20 gatunków ryb (Rys. 2). W grupie drapieżników na pierwszym miejscu był, jak i przed rokiem sum (30,2%) o średniej masie osobniczej 8,81 kg, a towarzyszyły mu szczupak (8,9%), okoń (5,2%), sandacz (5,2%) i boleń (3,2%), co wraz z rzadziej zanotowanymi egzemplarzami węgorza łącznie dało prawie 53-procentowy udział tej grupy w odłowach. W grupie karpowatych leszcz stanowił 23%, płóc 3,7%, karaś srebrzysty 4,1%, krap 1,2%, a cenniejsze karpowate reprezentował średnio 2,21-kilogramowy karp z odsetkiem 13,2%. Cenne gatunki uzupełniały pojedyncze sztuki reofilnych karpowatych, a udziały pozostałych gatunków nie przekraczały 1%. Była to atrakcyjna struktura gatunkowa wśród opisywanych łowisk.

1.3. Obwód rybacki Narew Nr 6 (Tabela nr 3, Rys. 3)

W wodach tego obwodu rybackiego w roku 2017 swoje połowy zarejestrowało 934 wędkarzy, a ogólny odłów wyniósł 3409 kg ryb. Przeciętnie na 1 wędkującego przypadało 12,68 dni wędkowania i

odłów roczny w wysokości jedynie 3,65 kg ryb, co daje wskaźnik średniego dziennego odłowu na niskim poziomie 0,29 kg.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło ponad 19 gatunków ryb, wśród których w większości łowiono mniej cenne karpowate – leszcza, płoć i krapia (Rys. 3), łącznie stanowiące 73,7%, przy czym leszcz stanowił 59,2%, a jego średnia masa osobnicza była bardzo wysoka i wynosiła 2,30 kg; krap stanowił 8,2%, a płoć 6,4%. Jeżeli chodzi o gatunki drapieżne, to stanowiły one odpowiednio: szczupak 11,7%, sum 4,9%, okoń 4,3%, sandacz 1,1%, a boleń i węgorz to pojedynczo odnotowane sztuki. Ich łączny udział osiągnął 22,6% i był tym samym ponownie niższy od poprzedniego sezonu. Udział lina o średniej masie osobniczej 0,87 kg wynosił 0,9%. Z pozostałych gatunków warto zauważyć reofilnego klenia, który stanowił 1,2% oraz kilka sztuk karpia (0,5%) o średniej masie pojedynczego osobnika 2,50 kg, co podnosiło bioróżnorodność tego odcinka rzeki Narew i jego walory czysto wędkarskie.

W sumie, tak jak przed rokiem, warunki wędkowania w wodach obwodu Narew Nr 6 były dość korzystne z racji obecności dużych leszczy oraz gatunków drapieżnych, a zwłaszcza szczupaka (średnia masa 1,56 kg) i bolenia (średnia masa 2,14 kg). Obwód rzeki Narew Nr 6 należał do dość interesujących łowisk Mazowieckiego Okręgu PZW.

1.4. Obwód rybacki Wisła Nr 4 (Tabela nr 4, Rys. 4)

W roku 2017 w obwodzie Wisły Nr 4 rejestry wypełniło 252 wędkarzy, którzy pojedynczo łowili średnio 1,03 kg ryb na dzień, co dało całkowity zarejestrowany odłów na poziomie 3399 kg ryb. Na każdego z wędkarzy przypadało średnio 13,03 dni wędkowania, a rocznie łowili oni średnio 13,49 kg.

W zarejestrowanych odłowach wędkarskich wystąpiło ponad 21 gatunków ryb (Rys. 4), z których przeważającą (64,4%) grupą były mniej cenne karpowate – identycznie jak w badaniach z lat 2005-2016, zwraca uwagę wysoka średnia masa złowionych osobników leszcza, wynosząca 1,29 kg z udziałem tego gatunku równym 54,9%. W grupie tej zanotowano także płoć (5,9%) i krapia (3,6%). Grupa gatunków drapieżnych, stanowiąca w przeciwwadze łącznie 30,6%, reprezentowana była głównie przez dwa gatunki: średnio 10,47-kilogramowego suma z udziałem 15,7% oraz średnio 2,30-kilogramowego szczupaka z udziałem 6,8%. Kolejne miejsca zajęły: średnio 2,76-kilogramowy sandacz (5,6%), średnio 2,80-kilogramowy boleń (1,7%) oraz okoń i pojedyncze sztuki węgorza.

Z pozostałych gatunków warto zauważyć karasia srebrzystego, który stanowił 1,7%, klenia (1%) oraz kilka sztuk karpia (0,8%) o atrakcyjnej średniej masie pojedynczego osobnika 4,28 kg. Udziały pozostałych gatunków w odłowach nie przekraczały 1%.

1.5. Obwód rybacki Narew Nr 8 (Tabela nr 5, Rys. 5)

W roku 2017 w wodach obwodu rybackiego rzeki Narew Nr 8 swoje połowy zarejestrowało 260 wędkarzy, łowiących ogółem 3124 kg ryb. Średnio na 1 wędkarza przypadało 12,89 dni wędkowania oraz roczny odłów 12,01 kg ryb, co daje wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego na poziomie 0,93 kg.

W odłowach zarejestrowanych w obwodzie Narew Nr 8 łączny udział drapieźników wyniósł jedynie 21,4%, natomiast łączny odsetek mniej cennych karpiowatych wyniósł około 72%. W grupie drapieźników poza szczupakiem (11%) sum, okoń, sandacz i boleń stanowiły odpowiednio 4,6%, 2,4%, 1,9% i 1,4%, a węgorze występowały w odłowach, jako pojedyncze sztuki. Wśród mniej cennych karpiowatych, poza 61,1% udziałem dość atrakcyjnego leszcza (średnia masa 1,33 kg), odsetki płoci i krąpia wynosiły po 5,5% każdy (Rys. 5). Reofilne gatunki karpioвате w odłowach z obwodu Narew Nr 8 poza jaziem (1,2%) występowały jako pojedyncze sztuki. Udział karpia wynosił 1,9%. Z innych gatunków udział żadnego nie przekroczył 1%.

1.6. Obwód rybacki Wisła Nr 3 (Tabela nr 6, Rys. 6)

W roku 2017 w wodach obwodu rybackiego Wisła Nr 3 zarejestrowało połowy 402 wędkarzy, którzy złowili ogółem 3064 kg ryb, średni roczny odłów uzyskany przez 1 wędkującego wyniósł 7,62 kg, przy 10,40 dniach wędkowania i średnim dziennym odłowem na 1 wędkarza wynoszącym 0,73 kg.

W odłowach odnotowano ponad 20 gatunków ryb, wśród których był leszcz stanowiący 37,6% masy wszystkich złowionych w omawianym obwodzie ryb (Rys. 6). Łącznie z krapiem (16,6%) i płocią (7,1%) stanowił 61,3%. Łączny udział drapieźników wynosił 30,2%, w tym poza rzadko łowionym węgorzem – sum był obecny w 13,4%, szczupak 7,7%, sandacz 4,7%, okoń 2,6% i boleń 1,8%. Udziały reofilnych gatunków karpiowatych były zauważalne w całkowitym odłowem i wynosiły: klenia 1,1%, jazia 0,9%, certy 0,8% i średnio 2,15-kilogramowej brzany 0,3%.

Z innych gatunków warto wymienić kilka sztuk karpia, natomiast pozostałe gatunki występowały w odłowach w niewielkich ilościach.

1.7. Obwód rybacki Bug Nr 5 (Tabela nr 7, Rys. 7)

W 2017 roku swoje połowy w wodach obwodu rybackiego rzeki Bug Nr 5 zarejestrowało 741 wędkarzy, którzy złowili ogółem 2749 kg ryb, średnio na 1 wędkarza przypadało 14,65 dni wędkowania. Średni roczny odłów wyniósł 3,71 kg ryb, co daje niski wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego na poziomie 0,25 kg.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło ponad 16 gatunków ryb. Łączny udział leszcza, płoci i krąpia wynosił 47,5% (Rys. 7), przy czym najwięcej łowiono średnio 1,20-kilogramowego leszcza (24,4%), następnie nieco mniej krąpia (14,3%) i płoci (8,8%). W omawianym obwodzie zanotowano 6,4% karasia srebrzystego o średniej masie 0,35 kg. W grupie gatunków drapieżnych wyróżnić należy średnio 1,69-kilogramowego szczupaka z udziałem 23,5%, a następnie towarzyszące mu: suma (5,3%), okonia (5,1%), sandacza (2,2%) i bolenia (2%). Karpiowate reofilne łowiono sporadycznie. Ponadto, należy wymienić udziały lina (3,8%), karpia (2,1%) oraz 1,1% karasia pospolitego. W sumie warunki wędkowania w obwodzie rybackim Bug Nr 5 można uznać za dość korzystne.

1.8. Obwód rybacki Skrwa Prawa Nr 1 (Tabela nr 8, Rys. 8)

W sezonie 2017 w łowisku tym zarejestrowało swoje połowy 250 wędkarzy, całkowity odłów wyniósł 2327 kg ryb. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego osiągnął 1,49 kg, rocznie 9,31 kg, a statystyczny wędkarz spędzał na łowisku średnio 6,26 dnia.

W odłowach wędkarskich wystąpiło 11 gatunków ryb (Rys. 8), z których cały zanotowany odłów zdecydowanie zdominowała płoć z udziałem 92,9%. Przy takiej przewadze można wspomnieć jedynie o 2,3% okonia, 1,9% leszcza i 1,4% szczupaka, natomiast udziały innych gatunków nie przekraczały 1%. Należy jedynie dodać, iż z pozostałych gatunków zanotowano kilkanaście sztuk pstrąga potokowego oraz pojedynczo klenie, certy, jelce, ukleje, karpie i krąpie. Strukturę gatunkową odłowów wędkarskich należy określić jako bardzo monotonną.

1.9. Obwód rybacki Elk Nr 45 (Tabela nr 13, Rys. 9)

W roku 2017 w omawianym obwodzie rybackim rzeki Elk Nr 45 swoje połowy zarejestrowało 62 wędkarzy, a całkowity odłów wyniósł 499,1 kg ryb, co daje średnio 8,05 kg na 1 wędkującego rocznie i 1,13 kg w 1 dniu wędkowania, przy spędzonych średnio 7,13 dniach nad wodą.

W odłowach wystąpiło 10 gatunków ryb (Rys. 9). Przeważały mniej cenne karpiowate – głównie płoć z udziałem 36,2%, leszcz 2,3% oraz pozostałe drobne gatunki (krąp i wzdreğa) – stanowiące łącznie 39,3%. Grupę reofilnych dość znacząco reprezentowały: średnio 0,96-kilogramowy kleń (25,3%) i 1,30-kilogramowy jaź (2,3%). Z odnotowanych drapieżników średnio 1,60-kilogramowy szczupak stanowił 23,3%, a okoń 8,5%. Z pozostałych gatunków wymienić należy jedynie kilka sztuk lina.

1.10. Obwód rybacki Rozoga Nr 1 (Tabela nr 14, Rys. 10)

W wodach tego łowiska swoje połowy zarejestrowało 293 wędkarzy, całkowity odłów wyniósł 433,0 kg ryb, a wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkarza jedynie 0,21 kg, co daje średnio 1,48 kg na 1 wędkującego rocznie, przy spędzonych średnio 6,95 dniach nad wodą.

W odłowach wystąpiło 10 gatunków ryb (Rys. 10), z których grupa mniej cennych karpiowatych stanowiła łącznie 55,6% (w tym leszcza 29,7% i płoci 26%). Wśród drapieźników łącznie stanowiących 32,6% przeważał szczupak z odsetkiem 18,1%, a towarzyszyły mu jedynie sandacz stanowiący 7,8% i okoń z udziałem 6,6%. Ponadto, zanotowano zauważalny odsetek karpia (2,6%) o średniej masie osobniczej 3,73 kg. Z innych łowionych gatunków należy wymienić lina z udziałem 8,4% oraz pojedynczo zanotowane karasie pospolite i jazie.

1.11. Obwód rybacki Orzyc Nr 1 (Tabela nr 15, Rys. 11)

W sezonie 2017 w łowisku tym zarejestrowało swoje połowy 248 wędkarzy. Całkowity odłów wyniósł 330,7 kg ryb. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego przy tak wysokiej frekwencji osiągnął jedynie 0,24 kg, rocznie 1,33 kg, a wędkarz spędzał na łowisku średnio 5,65 dnia.

W odłowach wędkarskich wystąpiło 14 gatunków ryb (Rys. 11). Najliczniej reprezentowana była grupa drapieźników (łącznie 56,7%), w której przeważał szczupak o średniej masie osobniczej 1,59 kg stanowiący 37,4%, a towarzyszył mu okoń z udziałem 17,5% oraz pojedyncze egzemplarze sandacza i bolenia. Grupa mniej cennych karpiowatych (płoc, leszcz i krąp) stanowiła łącznie 28,5%, z przewagą płoci z udziałem 23,7% oraz udziałami leszcza (3,6%) i krąpia (1,2%). W połowach odnotowano 5,6% średnio 0,84-kilogramowego klenia oraz 1% średnio 0,57-kilogramowego jazia. Wśród pozostałych gatunków warto wymienić karpia z udziałem 3,4%, lina z odsetkiem 3,2%, a także pojedynczo zanotowane karasie srebrzystego i pospolitego oraz amura.

1.12. Obwód rybacki Jeziorka Nr 1 (Tabela nr 21, Rys. 12)

W łowisku tym zarejestrowało swoje połowy 19 wędkarzy, a sumaryczny odłów wyniósł 228,3 kg ryb, co daje średnio 12,02 kg na 1 wędkarza rocznie i 1,44 kg w jednym dniu wędkowania.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 9 gatunków ryb, a strukturę gatunkową tych odłowów przedstawiono na Rys. 12. Znaczącą część odłowów stanowiły mniej cenne karpiowate, a w tym płoc 53,3%, krąp 9,9%, a leszcz 2%. W grupie drapieźników (łącznie 25,9%) okoń stanowił 19,7%, a średnio 1,57-kilogramowy szczupak 6,2% masy zarejestrowanych ryb. Gatunki reofilne reprezentowane były przez średnio 1,20-kilogramowego jazia z udziałem 2,6% oraz klenia (0,4%). Ponadto, odnotowano 3,8% karasia srebrzystego i kilka sztuk karpia (2,2%). Jeziorkę w omawianym

obwodzie można określić jako rzekę atrakcyjną dla wędkujących, głównie ze względu na dość wysoki udział okonia w odłowach.

1.13. Obwód rybacki Brok Nr 1 (Tabela nr 22, Rys. 13)

W 2017 roku w łowisku tym zarejestrowało swoje połowy 130 wędkarzy. Całkowity odłów osiągnął 213,2 kg ryb. Średni roczny odłów na 1 wędkującego wyniósł 1,64 kg, a średni odłów dzienny osiągnął poziom 0,24 kg, w ciągu średnio 6,72 dni spędzonych nad wodą w ciągu roku.

W odłowach zanotowano jedynie 9 gatunków ryb (Rys. 13). W omawianym sezonie znaczącym udziałem charakteryzowały się mniej cenne karpioвате (płoc, leszcz i krąp) stanowiące łącznie 40,6%. Udział płoci wynosił 34,6%, leszcza 3,5%, a krąpia 2,5%. Drapieźniki (szczupak i okoń) stanowiły łącznie 54,9% wszystkich zarejestrowanych ryb, z czego 34,1% przypadało na szczupaka, a 20,8% na okonia. Ponadto zanotowano pojedyncze sztuki lina oraz karasi obu gatunków.

1.14. Obwód rybacki Biebrza Nr 3 (Wissa) (Tabela nr 26, Rys. 14)

W obwodzie rybackim rzeki Biebrza (Wissa) Nr 3 w 2017 roku 17 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 197,6 kg ryb, spędzając na łowisku średnio 9,88 dni, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 11,62 kg i 1,18 kg.

W omawianym obwodzie w strukturze gatunkowej odłowów (Rys. 14) odnotowano 7 taksonów ryb. Wśród odnotowanych gatunków przeważała drobna płoc z udziałem 71,6%, leszcz stanowił 2,5%, a krąp 0,6%. Grupę drapieźników (łącznie 18%) reprezentowały dwa gatunki – szczupak stanowiący 11,4% odłowów oraz okoń z udziałem 6,6%. Warto zaznaczyć obecność dość atrakcyjnych reofilnych – jazia (4,1%) i klenia (3,2%).

1.15. Obwód rybacki Omulew Nr 1 (Tabela nr 28, Rys. 15)

W obwodzie rybackim rzeki Omulew Nr 1 w roku 2017 parametry wędkowania były następujące: swoje połowy zarejestrowało 96 wędkarzy, łowiących w sumie 191,4 kg ryb przez średnio 5,40 dnia w roku. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkarza wynosił 0,37 kg.

W odłowach wystąpiło 10 gatunków ryb (Rys. 15). Grupa mniej cennych gatunków karpiowatych (płoc, leszcz, krąp i wzdręga) łącznie stanowiła 31,3%, przy czym płoc 23,2%, leszcz 7,7%, a krąp i wzdręga łącznie 0,4%. Gatunki reofilne łącznie stanowiły 19,9% i reprezentowane były przez średnio 0,99-kilogramowego klenia z udziałem 12,4% oraz 0,72-kilogramowego jazia z odsetkiem 7,5%. Grupę drapieźników (łącznie prawie 47,2%) reprezentowały dwa gatunki – szczupak z udziałem 28,1% i okoń stanowiący 19,2%. Pozostające w pewnej równowadze ilościowej

wymienione trzy grupy gatunków uzupełniane były przez występujące w znacznie mniejszych ilościach liny (1,3%) i karasie pospolite. Struktura pozostała zbliżona w porównaniu do sezonu 2016.

1.16. Obwód rybacki Nurzec Nr 1 (Tabela nr 33, Rys. 16)

W roku 2017 w obwodzie Nurzec Nr 1 zarejestrowało swoje połowy 61 wędkarzy spędzając nad wodą średnio prawie 6 dni, a sumaryczny odłów osiągnął 169,1 kg ryb, przy średnim rocznym odłowie na 1 wędkującego 2,77 kg i odłowie dziennym na poziomie 0,48 kg.

Na atrakcyjną strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 10 gatunków ryb (Rys. 16). Grupa mniej cennych karpiowatych (płoc, leszcz i wzdręga) stanowiła łącznie 33,9%, w tym z 16,9% udziałem leszcza, 16% płoci i 1,1% wzdręgi. Wśród drapieźników (łącznie 49,8%) przeważał średnio 1,60-kilogramowy szczupak stanowiący 38,7%, a towarzyszyły mu okoń z udziałem 9,9% oraz boleń (1,2%). W połowach odnotowano także lina (6%) i karpia (5,5%).

1.17. Obwód rybacki Rządza Nr 1 (Tabela nr 37, Rys. 17)

W obwodzie rybackim Rządza Nr 1 wędkowało 50 wędkarzy, a sumaryczny odłów ryb wyniósł 138,1 kg ryb, co daje średni roczny i dzienny odłów na 1 wędkarza na poziomie odpowiednio 2,76 kg i 0,47 kg, przy 5,82 dniach spędzonych nad wodą w ciągu roku przez pojedynczego wędkarza.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 8 gatunków ryb (Rys. 17). Łączny udział dwóch zanotowanych gatunków drapieźnych – okonia i szczupaka wynosił 45,3%, przy czym okoń o średniej masie 0,46 kg stanowił 30,6%, a średnio 1,13-kilogramowy szczupak 14,8%. Mniej cenne gatunki karpioвате łącznie stanowiły 27,9%, przy czym płoc 19,3%, leszcz 8,3%, a wzdręga 0,4%. Z pozostałych złowionych gatunków niewątpliwą atrakcją łowiska był lin (25,2%) o średniej masie 1,39 kg. Zanotowano także pojedyncze sztuki jazia (1,5%) i karasia srebrzystego. Przedstawione wyniki wskazują, że stan ichtiofauny i warunki wędkowania w wodach tego obwodu rybackiego były stosunkowo korzystne.

1.18. Obwód rybacki Utrata Nr 1 (Tabela nr 44, Rys. 18)

W obwodzie rybackim rzeki Utrata Nr 1 swoje połowy zarejestrowało 28 wędkarzy, łowiących w sumie 110,8 kg ryb, co daje średnio 3,96 kg na 1 wędkującego rocznie i 0,67 kg w 1 dniu wędkowania, przy spędzonych średnio 5,89 dniach nad wodą.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 10 gatunków ryb, wśród których największym udziałem charakteryzował się szczupak – 32%, a okoń 7,6% i sandacz 6,1%. Ich łączny udział osiągnął 45,6%. Mniej cenne karpioвате – płoc i leszcz (Rys. 18) łącznie stanowiły 28,5%, przy czym płoc

16,9%, a leszcz 11,6%. Udział karasia srebrzystego wynosił 18,7%, karpia 4,1% o średniej masie pojedynczego osobnika 2,25 kg. Z pozostałych gatunków zanotowano pojedyncze jazie i jazgarze.

1.19. Obwód rybacki Orz Nr 1 (Tabela nr 49, Rys. 19)

W obwodzie rybackim Orz Nr 1 swoje połowy zarejestrowało 118 wędkarzy, a całkowity odłów w roku 2017 wyniósł 92,3 kg ryb, co daje średnio jedynie 0,78 kg na 1 wędkującego rocznie i 0,15 kg w 1 dniu wędkowania. Pojedynczy wędkarz spędził średnio na łowisku 5,19 dnia.

W odłowach wystąpiło 6 gatunków ryb (Rys. 19), przy czym przeważały mniej cenne karpiołate – głównie płoć z udziałem 47,5% oraz jedna sztuka leszcza (1%). W przeciwwadze (łącznie 44,7%) grupę drapieżników reprezentowały: średnio 1,97-kilogramowy szczupak, którego udział wynosił 23,5%, okoń stanowiący 18,2% oraz jedna sztuka bolenia (3%). Z pozostałych gatunków wymienić należy jedynie lina (6,8%).

1.20. Obwód rybacki Świder Nr 1 (Tabela nr 53, Rys. 20)

W obwodzie rybackim rzeki Świder Nr 1 swoje połowy zarejestrowało 15 wędkarzy, łowiących w sumie 74,2 kg ryb, wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkarza wynosił 0,31 kg, co daje średnio 4,95 kg na 1 wędkującego rocznie, przy spędzonych średnio 16,07 dniach nad wodą.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 7 gatunków ryb (Rys. 20), wśród których największymi udziałami charakteryzowały się drapieżniki: okoń 35% i szczupak 20,2%. Ich łączny udział osiągnął 55,3%. Mniej cenne karpiołate – płoć i leszcz łącznie stanowiły 22,4%, przy czym płoć 13,5%, a leszcz 8,9%. Udział karpia wynosił 11,1%, lina 6,1%, a karasia srebrzystego 5,3%.

1.21. Obwód rybacki Zgłowiączka Nr 2 (Tabela nr 54)

W obwodzie rybackim Zgłowiączka Nr 2 wędkowało 10 wędkarzy, a sumaryczny odłów ryb wyniósł 71,8 kg ryb, co daje średni roczny i dzienny odłów na 1 wędkarza na poziomie odpowiednio 7,18 kg i 0,64 kg, przy 11,20 dniach spędzonych nad wodą w ciągu roku przez pojedynczego wędkarza.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 8 gatunków ryb. Łączny udział dwóch zanotowanych gatunków drapieżnych – okonia i szczupaka wynosił 22%, przy czym okoń stanowił 16,3%, a średnio 1,03-kilogramowy szczupak 5,7%. Mniej cenne gatunki karpiołate łącznie stanowiły 68,2%, przy czym płoć 63,1%, wzdręga 3,8%, a leszcz 1,4%. Z pozostałych złowionych gatunków zanotowano także pojedyncze sztuki jazia (7,5%), karasia srebrzystego (1,3%) i lina (1%).

1.22. Obwód rybacki Bzura Nr 1 (Tabela nr 82)

W obwodzie rybackim rzeki Bzura Nr 1 w 2017 roku tylko 3 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 28,2 kg ryb, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 9,40 kg i 0,37 kg. Przeciętny wędkarz spędził nad wodami omawianego obwołu aż 25,33 dnia.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 6 taksonów ryb. Drapieżniki (sandacz i szczupak) stanowiły łącznie 19,2% wszystkich zarejestrowanych ryb. Zdecydowanie najczęściej łowiono sandacza – 10,3%, któremu towarzyszył jedynie szczupak (8,9%). Grupa gatunków karpiowatych to łącznie 36,5%. Płoc stanowiła 34%, a leszcz 2,5%. Karasie srebrzysty oraz pospolity stanowiły odpowiednio 34,8% oraz 9,6%. Trudno omówić strukturę tak niewielkiej puli złowionych w tym łowisku ryb, na podstawie tak niewielkiej liczby analizowanych rejestrów.

1.23. Obwód rybacki Jegrznia Nr 11 (Tabela nr 113)

W obwodzie rybackim rzeki Jegrznia Nr 11 w 2017 roku tylko 4 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości jedynie 4,4 kg ryb. Także i w przypadku tego łowiska trudno omówić strukturę tak niewielkiej puli złowionych w tym łowisku ryb, na podstawie tak niewielkiej liczby analizowanych rejestrów.

1.24. Obwód rybacki Szkwa Nr 1 (Tabela nr 119)

W obwodzie rybackim rzeki Szkwa Nr 1 trzech wędkarzy zanotowało znikomy odłów (0,6 kg), co nie pozwala omówić stanu pogłowia ryb w tym łowisku.

2. Jeziora Zakładu Rybackiego Janowo

2.1. Jezioro Sasek Wielki (Kobylocha) (Tabela nr 10, Rys. 21)

W roku 2017 w jeziorze Sasek Wielki całkowity zarejestrowany odłów wyniósł 684,1 kg ryb, a frekwencja na łowisku – 165 wędkarzy, którzy średnio łowili 0,96 kg ryb dziennie oraz rocznie 4,15 kg, spędzając na łowisku średnio 4,33 dnia.

W sezonie 2017 w składzie odłowów wędkarskich z jeziora Sasek Wielki wystąpiło 10 gatunków ryb (Rys. 21). Łączny udział mniej cennych karpiowatych wynosił 69,4%. Najwięcej złowiono drobnej płoci (35,5%) i leszcza (24,7%), mniej krąpia (8,1%), wzdreği (0,7%) i uklei (0,4%). Grupa drapieżników reprezentowana przez szczupaka (15%), okonia (13,8%) i kilka sztuk węgorza stanowiła łącznie 30% odłowów. Udziały pozostałych gatunków: lina i karasia pospolitego nie

przekraczały 1%. W stosunku do poprzedniego sezonu warunki wędkowania w jeziorze Sasek Wielki były porównywalne.

2.2. Jezioro Wałpusz (Tabela nr 19, Rys. 22)

W jeziorze Wałpusz 80 wędkarzy zarejestrowało swe połowy w ilości 275,3 kg ryb, spędzając na łowisku średnio 4,69 dni, natomiast średni odłów roczny i dzienny w przeliczeniu na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 3,44 kg i 0,73 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 8 taksonów (Rys. 22). Z grupy mniej cennych karpiowatych, które łącznie stanowiły 62,5% wszystkich zarejestrowanych w Wałpuszu ryb drobna płoć stanowiła 39,8%, leszcz 19,3%, wzdręga 3,1%, krąp 0,3%, a ukleja znikomy odsetek. Z drapieźników, które stanowiły łącznie 37% zdecydowanie najwięcej łowiono szczupaka – 29,5%, a w drugiej kolejności okonia – 7,5%. Udział lina zaznaczył się w znikomych ilościach. Struktura połowów była niemal identyczna, jak w poprzednim analizowanym sezonie 2016. W sumie jezioro Wałpusz należy ocenić jako dość atrakcyjne łowisko Mazowieckiego Okręgu PZW.

2.3. Jezioro Sasek Mały (Tabela nr 24)

W jeziorze Sasek Mały w roku 2017 zarejestrowało swoje połowy 116 wędkarzy, a sumaryczny odłów osiągnął 209,2 kg ryb, przy średnim rocznym odłowie na 1 wędkującego 1,80 kg i odłowie dziennym na poziomie 0,63 kg. Wędkarze spędzali średnio 2,88 dni nad wodą w ciągu roku.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 10 taksonów ryb. Na gatunki karpioвате rejestrowane najczęściej (łącznie stanowiące 77,3%) składały się bardzo drobna płoć (36,2%), krąp z udziałem 19,6%, leszcz 17%, ukleja 3% i wzdręga 1,5%. Drapieźniki – okoń ze szczupakiem i sandaczem stanowiły łącznie 16,5% złowionych ryb, z czego udziałowi okonia wynoszącemu 11,5% towarzyszyły 4,2% szczupaka i jedna sztuka sandacza. Pozostałe gatunki występowały w znacznie mniejszości: karaś srebrzysty 4,9% i lin 1,4%.

2.4. Jezioro Klimek (Konik) (Tabela nr 29)

W omawianym sezonie 37 wędkarzy odłowiło i zarejestrowało połowy na poziomie 190,9 kg ryb, spędzając średnio 2,30 dnia i łowiąc 2,25 kg ryb, co w ciągu roku przekłada się na 5,16 kg średnio na 1 wędkującego.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 5 taksonów. W wędkarskich połowach z jeziora Klimek przeważała płoć stanowiąca 84,4%. Pozostałe gatunki występowały w

znaczniej mniejszości: leszcz stanowił 10,3%, szczupak 3,1%, okoń 1,7% a karaś srebrzysty 0,5%. Opisana struktura odłowów wędkarskich nie należała do zbyt atrakcyjnych.

2.5. Jezioro Małszewskie (Tabela nr 30)

W jeziorze Małszewskim w roku 2017 zarejestrowało swoje połowy 40 wędkarzy, a sumaryczny odłów osiągnął 179,6 kg ryb, przy średnim rocznym odłowieniu na 1 wędkującego 4,49 kg i odłowieniu dziennym na poziomie 0,89 kg.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 8 gatunków ryb. Łączny udział mniej cennych karpiowatych wynosił 63,9%, z czego najwięcej złowiono płoci (42,3%), a mniej leszcza (20,5%), krąpia (0,6%) i „pozostałych”. Drapieżniki – okoń ze szczupakiem stanowiły 35,3% złowionych ryb, z czego udziałowi okonia wynoszącemu 19% towarzyszył szczupak (16,3%). Z pozostałych gatunków należy wymienić tylko po jednej sztuce karasia pospolitego i lina.

2.6. Jezioro Brajnickie (Tabela nr 35)

W sezonie 2017 w jeziorze Brajnickim całkowite zarejestrowane odłowienia wędkarskie wyniosły 148,9 kg ryb, a na jednego z 76 wędkarzy, którzy zarejestrowali swoje połowy dziennie przypadało średnio 0,57 kg ryb. Parametry opisujące łowisko uległy znacznemu obniżeniu w stosunku do roku 2017.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska, składająca się z 10 gatunków, była następująca: podobnie jak w poprzednim sezonie największym udziałem charakteryzowała grupa mniej cennych karpiowatych, które łącznie stanowiły 87% wszystkich zarejestrowanych w Brajnikach ryb. Leszcz stanowił 47,1%, bardzo drobna płoć 30,3%, krąg 8,4%, ukleja 0,7% i wzdręga 0,6%.

Z grupy drapieżników wymienić można jedynie okonia (4,8%) i kilka sztuk szczupaka (2,7%). Pozostałe gatunki występowały w znacznie mniejszości: karaś pospolity 3,6%, lin 1,2%, a karaś srebrzysty 0,7%. Opisana struktura odłowów wędkarskich była jedną z mniej atrakcyjnych wśród analizowanych łowisk.

2.7. Jezioro Grom (Tabela nr 45)

W jeziorze Grom w roku 2017 zarejestrowało swoje połowy 17 wędkarzy, a sumaryczny odłów osiągnął 109,2 kg ryb, przy średnim rocznym odłowieniu na 1 wędkującego 6,42 kg i odłowieniu dziennym na poziomie 2,10 kg.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 7 taksonów ryb. Łączny udział mniej cennych karpiowatych wynosił 76,1%, z czego najwięcej złowiono bardzo drobnej płoci

(35,1%), leszcza 33,6%, wzdreży 7,1% a krąpia 0,4%. Drapieżniki – szczupak z okoniem stanowiły 18,4% złowionych ryb, z czego udziałowi szczupaka wynoszącemu 10,6% towarzyszył okoń (7,8%). Z pozostałych gatunków należy wymienić jedynie kilka sztuk lina.

2.8. Staw Jedwabne (Tabela nr 48, Rys. 23)

W omawianym sezonie 12 wędkarzy odłowiło i zarejestrowało swoje połowy na poziomie 102,1 kg ryb, spędzając średnio 5,92 dnia i łowiąc 1,44 kg ryb, co w ciągu roku przekłada się na 8,51 kg średnio na 1 wędkującego.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 6 taksonów (Rys. 23). W przewadze był to karp o średniej masie 2,01 kg z udziałem 66,8%. Z pozostałych gatunków można wymienić 13,4% lina, 11,5% karasia pospolitego, 4,6% płoci, 2,5% karasia srebrzystego oraz 1,3% amura. Była to bardzo atrakcyjna dla wędkarzy struktura odłowów, jeśli chodzi głównie o połowy karpia.

2.9. Pozostałe jeziora Zakładu Rybackiego Janowo

Jezioro Świątajno (Narty) (Tabela nr 56), Jezioro Warchałdzkie (Tabela nr 57), Jezioro Malszeweckie (Tabela nr 59), Jezioro Burdąg (Tabela nr 61), Jezioro Piasutno (Tabela nr 64), Jezioro Nożyce (Tabela nr 68), Jezioro Machniacz (Tabela nr 70), Jezioro Lemańskie (Tabela nr 74), Jezioro Rekowe (Tabela nr 78), Jezioro Sędańskie (Tabela nr 79), Jezioro Płociczno (Tabela nr 83), Jezioro Natać (Tabela nr 84), Staw Kobylocha (Tabela nr 88), Jezioro Głębocek (w obw. J. Rekowe, Tabela nr 98), Jezioro Łażnica (Tabela nr 101), Jezioro Skonieczne (Tabela nr 102), Jezioro Średnie (Tabela nr 105), Jezioro Fręcki (Tabela nr 110), Jezioro Borówko (Tabela nr 117), Jezioro Zielonka (Tabela nr 118), Jezioro Jasne (Tabela nr 120).

Na wymienionych jeziorach będących w użytkowaniu Zakładu Rybackiego Janowo w nadesłanych rejestrach odłowy wędkarskie nie przekraczały 100 kg. Poszczególne z ww. łowisk charakteryzowały się następująco:

- **Świątajno (Narty)** – przewaga drapieżników, głównie okonia (53,8%) i szczupaka (32,7%);
- **Warchałdzkie** – przewaga mniej cennych gatunków karpiowatych łącznie 52,1% w umiarkowanej równowadze z drapieżnymi głównie szczupakiem łącznie z okoniem i węgorzem stanowiącym 44,7%);
- **Malszeweckie** – przewaga mniej cennych gatunków karpiowatych (98,4%);
- **Burdąg** – przewaga mniej cennych gatunków karpiowatych (88,7%);
- **Piasutno** – wysoki odsetek lina (26,1%);
- **Nożyce** – wysoki odsetek szczupaka (40,4%) i 24,2% okonia;
- **Machniacz** – dość wysoki odsetek szczupaka (26%);

- **Lemańskie** – wysoki odsetek szczupaka (33,8%) i lina (30,6%);
- **Rekowe** – przewaga mniej cennych gatunków karpiowatych (78,5%);
- **Sędańskie** – przewaga mniej cennych gatunków karpiowatych (71,3%);
- **jeziora Plociczno, Natać, Staw Kobylocha, Głębozec (w obw. J. Rekowe), Łażnica, Skonieczne, Średnie, Fręcki, Borówko, Zielonka, Jasne** – zarejestrowane odłowy poniżej 25 kg, stąd też można jedynie wspomnieć o znaczących udziałach drapieźników (głównie szczupaka i okonia) w tych łowiskach (58,7% w jeziorze Skonieczne, czy 44% w jeziorze Średnim).

3. Inne łowiska

3.1. Glinianki Zielonka (Tabela nr 9, Rys. 24)

W sezonie 2017 Glinianki w Zielonce k/Wołomina odwiedziło 63 wędkarzy, którzy zarejestrowali swe połowy na poziomie 758,2 kg ryb, a na 1 wędkarza spędzającego nad wodą średnio 13,52 dnia, dziennie przypadało średnio 0,89 kg ryb, a rocznie 13,52 kg.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska składała się z 12 taksonów (Rys. 24). Grupa drapieźników – szczupak (17,1%), okoń (1,5%) oraz pojedyncze osobniki sandacza i węgorza, łącznie stanowiła 19,4% połowów. Wysokim odsetkiem (47,5%) charakteryzował się średnio 3,83-kilogramowy karp. Płoc (6,3%) wraz z leszczem (4,6%) oraz wzdręgą i krąpiem łącznie stanowiły 11%. Rzadziej łwiony karaś srebrzysty stanowił 4,6%. Lin o średniej masie 1,35 kg z udziałem 9,8% oraz amur (7,7%; średnia masa 5,84 kg) uzupełniały pulę odłowów z tego łowiska, czyniąc je dość urozmaiconym i ciekawym pod względem wędkarskim.

3.2. Jezioro Toczyłowo (Tabela nr 11)

W jeziorze Toczyłowo w roku 2017 całkowite zarejestrowane przez 101 wędkarzy odłowy wędkarskie wyniosły 680,8 kg ryb. Wędkarze spędzali średnio 7,86 dnia na łowisku i zarejestrowali swe połowy na dziennym poziomie średnio 0,86 kg, a w ciągu roku po 6,74 kg.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska składała się z 13 taksonów. Łwiono tu łącznie 40,5% drapieźników, przy czym ponownie najwięcej było okonia z udziałem 27%, szczupaka 12,2%, a udziały sandacza, suma i bolenia nie przekraczały 1%. Leszcz, płoc, krąp i wzdręga stanowiły odpowiednio 23,7%, 22,2%, 0,5 i 0,2%, co łącznie dało odsetek 46,7%. Ciekawym urozmaiceniem składu gatunkowego odłowów były 2,72-kilogramowy karp (6,8%) i średnio 1,02-kilogramowy lin (5,7%) i oraz pojedyncze sztuki karasia pospolitego i klenia.

3.3. Glinianki Grodzisk (Tabela nr 12, Rys. 25)

Warunki wędkowania w omawianym łowisku w roku 2017 charakteryzowały następujące parametry: swoje połowy zarejestrowało 63 wędkarzy na poziomie 560,2 kg ryb, co dało wskaźnik średnio 0,48 kg w 1 dniu wędkowania oraz 8,89 kg w ciągu roku, a pojedynczy wędkarz spędzał na łowisku 18,57 dni.

Struktura gatunkowa zarejestrowanych odłowów składała się z ponad 12 taksonów ryb (Rys. 25), z czego najczęściej złowiono średnio 1,70-kilogramowego karpia (55,7%). Grupa drapieźników stanowiła łącznie 10,3%, przy czym udział szczupaka wyniósł 7,1%, sandacza 1,5%, okonia 1,1%, a węgorza 0,6%. Poza tym, z pozostałych gatunków warto wymienić 10,9% średnio 2,27-kilogramowego amura, 9,3% leszcza, 7,9% lina, 3,3% karasia srebrzystego, 1,9% płoci oraz 0,6% krąpia. Można określić omawiane łowisko dość urozmaiconym i ciekawym pod względem wędkarskim.

3.4. Staw Krzywie (Tabela nr 16, Rys. 26)

W omawianym łowisku w roku 2017 zarejestrowało swoje połowy 27 wędkarzy, a sumaryczny odłów osiągnął 308,8 kg ryb, przy średnim rocznym odłowie na 1 wędkującego 11,44 kg i odłowie dziennym na poziomie 0,37 kg. Wędkarze spędzali średnio aż 30,93 dni nad wodą w ciągu roku.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 11 taksonów ryb (Rys. 26). Na gatunki karpiołate rejestrowane najczęściej (łącznie stanowiące 38,9%) składały się leszcz (19,3%), bardzo drobna płoć (16,3%), krąp z udziałem 3% i wzdręga 0,3%. Drapieźniki – szczupak z sandaczem i okoniem stanowiły łącznie 34,6% złowionych ryb, z czego udziałowi szczupaka wynoszącemu 20,3% towarzyszyły 14,2% sandacza i jedna sztuka okonia. Udział średnio 0,77-kilogramowego lina wynosił 9,9%, a pozostałe gatunki występowały w znacznej mniejszości. Atrakcją łowiska był też niewątpliwie 15,4% udział średnio prawie dwukilogramowego karpia.

3.5. Jezioro Ługowskie (Tabela nr 17)

W roku 2017 w jeziorze Ługowskim całkowity zarejestrowany przez 44 wędkarzy odłów wyniósł 291,2 kg ryb, którzy średnio łowili 0,92 kg ryb dziennie oraz rocznie 6,62 kg.

W omawianym sezonie w składzie odłowów wędkarskich z omawianego jeziora wystąpiło 11 gatunków ryb. Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska zdominowana była przez mniej cenione karpiołate (86,7%), a głównie płoć (71,5%), leszcza (11,8%), krąpia (3,2%), wzdręgę i ukleję. Wobec takiej dominacji odnotowano jedynie 7,3% okonia oraz po kilka sztuk szczupaka i węgorza. Kilkanaście sztuk lina (2,7%) oraz pojedyncze egzemplarze karasia srebrzystego i pospolitego uzupełniały pulę taksonów w jeziorze. Warunki wędkowania w jeziorze Ługowskim, jak i w poprzednich sezonach nie były szczególnie urozmaicone pod względem atrakcyjności gatunkowej.

3.6. Jezioro Zdwońskie (Tabela nr 18)

W sezonie 2017 w jeziorze Zdwońskim całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 287,0 kg ryb, a na jednego z 50 wędkarzy, którzy zarejestrowali swe połowy dziennie przypadało średnio 0,46 kg, przy średnim rocznym odłowie na 1 wędkującego 5,74 kg i średnio 12,46 dniach spędzonych na łowisku.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska składała się z 14 taksonów. Największym łącznym udziałem (52,5%) charakteryzowała się grupa mniej cenionych karpiowatych, a w tym 41,1% leszcza, 9,4% płoci, 0,8% wzdręgi, 0,8% krąpia, 0,3% jazgarza oraz 0,2% uklei. Drapieżniki łącznie stanowiły 40,6%, a w grupie tej wyróżniał się ponownie szczupak (15%) o wysokiej średniej masie pojedynczego osobnika 2,16 kg. Towarzyszyły mu średnio 2,57-kilogramowy sandacz (12,5%), węgorz (5,2%), okoń (4,1%) oraz jedna sztuka suma (3,7%). Ponadto, zanotowano 3,7% karasia srebrzystego oraz pojedyncze sztuki karpia (2,8%) i lina, które podnosiły nieco atrakcyjność tego łowiska.

3.7. Glinianki Błonie (Tabela nr 20, Rys. 27)

Warunki wędkowania w omawianych Gliniankach w roku 2017 charakteryzowały następujące parametry: swoje połowy zarejestrowało tutaj 36 wędkarzy na poziomie 241,3 kg ryb, co dało wskaźnik średnio 0,23 kg w 1 dniu wędkowania oraz 6,70 kg w ciągu roku, a pojedynczy wędkarz spędzał na łowisku aż 28,64 dni.

Struktura gatunkowa zarejestrowanych odłowów składała się z 10 taksonów ryb (Rys. 27), z czego najwięcej złowiono średnio 1,82-kilogramowego karpia (71,7%). Wobec takiej przewagi pozostałych gatunków warto wymienić 7,9% karasia srebrzystego, 6,6% leszcza, 5,3% lina, a rzadziej zanotowane płoć, amura i krąpia. Ze sporadycznie łowionej grupy drapieżników odnotowano jedynie 6,1% szczupaka oraz łowione pojedynczo, okonia i węgorza.

3.8. Jezioro Białe (Tabela nr 23, Rys. 28)

W jeziorze Białym zarejestrowało swoje połowy 24 wędkarzy, a łączny odłów wyniósł 211,2 kg, co dało średni wskaźnik dziennego odłowu na 1 wędkarza na poziomie 0,72 kg i roczny 8,80 kg, przy 12,17 dniach spędzonych nad wodą.

W odłowach wśród jedynie 5 zarejestrowanych gatunków (Rys. 28) wysokim udziałem (44,7%) charakteryzowała się grupa mniej cenionych karpiowatych, gdzie leszcz stanowił 27,4%, a płoć 17,3%. Jednakże, w znacznej przeciwstawie drapieżniki stanowiły łącznie 52% zarejestrowanych ryb. Były to tylko dwa taksony – średnio 1,94-kilogramowy szczupak (46,9%) i okoń (5,1%). W odłowach zanotowano także 4 sztuki średnio 1,73-kilogramowego lina (3,3%). Łowisko można uznać za dość ciekawe pod względem wędkarskim.

3.9. Jezioro Ostrowąs (Plebanka) (Tabela nr 25, Rys. 29)

W roku 2017 w omawianym jeziorze swoje połowy zarejestrowało 21 wędkarzy, łowiących w sumie 201,1 kg ryb, średnio 9,58 kg w ciągu roku i 1,18 kg w 1 dniu wędkowania, spędzając nad wodą średnio 8,14 dnia.

Struktura gatunkowa zarejestrowanych odłowów składała się z 10 taksonów (Rys. 29). Pierwsza w kolejności, to grupa mniej cennych karpiowatych, z czego najwięcej stanowił leszcz (36,9%), płóc 13,5%, a krąp 1,4% (łącznie 51,8%). W nieco mniejszej ilości pozostawał łączny udział (35,1%) drapieźników, z których najwięcej złowiono średnio 1,61-kilogramowego szczupaka (16%), a dalej sandacza (15,9%) oraz 2,1% węgorza i 1,1% okonia. W odłowach zanotowano także karasia pospolitego (11,6%) oraz pojedyncze sztuki lina oraz karasia srebrzystego. Warunki wędkowania w jeziorze Ostrowąs można określić jako dość ciekawe.

3.10. Stawy w Parku Pruszków (Tabela nr 27, Rys. 30)

W sezonie 2017 w omawianym zbiorniku całkowite zanotowane odłowu wędkarskie wyniosły 196,8 kg ryb, każdy z 28 wędkarzy, którzy spędzali średnio 13,54 dni na łowisku zarejestrował swe połowy na średnim poziomie 0,52 kg ryb dziennie i 7,03 kg rocznie.

W strukturze odłowów wędkarskich z omawianego zbiornika zarejestrowano ponad 10 gatunków ryb (Rys. 30). Na pierwszym miejscu znalazł się średnio 2,28-kilogramowy karp z udziałem 31,3%. Drapieźniki stanowiły łącznie 22,6%, z czego najwięcej złowiono średnio 1,71-kilogramowego szczupaka (16,5%) oraz okonia (6,1%). Grupa mniej cennych karpiowatych, reprezentowana była przez płóc z udziałem 10,8%, leszcza (5,8%), wzdręę (1,5%) oraz pozostałe drobne gatunki. W odłowach zanotowano także karasia srebrzystego (20,9%), lina (6,1%) oraz pojedynczo karasia pospolitego.

3.11. Jezioro Przytomne (Tabela nr 31)

W jeziorze Przytomne w 2017 roku 35 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 171,7 kg ryb ogółem, spędzając na łowisku średnio 7,80 dni, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 4,91 kg i 0,63 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 8 taksonów. Z grupy mniej cennych karpiowatych, które łącznie stanowiły 49,8% wszystkich zarejestrowanych w opisywanym jeziorze ryb leszcz stanowił 30,3%, płóc 17,2%, krąp 2,2% oraz jedna sztuka wzdręgi. Drapieźniki, które stanowiły łącznie 40,1% reprezentowane były przez średnio 1,59-kilogramowego szczupaka (34,2%) oraz średnio 0,31-kilogramowego okonia (5,9%). Należy podkreślić obecność lina, który stanowił 6,5% oraz pojedyncze egzemplarze karpia. W sumie jezioro Przytomne należy ocenić jako dość atrakcyjne łowisko Mazowieckiego Okręgu PZW.

3.12. Jezioro Wikaryjskie (Tabela nr 32)

W jeziorze Wikaryjskim w 2017 roku 44 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 170,6 kg ryb ogółem, spędzając na łowisku średnio 6,57 dni, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 3,88 kg i 0,59 kg. Opisywane parametry, poza frekwencją, praktycznie pozostały na podobnym poziomie, jak w roku 2016.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 9 taksonów. Z grupy mniej cennych karpiovatych, które łącznie stanowiły 72,4% wszystkich zarejestrowanych w opisywanym jeziorze ryb drobny leszcz stanowił 35,5%, płoć 31,2%, wzdręga 5% oraz krąp 0,7%. Grupa drapieżników, które stanowiły łącznie 17,5% zdecydowanie reprezentowana była przez średnio 1,30-kilogramowego szczupaka (14,5%) oraz kilkanaście sztuk okonia (1,7%) i pojedyncze węgorze (1,4%). Należy podkreślić udział lina z udziałem 8,3% oraz średnio trzykilogramowego karpia, który stanowił 1,8%. W sumie jezioro Wikaryjskie należy ocenić jako dość ciekawe łowisko Mazowieckiego Okręgu PZW.

3.13. Stawy Talar i Montoprzem (Tabela nr 34)

W omawianym łowisku w roku 2017 zarejestrowało swoje połowy 24 wędkarzy, a sumaryczny odłów osiągnął 160,6 kg ryb, przy średnim rocznym odłowie na 1 wędkującego 6,69 kg i odłowie dziennym na poziomie 0,42 kg. Wędkarze spędzali średnio 16 dni nad wodą w ciągu roku.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 8 taksonów ryb. Atrakcją łowiska był też niewątpliwie 74,2% udział średnio 1,19-kilogramowego karpia. Na pozostałe gatunki rejestrowane składały się szczupak (9,5%), leszcz (7,7%), płoć (5,2%), karaś srebrzysty (1,9%), okoń (0,8%) oraz po jednej sztuce lin i jaź.

3.14. Jezioro Pomocnia (Tabela nr 36, Rys. 31)

W jeziorze Pomocnia w 2017 roku 20 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 143,2 kg ryb ogółem, spędzając na łowisku średnio 8,70 dni, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 7,16 kg i 0,82 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 6 taksonów (Rys. 31). Najwyższym udziałem (34,4%) w odłowach z tego łowiska wyróżniał się karp o średniej masie 2,89 kg. Z grupy mniej cennych karpiovatych, które łącznie stanowiły 43,2% wszystkich zarejestrowanych w opisywanym jeziorze ryb płoć stanowiła 33%, a leszcz 10,2%. Drapieżniki, które stanowiły łącznie 21,2% reprezentowane były przez średnio 2,19-kilogramowego szczupaka (18,4%) oraz średnio 0,25-kilogramowego okonia (2,8%). Należy podkreślić obecność dwóch sztuk lina, który stanowił 1,3%.

3.15. Zbiornik Chorzele (Tabela nr 38, Rys. 32)

W sezonie 2017 w omawianym zbiorniku całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 137,6 kg ryb, każdy z 60 wędkarzy, którzy spędzali średnio 7,18 dni na łowisku zarejestrował swe połowy na średnim poziomie 0,32 kg ryb dziennie i 2,29 kg rocznie.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska, składała się z 8 gatunków (Rys. 32). Najwyższym udziałem (67,7% połowów) odznaczył się karp o średniej masie 3,33 kg. Wobec takiej dominacji pozostałe gatunki występowały w mniejszości. Grupa mniej cennych karpiovatych, to jedynie bardzo drobna płoć z udziałem 7,9% i dwie sztuki leszcza (1,8%). Drapieżniki (szczupak i sandacz) stanowiły łącznie 3,1% zarejestrowanych ryb. W odłowach zanotowano także karasia srebrzystego (6,6%), lina (6,5%) oraz karasia pospolitego (6,4%).

3.16. Jeziórko Moczydło (Tabela nr 39, Rys. 33)

W omawianym łowisku w roku 2017 zarejestrowało swoje połowy 21 wędkarzy, a sumaryczny odłów osiągnął 132,2 kg ryb, przy średnim rocznym odłowem na 1 wędkującego 6,30 kg i odłowem dziennym na poziomie 0,56 kg. Wędkarze spędzali średnio 11,24 dni nad wodą w ciągu roku.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się ponad 7 taksonów ryb (Rys. 33). Urozmaicenie struktury odłowów wynikało z zarejestrowanych następująco udziałów poszczególnych gatunków. Atrakcją łowiska był też niewątpliwie 33,4% udział średnio 2,10-kilogramowego karpia. Wśród pozostałych należy wymienić: średnio 2,78-kilogramowego szczupaka (16,8%), lina (15,4%), karasia srebrzystego (14,5%), okonia (14,2%), leszcza (2,3%), „pozostałe” drobne gatunki (3%) oraz jedną sztukę klenia.

3.17. Jezioro Grójeckie (Tabela nr 40)

W roku 2017 w omawianym zbiorniku wodnym całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 124,9 kg ryb, średni roczny i dzienny odłów na jednego z 27 wędkarzy, przebywających średnio 5,22 dni na łowisku, osiągnął odpowiednio 4,63 kg i 0,89 kg.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska, składająca się z 10 taksonów, była dość zróżnicowana. Dość znaczącym udziałem (43,7%) charakteryzowała się grupa mniej cenionych karpiovatych, gdzie płoć stanowiła 22,7%, leszcz 19%, a ukleja 2%. Przy takim stosunku drapieżniki stanowiły łącznie 33,3% zarejestrowanych ryb. Był to szczupak (22,5%), sandacz z udziałem 8,8%, okoń (1,4%) i jedna sztuka węgorza. W odłowach zanotowano także kilkanaście osobników lina (8,7%) oraz 8,1% karasia srebrzystego.

3.18. Jezioro Ciechomickie (Tabela nr 41)

W sezonie 2017 w jeziorze Ciechomickim całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 122,2 kg ryb, a na jednego z 34 wędkarzy, którzy spędzali średnio 7,41 dni na łowisku oraz zarejestrowali swe połowy, dziennie przypadało średnio 0,48 kg ryb, a rocznie 3,59 kg.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska, składała się z 9 gatunków. Ponad połowę połowów stanowiły łącznie (56,6%) drapieżniki: średnio 2,03-kilogramowy szczupak z udziałem 19,9%, sandacz (18,7%), węgorz (9,8%) i okoń (8,2%). Dość istotnym udziałem (33,1%) charakteryzowała się grupa mniej cenionych karpiowatych, gdzie leszcz stanowił 26,9%, a płoć 6,1%. Należy ponadto wymienić średnio 2,18-kilogramowego karpia (7,1%), lina (3%) oraz jedyną sztukę karasia srebrzystego.

3.19. Glinianki Gołków, Głosków, Zalesie (Tabela nr 42)

W 2017 roku 18 wędkarzy odłowiło i zarejestrowało na omawianym łowisku swe połowy na poziomie 117,9 kg ryb, spędzając dziennie nad wodą średnio 6,61 dni, przy średnim rocznym i dziennym odłowieniu na 1 wędkującego w wysokości odpowiednio 6,55 kg i 0,99 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 9 taksonów. Jeżeli chodzi o drapieżniki łącznie stanowiące 16% odłowionych ryb, to szczupak stanowił 9,2%, okoń 5,6%, a jedna sztuka sandacza 1,3%. Ponadto, łowiono gatunki charakterystyczne dla tego typu wód – średnio 2,19-kilogramowego karpia (27,9%) będącego zdecydowaną atrakcją omawianego łowiska, oraz płoć (28,2%), karasia srebrzystego (14,2%), lina (8,7%), leszcza (2,8%) i jednego amura (2,2%).

3.20. Jezioro Skrzyneckie (Tabela nr 43, Rys. 34)

W sezonie 2017 w jeziorze Skrzyneckie całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 117,2 kg ryb. Średnio każdy z 28 wędkarzy zarejestrował połowy na poziomie 0,59 kg dziennie, a w ciągu roku po 4,19 kg spędzając na łowisku 7,04 dnia.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska składała się z 9 taksonów (Rys. 34). Najwięcej (42,2%) złowiono tu drobnej płoci, a poza nią w grupie mniej cenionych karpiowatych udział wzdregi wynosił (3,8%), a leszcza 1,7%. Na drapieżniki łącznie stanowiące 33,9% połowów z jeziora Skrzyneckie składały się udziały 1,78-kilogramowego szczupaka (25,8%), któremu towarzyszył okoń z udziałem 6,8% i jedna sztuka sandacza. Ponadto, lin z odsetkiem 11,2% oraz 1,45-kilogramowy karp z odsetkiem 5% i karaś srebrzysty (2,8%) uzupełniały pulę odłowów z jeziora Skrzyneckie.

3.21. Jezioro Górskie (Tabela nr 46)

W roku 2017 w jeziorze Górskim całkowity zarejestrowany odłów wyniósł 105,8 kg ryb, a to za sprawą 21 wędkarzy, którzy średnio łowili 0,46 kg ryb dziennie oraz rocznie 5,04 kg, spędzając na łowisku 11,05 dnia.

W strukturze odłowów wędkarskich z omawianego jeziora wystąpiło 7 gatunków ryb. Pierwsza grupa mniej cennych karpiowatych, reprezentowana była przez dość atrakcyjnego (średnio 0,70 kg) leszcza z udziałem 37,9% i płoć z odsetkiem 21,5%. Grupa ta stanowiła łącznie 59,4% odłowów. Wobec tych udziałów w niewielkiej przeciwwadze pozostawał łączny udział drapieźników (26,4%), przy czym najwięcej złowiono średnio 1,23-kilogramowego szczupaka (17,5%), dalej 5,1% okonia i 3,8% węgorza. W odłowach zanotowano ponadto kilka sztuk średnio 1,37-kilogramowego lina (9,1%) oraz karasia srebrzystego (5,2%). Można uznać omawiane łowisko jako dość ciekawe pod względem wędkarskim.

3.22. Skoki I (Tabela nr 47)

W roku 2017 w omawianym zbiorniku wodnym swoje połowy zarejestrowało 36 wędkarzy, łowiących w sumie 103,4 kg ryb, co dało wskaźnik średnio 0,49 kg w 1 dniu wędkowania oraz 2,87 kg w roku na 1 wędkarza, który średnio spędzał 5,89 dnia na omawianym łowisku.

Struktura gatunkowa zarejestrowanych odłowów składała się z 10 taksonów. Z gatunków mniej cenionych karpiowatych łowiono głównie leszcza (34%), płoć (30,7%), krąpia (1,7%), a znacznie rzadziej wzdręę i ukleję. Znacznie rzadziej łowiono drapieźniki – średnio 2,11-kilogramowego szczupaka z udziałem 18,4%, okonia 7,3% oraz węgorza. Warto wspomnieć o kilku egzemplarzach karasia srebrzystego (3,4%) oraz karpia (1,9%).

3.23. Pozostałe łowiska okręgu

Jezioro Karaśnia (Tabela nr 50), Jezioro Lutoborskie (Tabela nr 51), Jezioro Skrwilno (Tabela nr 52), Zalew w Makowie Mazowieckim (Tabela nr 55), Glinianki Szczęśliwickie (Tabela nr 58), Jezioro Służewo (Tabela nr 60), Jezioro Bytoń (Tabela nr 62), Jezioro Huta (Tabela nr 63), Jezioro Ostrowickie (Tabela nr 65), Jezioro Mierucie (Tabela nr 66), Glinianka Włochy (Tabela nr 67), Glinianki Borowe (Tabela nr 69), Jezioro Okonin (Tabela nr 71), Jezioro Telążyna (Tabela nr 72), Jezioro Czarno-Czerskie (Tabela nr 73), Jezioro Czarne Włocławskie (Tabela nr 75), Jezioro Łuba (Tabela nr 76), Jezioro Lubiechowo (Tabela nr 77), Jezioro Borowiec (Wildno) (Tabela nr 80), Jezioro Brzeźno (Tabela nr 81), Jezioro Rybnica (Tabela nr 85), Jezioro Widoń (Tabela nr 86), Zbiornik Rogal (Tabela nr 87), Jezioro Peł (Tabela nr 89), Jezioro Chojno (Tabela nr 90), Jezioro Białobrzegi (Tabela nr 91), Jezioro Trzebowo (Tabela nr 92), Jezioro Głębozec (na cieku bez nazwy) (Tabela nr 93), Młyński Staw (Tabela nr 94), Jezioro Łąki Zawistowe (Tabela nr 95), Staw Wielgie (Tabela nr 96), Sierpienica (Tabela nr 97), Jezioro Kępka Szlachecka (Tabela nr 99), Jezioro Radziszewo (Tabela nr 100), Jezioro Świesz (Tabela nr

103), Jezioro Czarne Gostynińskie (Tabela nr 104), Staw Ruda (Tabela nr 106), Basen Brwinów (Tabela nr 107), Basen Kolejniak (Tabela nr 108), Jezioro Czarne Baruchowo (Tabela nr 109), Jezioro Szczutkowskie (Tabela nr 111), Glinianka Bagienice (Tabela nr 112), Moltawa (Tabela nr 114), Jezioro Radzynek (Paproty) (Tabela nr 115), Kocioł (Tabela nr 116), Wymysłów (Tabela nr 121), Glinianki Szczęśliwickie (Tabela nr 122).

Na wymienionych zbiornikach będących w użytkowaniu okręgu w nadesłanych rejestrach odłowy wędkarskie nie przekraczały 100 kg. Wśród ww. łowisk wyróżnić można jedynie te, które charakteryzuje znaczący udział gatunków atrakcyjnych wędkarsko:


- wysoki odsetek szczupaka – **J. Czarne Gostynińskie (73,3%), J. Mierucie (61,8%), Staw Ruda (59%); J. Szczutkowskie (54,9%); Zbiornik Rogal (51,5%); J. Telążyzna (43,5%), Motława nr 1 (38,4%); J. Okonin (35,4%), Basen Brwinów (33,3%); J. Łuba (31,4%);**
- wysoki odsetek karpia – **Basen Kolejniak (91,7%); Glinianka Bagienice (76%); Zalew w Makowie Mazowieckim (61%), Kocioł (60%); Basen Brwinów (53,3%); Glinianki Borowe (51,7%), J. Czarne Włocławskie (32,8%);**
- wysoki odsetek lina – **Staw Wielgie (77,9%), J. Trzebowo (72,6%), J. Brzeźno (61,2%), Jezioro Radziszewo (58,1%), J. Chojno (39,3%), J. Telążyzna (35,1%), J. Lubiechowo (32,7%), Jezioro Radzynek (Paproty) (31,6%).**

III. Podsumowanie


Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki analizy rejestrów połowów uzyskanych przez członków Okręgu Mazowieckiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 2017 roku pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków natury ogólniejszej:

- Całkowity odłów zarejestrowany we wszystkich objętych opracowaniem wodach, osiągnięty przez badaną populację wędkarzy wyniósł w 2017 roku prawie 46,7 ton ryb, na jednego wędkarza przypadła średni roczny odłów w wysokości 5,98 kg, zaś średni dzienny odłów uzyskany przez 1 wędkującego osiągnął poziom 0,58 kg ryb. Były to parametry niższe, niż badane w poprzednim roku prawdopodobnie ze względu na niższą efektywność połowów, gdyż liczba zwróconych rejestrów wędkarskich była nieco wyższa (6954 rejestrów w 2016, a 7809 w 2017 r.). Nie można także wykluczyć, że część wędkarzy wypuszczała złowione ryby (Catch & Release) i nie wpisywała danych o ich złowieniu do rejestrów połowów, co rzecz jasna wpłynęło na zmniejszenie wskaźnika średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego. Poddana badaniom liczba rejestrów (7809) stanowiła, 10,8% ogólnej liczby członków mazowieckiego Okręgu PZW w 2017 roku.

• Wyniki analizy rejestrów z 2017 roku potwierdziły większość wniosków wypływających z analizy rejestrów połowów z 2016 roku i lat wcześniejszych. W badaniach tych podobnie wyglądała hierarchia najważniejszych łowisk, w większości z nich uzyskano zbieżne wyniki charakteryzujące struktury gatunkowe odłowów, a zatem i zbieżne oceny wędkarskiej atrakcyjności poszczególnych łowisk. Po obwodzie rybackim Narew Nr 7 najważniejsze łowiska Okręgu są następujące: Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5, Narew Nr 6, Wisła Nr 4, Narew Nr 8, Wisła Nr 3, Bug Nr 5, Skrwa Prawa Nr 1. W większości z wymienionych w opracowaniu obwodów rybackich uzyskano bardzo atrakcyjne struktury odłowów wędkarskich, w których wystąpiły poprawne relacje między najbardziej cennymi i atrakcyjnymi gatunkami drapieżnymi a grupą mniej cennych gatunków karpiowatych, reprezentowaną przez leszcza, płoć i krapia. Do najbardziej atrakcyjnych łowisk zaliczamy te, w których zanotowano największe udziały gatunków drapieżnych – **szczupaka, sandacza, okonia, suma, bolenia, miętusa i węgorza**. Poza obwodami Szkwa nr 1, Skrwa Prawa Nr 1, Biebrza Nr 3 (Wissa), Bzura Nr 1, Narew Nr 8, Zgłowiączka nr 2, Narew Nr 6, Jezioro nr 1, Wisła Nr 3, Wisła Nr 4, Rzeka Ełk nr 45, Rozoga Nr 1 i Bug Nr 5 we wszystkich pozostałych udział drapieżników przekraczał 40% zarejestrowanych odłowów. Najwyższe odsetki tych gatunków zanotowaliśmy w następujących obwodach: Jegrznia Nr 11 (100%), Orzyc Nr 1 (56,7%), Świder nr 1 (55,3%), Brok Nr 1 (54,9%), Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5 (53%), Nurzec Nr 1 (49,8%), Omulew Nr 1 (47,2%), Utrata Nr 1 (45,6%), Rządza Nr 1 (45,3%), Orz Nr 1 (44,7%). Także w najważniejszym dla wędkarzy obwodzie Narew Nr 7 odsetek drapieżników w odłowach wędkarskich był stosunkowo wysoki i wynosił 33,5%. Warto zaznaczyć, że w przypadku większości rozpatrywanych obwodów rybackich udziały gatunków drapieżnych były wysokie, co dobrze świadczy o gospodarce zarybieniowej prowadzonej przez Okręg.



Rys. 1. Narew nr 7 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2017 (100% = 12 946 kg)



Rys. 2. Zbiornik Włocławski - struktura odłowów wędkarskich w roku 2017 (100% = 3 707 kg)

WSZYSTKIE ŁOWISKA

L.p.	Łowisko	Pow. zbiornika (ha)	Liczba wędkarzy	Presja (dni)	Całkowity odłów (kg)	Kg ryb na wędkarza	Liczba dni na wędkarza	Kg ryb na 1 dzień wędkowania	Kg/ha	Presja dni/ha
1	Narew 7 (Zbiornik Zegrzyński)	3787,00	1311	17564	12946,1	9,87	13,40	0,74	3,42	4,64
2	Zbiornik Włocławski	7911,00	411	5378	3707,0	9,02	13,09	0,69	0,47	0,68
3	Narew 6	1025,00	934	11846	3409,3	3,65	12,68	0,29	3,33	11,56
4	Wisła 4	3240,00	252	3284	3398,5	13,49	13,03	1,03	1,05	1,01
5	Narew 8	487,00	260	3351	3123,7	12,01	12,89	0,93	6,41	6,88
6	Wisła 3	4281,00	402	4181	3064,3	7,62	10,40	0,73	0,72	0,98
7	Bug 5	1176,00	741	10857	2749,4	3,71	14,65	0,25	2,34	9,23
8	Skrwa Prawa	139,50	250	1566	2327,2	9,31	6,26	1,49	16,68	11,23
9	Glinianki Zielonka	26,00	63	852	758,2	12,03	13,52	0,89	29,16	32,77
10	J. Sasek Wielki	887,90	165	714	684,1	4,15	4,33	0,96	0,77	0,80
11	J. Toczyłowo	105,00	101	794	680,8	6,74	7,86	0,86	6,48	7,56
12	Glinianki Grodzisk	25,00	63	1170	560,2	8,89	18,57	0,48	22,41	46,80
13	Elk 45	112,00	62	442	499,1	8,05	7,13	1,13	4,46	3,95
14	Rozoga 1	104,00	293	2037	433,0	1,48	6,95	0,21	4,16	19,59
15	Orzyc 1	209,00	248	1402	330,7	1,33	5,65	0,24	1,58	6,71
16	Krzywie	21,00	27	835	308,8	11,44	30,93	0,37	14,70	39,76

17	J. Ługowskie	62,20	44	316	291,2	6,62	7,18	0,92	4,68	5,08
18	J. Zdvorskie	340,00	50	623	287,0	5,74	12,46	0,46	0,84	1,83
19	J. Wałpusz	431,60	80	375	275,3	3,44	4,69	0,73	0,64	0,87
20	Glinianki Błonie	6,00	36	1031	241,3	6,70	28,64	0,23	40,22	171,83
21	Jeziorka 1	120,00	19	159	228,3	12,02	8,37	1,44	1,90	1,33
22	Brok 1	45,00	130	874	213,2	1,64	6,72	0,24	4,74	19,42
23	J. Białe	148,00	24	292	211,2	8,80	12,17	0,72	1,43	1,97
24	J. Sasek Mały	332,40	116	334	209,2	1,80	2,88	0,63	0,63	1,00
25	J. Ostrowąs (Plebanka)	42,10	21	171	201,1	9,58	8,14	1,18	4,78	4,06
26	Biebrza 3 (Wissa)	17,00	17	168	197,6	11,62	9,88	1,18	11,62	9,88
27	Stawy w Parku	7,00	28	379	196,8	7,03	13,54	0,52	28,11	54,14
28	Omulew 1	189,00	96	518	191,4	1,99	5,40	0,37	1,01	2,74
29	J. Klimek (Konik)	35,90	37	85	190,9	5,16	2,30	2,25	5,32	2,37
30	J. Małszewskie	208,80	40	202	179,6	4,49	5,05	0,89	0,86	0,97
31	J. Przytomne	38,00	35	273	171,7	4,91	7,80	0,63	4,52	7,18
32	J. Wikaryjskie	66,50	44	289	170,6	3,88	6,57	0,59	2,57	4,35
33	Nurzec 1	153,00	61	352	169,1	2,77	5,77	0,48	1,11	2,30
34	Stawy Talar i Montoprzem	5,00	24	384	160,6	6,69	16,00	0,42	32,12	76,80
35	J. Brajnckie	211,00	76	263	148,9	1,96	3,46	0,57	0,71	1,25
36	J. Pomocnia	9,00	20	174	143,2	7,16	8,70	0,82	15,91	19,33
37	Rządza 1	42,00	50	291	138,1	2,76	5,82	0,47	3,29	6,93
38	Zbiornik Chorzele	5,00	60	431	137,6	2,29	7,18	0,32	27,52	86,20
39	Jeziórko Moczydło	4,00	21	236	132,2	6,30	11,24	0,56	33,05	59,00
40	J. Grójeckie	27,90	27	141	124,9	4,63	5,22	0,89	4,48	5,05
41	J. Ciechomiczkie	47,00	34	252	122,2	3,59	7,41	0,48	2,60	5,36
42	Glinianki Gołków, Głosków, Zalesie	19,00	18	119	117,9	6,55	6,61	0,99	6,21	6,26
43	J. Skrzyneckie	26,90	28	197	117,2	4,19	7,04	0,59	4,36	7,32
44	Utrata 1	46,00	28	165	110,8	3,96	5,89	0,67	2,41	3,59
45	J. Grom	216,20	17	52	109,2	6,42	3,06	2,10	0,51	0,24
46	J. Górskie	45,00	21	232	105,8	5,04	11,05	0,46	2,35	5,16
47	Skoki I	46,90	36	212	103,4	2,87	5,89	0,49	2,20	4,52
48	Staw Jedwabne	3,00	12	71	102,1	8,51	5,92	1,44	34,03	23,67
49	Orz 1	23,00	118	612	92,3	0,78	5,19	0,15	4,01	26,61
50	J. Karaśnia	46,00	12	92	87,0	7,25	7,67	0,95	1,89	2,00
51	J. Lutoborskie	22,30	23	147	85,8	3,73	6,39	0,58	3,85	6,59
52	J. Skrwilno	87,70	16	133	76,3	4,77	8,31	0,57	0,87	1,52
53	Świder 1	90,00	15	241	74,2	4,95	16,07	0,31	0,82	2,68
54	Zgłowiączka	23,00	10	112	71,8	7,18	11,20	0,64	3,12	4,87
55	Zalew w Makowie Mazowieckim	17,00	70	437	69,2	0,99	6,24	0,16	4,07	25,71
56	J. Świętajno (Narty)	217,20	25	79	68,2	2,73	3,16	0,86	0,31	0,36
57	J. Warchałdzkie	46,40	20	79	66,6	3,33	3,95	0,84	1,44	1,70
58	Glinianki Szczęśliwickie	7,00	11	93	64,3	5,85	8,45	0,69	9,19	13,29

59	J. Malszeweckie	36,61	12	46	61,8	5,15	3,83	1,34	1,69	1,26
60	J. Służewo	4,70	14	58	60,1	4,29	4,14	1,04	12,79	12,34
61	J. Burdąg	38,90	16	82	58,2	3,64	5,13	0,71	1,50	2,11
62	J. Bytoń	10,30	8	71	57,8	7,23	8,88	0,81	5,61	6,89
63	J. Huta	34,50	17	76	56,3	3,31	4,47	0,74	1,63	2,20
64	J. Piasutno	49,00	20	68	55,5	2,78	3,40	0,82	1,13	1,39
65	J. Ostrowickie	55,10	14	89	52,3	3,74	6,36	0,59	0,95	1,62
66	J. Mierucie	31,93	11	53	47,6	4,33	4,82	0,90	1,49	1,66
67	Glinianka Włochy	3,00	6	104	47,1	7,85	17,33	0,45	15,70	34,67
68	J. Nożyce	55,00	19	99	44,6	2,35	5,21	0,45	0,81	1,80
69	Glinianki Borowe	4,00	52	229	43,7	0,84	4,40	0,19	10,93	57,25
70	J. Machniacz	12,04	4	27	43,5	10,88	6,75	1,61	3,61	2,24
71	J. Okonin	10,30	13	85	38,4	2,95	6,54	0,45	3,73	8,25
72	J. Telażyna	25,40	7	37	36,8	5,26	5,29	0,99	1,45	1,46
73	J. Czarno-Czerskie	10,10	5	25	36,0	7,20	5,00	1,44	3,56	2,48
74	J. Lemańskie	23,50	16	37	34,6	2,16	2,31	0,94	1,47	1,57
75	Czarne Włocławskie	6,80	14	73	34,5	2,46	5,21	0,47	5,07	10,74
76	J. Łuba	12,00	14	67	33,8	2,41	4,79	0,50	2,82	5,58
77	J. Lubiechowo	19,40	9	47	31,5	3,50	5,22	0,67	1,62	2,42
78	J. Rekowe	70,80	43	85	30,7	0,71	1,98	0,36	0,43	1,20
79	J. Sędańskie	186,00	18	77	30,7	1,71	4,28	0,40	0,17	0,41
80	J. Borowiec (Wildno)	12,80	12	53	30,4	2,53	4,42	0,57	2,38	4,14
81	J. Brzeźno	16,40	4	36	29,9	7,48	9,00	0,83	1,82	2,20
82	Bzura 1	86,0	3	76	28,2	9,40	25,33	0,37	0,33	0,88
83	J. Płociczno	21,70	14	36	24,1	1,72	2,57	0,67	1,11	1,66
84	J. Natać	21,80	6	15	22,9	3,82	2,50	1,53	1,05	0,69
85	J. Rybnica	7,60	10	22	22,7	2,27	2,20	1,03	2,99	2,89
86	J. Widoń	10,00	4	13	22,5	5,63	3,25	1,73	2,25	1,30
87	Zbiornik Rogal	2,00	4	17	20,2	5,05	4,25	1,19	10,10	8,50
88	Staw Kobylocha	39,20	13	46	20,2	1,55	3,54	0,44	0,52	1,17
89	J. Peł	12,00	4	20	19,5	4,88	5,00	0,98	1,63	1,67
90	J. Chojno	10,20	3	15	19,1	6,37	5,00	1,27	1,87	1,47
91	J. Białobrzegi	10,00	5	15	18,4	3,68	3,00	1,23	1,84	1,50
92	J. Trzebowo	9,70	3	8	17,5	5,83	2,67	2,19	1,80	0,82
93	J. Głęboćzek (na cieku bez nazwy)	12,00	9	35	16,2	1,80	3,89	0,46	1,35	2,92
94	Młyński Staw	9,00	9	27	14,8	1,64	3,00	0,55	1,64	3,00
95	J. Łąki Zawistowe	10,30	5	36	14,6	2,92	7,20	0,41	1,42	3,50
96	Staw Wielgie	4,20	3	12	14,0	4,67	4,00	1,17	3,33	2,86
97	Staw Sierpienica	2,00	3	26	13,5	4,50	8,67	0,52	6,75	13,00
98	J. Głęboćzek (w obw. J. Rekowe)	25,10	23	42	13,5	0,59	1,83	0,32	0,54	1,67
99	J. Kępka Szlachecka	12,90	7	12	12,5	1,79	1,71	1,04	0,97	0,93
100	J. Radziszewo	7,00	2	5	12,4	6,20	2,50	2,48	1,77	0,71

101	J. Łażnica	25,86	3	7	11,9	3,97	2,33	1,70	0,46	0,27
102	J. Skonieczne	30,37	5	8	10,9	2,18	1,60	1,36	0,36	0,26
103	J. Świesz	18,50	4	16	10,6	2,65	4,00	0,66	0,57	0,86
104	Czarne Gostynińskie	4,00	5	45	10,1	2,02	9,00	0,22	2,53	11,25
105	J. Średnie	29,10	5	20	10,0	2,00	4,00	0,50	0,34	0,69
106	Staw Ruda	3,00	2	8	7,8	3,90	4,00	0,98	2,60	2,67
107	Basen Brwinów	2,00	4	10	7,5	1,88	2,50	0,75	3,75	5,00
108	Basen Kolejniak	4,00	6	54	7,2	1,20	9,00	0,13	1,80	13,50
109	Czarne Baruchowo	6,70	2	7	7,1	3,55	3,50	1,01	1,06	1,04
110	J. Fręcki	19,00	10	28	5,6	0,56	2,80	0,20	0,29	1,47
111	J. Szczutkowskie	9,00	4	5	5,1	1,28	1,25	1,02	0,57	0,56
112	Glinianki Bagienice	3,00	11	42	5,0	0,45	3,82	0,12	1,67	14,00
113	Jegrznia 11	6,00	4	8	4,4	1,10	2,00	0,55	0,73	1,33
114	Mołtawa	12,60	1	5	3,9	3,90	5,00	0,78	0,31	0,40
115	J. Radzynek (Paprotki)	7,50	1	3	3,8	3,80	3,00	1,27	0,51	0,40
116	Kocioł	4,0	2	6	3,0	1,50	3,00	0,50	0,75	1,50
117	J. Borówko	9,10	4	5	0,9	0,23	1,25	0,18	0,10	0,55
118	J. Zielonka	6,40	2	4	0,6	0,30	2,00	0,15	0,09	0,63
119	Szkwa 1	33,00	3	7	0,6	0,20	2,33	0,09	0,02	0,21
120	J. Jasne	18,30	2	2	0,0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
121	Wymysłów	4,5	1	29	0,0	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
122	Glinianki Szczęśliwickie	7,00	11	93	0,0	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00

Tabela I. Wyniki wędkarzy okręgu mazowieckiego

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
7809	80349	46694	126563	5,98	10,29	0,58

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	6506,9	3624	13,94	1,80
Sandacz	1405,8	617	3,01	2,28
Sum	3181,3	337	6,81	9,44
Okoń	2641,1	13239	5,66	0,20
Boleń	459,6	207	0,98	2,22
Miętus	2,0	8	0,00	0,25
Węgorz	98,2	83	0,21	1,18
Karp	2359,4	1098	5,05	2,15
Płoc	8065,0	65371	17,27	0,12
Leszcz	16054,4	19106	34,38	0,84
Lin	1278,9	1343	2,74	0,95
Karaś pospolity	162,0	497	0,35	0,33
Karaś srebrzysty	971,2	2913	2,08	0,33
Amur	153,4	48	0,33	3,20
Brzana	21,5	8	0,05	2,69
Świnka	7,3	19	0,02	0,38
Certa	45,1	127	0,10	0,36
Kleń	370,0	380	0,79	0,97
Jaź	186,8	205	0,40	0,91
Pstrąg potokowy	14,9	15	0,03	0,99
Jelec	4,0	27	0,01	0,15
Krąp	2401,5	13553	5,14	0,18
Wzdrenga	167,6	1335	0,36	0,13
Jazgarz	6,3	160	0,01	0,04
Ukleja	53,9	1914	0,12	0,03
Tołpyga	30,0	1,00	0,06	30,00
Pozostałe	46,2	328	0,10	0,14

Tabela 1. Rzeka Narew nr 7

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1311	17564	12946,1	28183	9,87	13,40	0,74

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2225,5	1081	17,19	2,06
Sandacz	502,2	210	3,88	2,39
Sum	642,6	67	4,96	9,59
Okoń	863,3	4259	6,67	0,20
Boleń	99,1	47	0,77	2,11
Węgorz	2,6	2	0,02	1,30
Karp	33,3	18	0,26	1,85
Płoc	1557,9	10500	12,03	0,15
Leszcz	5729,9	7189	44,26	0,80
Lin	387,6	412	2,99	0,94
Karaś srebrzysty	117,0	190	0,90	0,62
Amur	0,7	1	0,01	0,70
Świnka	5,5	12	0,04	0,46
Kleń	40,7	35	0,31	1,16
Jaź	19,4	15	0,15	1,29
Krąp	666,5	3560	5,15	0,19
Wzdręga	43,2	322	0,33	0,13
Jazgarz	1,0	10	0,01	0,10
Ukleja	8,1	253	0,06	0,03

Tabela 2. Zbiornik Włocławski na rzece Wisła nr 5

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
411	5378	3707,0	4205	9,02	13,09	0,69

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	328,4	161	8,86	2,04
Sandacz	192,5	83	5,19	2,32
Sum	1118,5	127	30,17	8,81
Okoń	193,2	1025	5,21	0,19
Boleń	117,9	51	3,18	2,31
Węgorz	13,8	12	0,37	1,15
Karp	489,2	221	13,20	2,21
Płoc	136,9	996	3,69	0,14
Leszcz	853,5	755	23,02	1,13
Karaś pospolity	4,0	5	0,11	0,80
Karaś srebrzysty	151,4	336	4,08	0,45
Amur	3,2	1	0,09	3,20
Brzana	4,0	1	0,11	4,00
Certa	6,4	24	0,17	0,27
Kleń	5,7	4	0,15	1,43
Jaź	10,9	9	0,29	1,21
Krąp	45,9	172	1,24	0,27
Wzdręga	25,7	126	0,69	0,20
Jazgarz	2,3	21	0,06	0,11
Ukleja	3,6	75	0,10	0,05

Tabela 3. Rzeka Narew nr 6

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
934	11846	3409,3	5691	3,65	12,68	0,29

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	399,1	256	11,71	1,56
Sandacz	37,6	22	1,10	1,71
Sum	167,7	19	4,92	8,83
Okoń	145,8	790	4,28	0,18
Boleń	19,3	9	0,57	2,14

Węgorz	0,8	1	0,02	0,80
Karp	7,5	3	0,22	2,50
Płoć	217,5	1851	6,38	0,12
Leszcz	2019,2	878	59,23	2,30
Lin	30,6	35	0,90	0,87
Karaś pospolity	12,4	81	0,36	0,15
Karaś srebrzysty	5,6	21	0,16	0,27
Kleń	39,9	41	1,17	0,97
Jaź	21,1	26	0,62	0,81
Jelec	1,5	11	0,04	0,14
Krąp	277,3	1512	8,13	0,18
Wzdreęga	4,4	42	0,13	0,10
Ukleja	1,8	91	0,05	0,02
Pozostałe	0,2	2	0,01	0,10

Tabela 4. Rzeka Wisła nr 4

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
252	3284	3398,5	4490	13,49	13,03	1,03

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	229,6	100	6,76	2,30
Sandacz	190,7	69	5,61	2,76
Sum	533,9	51	15,71	10,47
Okoń	24,3	124	0,72	0,20
Boleń	58,9	21	1,73	2,80
Węgorz	3,1	2	0,09	1,55
Karp	25,7	6	0,76	4,28
Płoć	198,8	1544	5,85	0,13
Leszcz	1864,6	1443	54,87	1,29
Lin	8,3	7	0,24	1,19
Karaś srebrzysty	57,4	180	1,69	0,32
Amur	16,0	2	0,47	8,00
Brzana	5,8	2	0,17	2,90
Świnka	0,6	5	0,02	0,12
Certa	6,8	14	0,20	0,49
Kleń	34,8	42	1,02	0,83
Jaź	8,9	12	0,26	0,74
Jelec	0,5	3	0,01	0,17
Krąp	123,5	721	3,63	0,17
Wzdreęga	0,3	1	0,01	0,30
Ukleja	3,8	135	0,11	0,03
Pozostałe	2,2	6	0,06	0,37

Tabela 5. Rzeka Narew nr 8

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
260	3351	3123,7	4613	12,01	12,89	0,93

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	342,4	163	10,96	2,10
Sandacz	59,3	24	1,90	2,47
Sum	144,4	14	4,62	10,31
Okoń	76,1	359	2,44	0,21
Boleń	44,2	20	1,41	2,21
Węgorz	2,2	2	0,07	1,10
Karp	59,1	33	1,89	1,79
Płoć	173,1	1144	5,54	0,15
Leszcz	1907,0	1431	61,05	1,33
Lin	10,0	10	0,32	1,00
Karaś srebrzysty	67,2	268	2,15	0,25
Brzana	3,1	1	0,10	3,10
Świnka	1,2	2	0,04	0,60
Certa	6,6	16	0,21	0,41
Kleń	13,6	11	0,44	1,24
Jaź	37,2	30	1,19	1,24
Jelec	0,2	3	0,01	0,07
Krąp	170,5	853	5,46	0,20
Wzdrenga	0,1	1	0,00	0,10
Jazgarz	0,2	10	0,01	0,02
Ukleja	5,0	216	0,16	0,02
Pozostałe	1,0	2	0,03	0,50

Tabela 6. Rzeka Wisła nr 3

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
402	4181	3064,3	9346	7,62	10,40	0,73

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	236,9	146	7,73	1,62
Sandacz	143,0	68	4,67	2,10
Sum	410,6	28	13,40	14,66
Okoń	78,1	342	2,55	0,23
Boleń	55,4	33	1,81	1,68
Węgorz	1,3	1	0,04	1,30
Karp	14,6	8	0,48	1,83
Płoć	217,6	1529	7,10	0,14

Leszcz	1151,5	3384	37,58	0,34
Lin	24,8	29	0,81	0,86
Karaś srebrzysty	83,7	359	2,73	0,23
Brzana	8,6	4	0,28	2,15
Certa	23,0	69	0,75	0,33
Kleń	32,8	29	1,07	1,13
Jaź	27,2	36	0,89	0,76
Jelec	1,2	7	0,04	0,17
Krąp	509,5	2785	16,63	0,18
Wzdreęga	1,7	12	0,06	0,14
Jazgarz	1,0	32	0,03	0,03
Ukleja	9,8	225	0,32	0,04
Pozostałe	32,0	220	1,04	0,15

Tabela 7. Rzeka Bug nr 5

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
741	10857	2749,4	6708	3,71	14,65	0,25

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	646,8	383	23,53	1,69
Sandacz	59,7	34	2,17	1,76
Sum	146,9	28	5,34	5,25
Okoń	140,4	657	5,11	0,21
Boleń	54,6	20	1,99	2,73
Karp	58,5	32	2,13	1,83
Płoc	241,6	1672	8,79	0,14
Leszcz	670,3	559	24,38	1,20
Lin	103,5	111	3,76	0,93
Karaś pospolity	31,1	93	1,13	0,33
Karaś srebrzysty	174,7	505	6,35	0,35
Kleń	15,7	14	0,57	1,12
Jaź	3,2	6	0,12	0,53
Krąp	392,7	2400	14,28	0,16
Wzdreęga	0,8	5	0,03	0,16
Ukleja	4,2	145	0,15	0,03
Pozostałe	4,7	44	0,17	0,11

Tabela 8. Rzeka Skrwa Prawa nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
250	1566	2327,2	15665	9,31	6,26	1,49

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	32,1	20	1,38	1,61
Okoń	53,8	270	2,31	0,20
Karp	2,0	1	0,09	2,00
Płoc	2161,5	15128	92,88	0,14
Leszcz	43,2	99	1,86	0,44
Certa	2,3	4	0,10	0,58
Kleń	6,2	10	0,27	0,62
Pstrąg potokowy	14,9	15	0,64	0,99
Jelec	0,6	3	0,03	0,20
Krąp	9,6	66	0,41	0,15
Ukleja	1,0	49	0,04	0,02

Tabela 9. Glinianki Zielonka

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
63	852	758,2	900	12,03	13,52	0,89

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	129,6	73	17,09	1,78
Sandacz	4,7	2	0,62	2,35
Okoń	11,0	25	1,45	0,44
Węgorz	1,9	2	0,25	0,95
Karp	360,3	94	47,52	3,83
Płoc	48,0	436	6,33	0,11
Leszcz	34,7	36	4,58	0,96
Lin	74,5	55	9,83	1,35
Karaś srebrzysty	34,8	165	4,59	0,21
Amur	58,4	10	7,70	5,84
Krąp	0,1	1	0,01	0,10
Wzdreęga	0,2	1	0,03	0,20

Tabela 10. Jezioro Sasek Wielki

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
165	714	684,1	3734	4,15	4,33	0,96

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	102,9	69	15,04	1,49
Okoń	94,2	421	13,77	0,22
Węgorz	8,3	5	1,21	1,66
Płoc	242,8	2534	35,49	0,10
Leszcz	169,1	317	24,72	0,53
Lin	3,6	5	0,53	0,72
Karaś pospolity	0,5	1	0,07	0,50
Krąp	55,6	310	8,13	0,18
Wzdreęga	4,6	25	0,67	0,18
Ukleja	2,5	47	0,37	0,05

Tabela 11. Jezioro Toczyłowo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
101	794	680,8	2673	6,74	7,86	0,86

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	83,1	82	12,21	1,01
Sandacz	4,4	2	0,65	2,20
Sum	3,0	1	0,44	3,00
Okoń	184,1	984	27,04	0,19
Boleń	0,8	1	0,12	0,80
Karp	46,2	17	6,79	2,72
Płoc	150,9	1231	22,17	0,12
Leszcz	161,3	276	23,69	0,58
Lin	38,8	38	5,70	1,02
Karaś pospolity	0,8	1	0,12	0,80
Kleń	2,1	2	0,31	1,05
Krąp	3,7	30	0,54	0,12
Wzdreęga	1,6	8	0,24	0,20

Tabela 12. Glinianki Grodzisk

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
63	1170	560,2	587	8,89	18,57	0,48

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	39,7	26	7,09	1,53
Sandacz	8,5	3	1,52	2,83
Okoń	6,0	26	1,07	0,23
Węgorz	3,3	2	0,59	1,65
Karp	312,1	184	55,71	1,70
Płoc	10,4	119	1,86	0,09
Leszcz	52,1	77	9,30	0,68
Lin	44,5	37	7,94	1,20
Karaś srebrzysty	18,5	74	3,30	0,25
Amur	61,2	27	10,92	2,27
Krąp	3,6	8	0,64	0,45
Pozostałe	0,3	4	0,05	0,08

Tabela 13. Rzeka Elk nr 45

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
62	442	499,1	2143	8,05	7,13	1,13

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	116,5	73	23,34	1,60
Okoń	42,2	235	8,46	0,18
Boleń	2,9	1	0,58	2,90
Płoc	180,6	1647	36,19	0,11
Leszcz	11,7	12	2,34	0,98
Lin	3,4	3	0,68	1,13
Kleń	126,2	132	25,29	0,96
Jaź	11,7	9	2,34	1,30
Krąp	2,3	18	0,46	0,13
Wzdreęga	1,6	13	0,32	0,12

Tabela 14. Rzeka Rozoga nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
293	2037	433,0	1487	1,48	6,95	0,21

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	78,4	47	18,11	1,67
Sandacz	33,9	18	7,83	1,88
Okoń	28,7	155	6,63	0,19
Karp	11,2	3	2,59	3,73
Płoc	112,4	1004	25,96	0,11
Leszcz	128,5	205	29,68	0,63
Lin	36,4	37	8,41	0,98
Karaś pospolity	1,8	2	0,42	0,90
Jaź	1,2	1	0,28	1,20
Ukleja	0,5	15	0,12	0,03

Tabela 15. Rzeka Orzyc nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
248	1402	330,7	1038	1,33	5,65	0,24

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	123,7	78	37,41	1,59
Sandacz	4,1	1	1,24	4,10
Okoń	58,0	245	17,54	0,24
Boleń	1,7	1	0,51	1,70
Karp	11,3	5	3,42	2,26
Płoc	78,4	640	23,71	0,12
Leszcz	11,9	11	3,60	1,08
Lin	10,6	8	3,21	1,33
Karaś pospolity	0,7	3	0,21	0,23
Karaś srebrzysty	2,5	2	0,76	1,25
Amur	2,0	1	0,60	2,00
Kleń	18,4	22	5,56	0,84
Jaź	3,4	6	1,03	0,57
Krąp	4,0	15	1,21	0,27

Tabela 16. Staw Krzywie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
27	835	308,8	902	11,44	30,93	0,37

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	62,6	48	20,27	1,30
Sandacz	43,9	15	14,22	2,93
Okoń	0,3	1	0,10	0,30
Karp	47,6	24	15,41	1,98
Płoć	50,2	607	16,26	0,08
Leszcz	59,7	143	19,33	0,42
Lin	30,6	40	9,91	0,77
Karaś pospolity	0,6	1	0,19	0,60
Karaś srebrzysty	3,0	9	0,97	0,33
Krąp	9,4	11	3,04	0,85
Wzdreęga	0,9	3	0,29	0,30

Tabela 17. Jezioro Ługowskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
44	316	291,2	2155	6,62	7,18	0,92

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	3,7	2	1,27	1,85
Okoń	21,3	92	7,31	0,23
Węgorz	3,6	4	1,24	0,90
Płoć	208,2	1860	71,50	0,11
Leszcz	34,4	46	11,81	0,75
Lin	7,8	11	2,68	0,71
Karaś pospolity	0,7	1	0,24	0,70
Karaś srebrzysty	1,5	3	0,52	0,50
Krąp	9,3	125	3,19	0,07
Wzdreęga	0,6	6	0,21	0,10
Ukleja	0,1	5	0,03	0,02

Tabela 18. Jezioro Zdrowskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
50	623	287,0	764	5,74	12,46	0,46

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	43,1	20	15,02	2,16
Sandacz	36,0	14	12,54	2,57
Sum	10,6	1	3,69	10,60
Okoń	11,8	38	4,11	0,31
Węgorz	14,9	15	5,19	0,99
Karp	7,9	3	2,75	2,63
Płoc	27,0	319	9,41	0,08
Leszcz	118	210	41,11	0,56
Lin	1,3	2	0,45	0,65
Karaś srebrzysty	10,7	14	3,73	0,76
Krąp	2,2	10	0,77	0,22
Wzdręga	2,2	8	0,77	0,28
Jazgarz	0,8	80	0,28	0,01
Ukleja	0,5	30	0,17	0,02

Tabela 19. Jezioro Wałpusz

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
80	375	275,3	1542	3,44	4,69	0,73

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	81,1	59	29,46	1,37
Okoń	20,7	124	7,52	0,17
Płoc	109,5	1153	39,77	0,09
Leszcz	53,2	123	19,32	0,43
Lin	1,5	4	0,54	0,38
Krąp	0,7	4	0,25	0,18
Wzdręga	8,5	55	3,09	0,15
Ukleja	0,1	20	0,04	0,01

Tabela 20. Glinianki Błonie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
36	1031	241,3	215	6,70	28,64	0,23

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	14,6	10	6,05	1,46
Okoń	1,8	3	0,75	0,60
Węgorz	1,0	1	0,41	1,00
Karp	173,1	95	71,74	1,82
Płoc	2,0	22	0,83	0,09
Leszcz	16,0	27	6,63	0,59
Lin	12,7	11	5,26	1,15
Karaś srebrzysty	19,0	43	7,87	0,44
Amur	1,0	1	0,41	1,00
Krap	0,1	2	0,04	0,05

Tabela 21. Rzeka Jeziorka nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
19	159	228,3	1416	12,02	8,37	1,44

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	14,1	9	6,18	1,57
Okoń	44,9	285	19,67	0,16
Karp	5,0	3	2,19	1,67
Płoc	121,6	1013	53,26	0,12
Leszcz	4,6	3	2,01	1,53
Karaś srebrzysty	8,7	40	3,81	0,22
Kleń	0,8	1	0,35	0,80
Jaź	6,0	5	2,63	1,20
Krap	22,6	57	9,90	0,40

Tabela 22. Rzeka Brok nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
130	874	213,2	857	1,64	6,72	0,24

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	72,7	32	34,10	2,27
Okoń	44,4	171	20,83	0,26

Płoc	73,7	595	34,57	0,12
Leszcz	7,4	5	3,47	1,48
Lin	1,3	2	0,61	0,65
Karaś pospolity	1,3	6	0,61	0,22
Karaś srebrzysty	1,2	8	0,56	0,15
Jaż	5,8	8	2,72	0,73
Krap	5,4	30	2,53	0,18

Tabela 23. Jezioro Białe

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
24	292	211,2	434	8,80	12,17	0,72

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	99,1	51	46,92	1,94
Okoń	10,8	47	5,11	0,23
Płoc	36,5	289	17,28	0,13
Leszcz	57,9	43	27,41	1,35
Lin	6,9	4	3,27	1,73

Tabela 24. Jezioro Sasek Mały

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
116	334	209,2	1802	1,80	2,88	0,63

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	8,8	5	4,21	1,76
Sandacz	1,5	1	0,72	1,50
Okoń	24,1	151	11,52	0,16
Płoc	75,7	825	36,19	0,09
Leszcz	35,5	112	16,97	0,32
Lin	3,0	3	1,43	1,00
Karaś srebrzysty	10,2	14	4,88	0,73
Krap	41,0	492	19,60	0,08
Wzdreęga	3,2	30	1,53	0,11
Ukleja	6,2	169	2,96	0,04

Tabela 25. Jezioro Ostrowąs (Plebanka)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
21	171	201,1	691	9,58	8,14	1,18

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	32,1	20	15,96	1,61
Sandacz	32,0	20	15,91	1,60
Okoń	2,3	8	1,14	0,29
Węgorz	4,2	3	2,09	1,40
Płoc	27,2	204	13,53	0,13
Leszcz	74,1	391	36,85	0,19
Lin	1,7	2	0,85	0,85
Karaś pospolity	23,3	26	11,59	0,90
Karaś srebrzysty	1,3	3	0,65	0,43
Krąp	2,9	14	1,44	0,21

Tabela 26. Rzeka Biebrza nr 3 (Wissa)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
17	168	197,6	1622	11,62	9,88	1,18

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	22,5	21	11,39	1,07
Okoń	13,1	104	6,63	0,13
Płoc	141,4	1465	71,56	0,10
Leszcz	5,0	4	2,53	1,25
Kleń	6,4	10	3,24	0,64
Jaź	8,1	13	4,10	0,62
Krąp	1,1	5	0,56	0,22

Tabela 27. Stawy w Parku Pruszków

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
28	379	196,8	549	7,03	13,54	0,52

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	32,4	19	16,46	1,71
Okoń	11,9	49	6,05	0,24
Karp	61,6	27	31,30	2,28
Płoc	21,2	198	10,77	0,11
Leszcz	11,4	15	5,79	0,76
Lin	12,0	15	6,10	0,80

Karaś pospolity	1,0	2	0,51	0,50
Karaś srebrzysty	41,2	177	20,93	0,23
Wzdreęga	3,0	24	1,52	0,13
Jazgarz	0,3	3	0,15	0,10
Pozostałe	0,8	20	0,41	0,04

Tabela 28. Rzeka Omulew nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
96	518	191,4	695	1,99	5,40	0,37

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	53,7	45	28,06	1,19
Okoń	36,7	254	19,17	0,14
Płoc	44,4	324	23,20	0,14
Leszcz	14,7	17	7,68	0,86
Lin	2,5	3	1,31	0,83
Karaś pospolity	0,5	2	0,26	0,25
Kleń	23,7	24	12,38	0,99
Jaź	14,4	20	7,52	0,72
Krap	0,6	4	0,31	0,15
Wzdreęga	0,2	2	0,10	0,10

Tabela 29. Jezioro Klimek (Konik)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
37	85	190,9	1201	5,16	2,30	2,25

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	6,0	5	3,14	1,20
Okoń	3,2	12	1,68	0,27
Płoc	161,1	1125	84,39	0,14
Leszcz	19,6	39	10,27	0,50
Karaś srebrzysty	1,0	20	0,52	0,05

Tabela 30. Jezioro Małszewskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
40	202	179,6	868	4,49	5,05	0,89

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	29,2	19	16,26	1,54
Okoń	34,2	157	19,04	0,22
Płoc	75,9	611	42,26	0,12
Leszcz	36,8	56	20,49	0,66
Lin	0,5	1	0,28	0,50
Karaś pospolity	0,9	1	0,50	0,90
Krąp	1,1	8	0,61	0,14
Pozostałe	1,0	15	0,56	0,07

Tabela 31. Jezioro Przymotne

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
35	273	171,7	366	4,91	7,80	0,63

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	58,7	37	34,19	1,59
Okoń	10,1	33	5,88	0,31
Karp	6,2	4	3,61	1,55
Płoc	29,5	163	17,18	0,18
Leszcz	52,1	103	30,34	0,51
Lin	11,2	12	6,52	0,93
Krąp	3,8	13	2,21	0,29
Wzdreęga	0,1	1	0,06	0,10

Tabela 32. Jezioro Wikaryjskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
44	289	170,6	761	3,88	6,57	0,59

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	24,7	19	14,48	1,30
Okoń	2,9	15	1,70	0,19
Węgorz	2,3	3	1,35	0,77
Karp	3,0	1	1,76	3,00
Płoc	53,2	557	31,18	0,10
Leszcz	60,5	84	35,46	0,72
Lin	14,2	11	8,32	1,29
Krąp	1,2	3	0,70	0,40
Wzdreęga	8,6	68	5,04	0,13

Tabela 33. Rzeka Nurzec nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
61	352	169,1	398	2,77	5,77	0,48

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	65,4	41	38,68	1,60
Okoń	16,8	67	9,93	0,25
Boleń	2,0	2	1,18	1,00
Karp	9,3	5	5,50	1,86
Płoc	27,0	209	15,97	0,13
Leszcz	28,6	39	16,91	0,73
Lin	10,1	12	5,97	0,84
Karaś pospolity	1,1	15	0,65	0,07
Amur	7,0	3	4,14	2,33
Wzdreęga	1,8	5	1,06	0,36

Tabela 34. Stawy Talar i Montoprzem

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
24	384	160,6	232	6,69	16,00	0,42

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	15,3	8	9,53	1,91
Okoń	1,2	5	0,75	0,24
Karp	119,2	100	74,22	1,19
Płoc	8,4	88	5,23	0,10
Leszcz	12,4	24	7,72	0,52
Lin	0,7	1	0,44	0,70
Karaś srebrzysty	3,0	5	1,87	0,60
Jaź	0,4	1	0,25	0,40

Tabela 35. Jezioro Brajnickie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
76	263	148,9	903	1,96	3,46	0,57

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	4,0	4	2,69	1,00
Okoń	7,2	28	4,84	0,26
Płoc	45,1	555	30,29	0,08
Leszcz	70,1	103	47,08	0,68
Lin	1,8	2	1,21	0,90

Karaś pospolity	5,3	20	3,56	0,27
Karaś srebrzysty	1,0	2	0,67	0,50
Krąp	12,5	152	8,39	0,08
Wzdreęga	0,9	11	0,60	0,08
Ukleja	1,0	26	0,67	0,04

Tabela 36. Jezioro Pomocnia

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
20	174	143,2	514	7,16	8,70	0,82

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	26,3	12	18,37	2,19
Okoń	4,0	16	2,79	0,25
Karp	49,2	17	34,36	2,89
Płoc	47,3	448	33,03	0,11
Leszcz	14,6	19	10,20	0,77
Lin	1,8	2	1,26	0,90

Tabela 37. Rzeka Rządza nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
50	291	138,1	309	2,76	5,82	0,47

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	20,4	18	14,77	1,13
Okoń	42,2	92	30,56	0,46
Płoc	26,6	155	19,26	0,17
Leszcz	11,4	8	8,25	1,43
Lin	34,8	25	25,20	1,39
Karaś srebrzysty	0,2	1	0,14	0,20
Jaź	2,0	2	1,45	1,00
Wzdreęga	0,5	8	0,36	0,06

Tabela 38. Zbiornik Chorzele

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
60	431	137,6	233	2,29	7,18	0,32

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,9	2	2,11	1,45
Sandacz	1,3	1	0,94	1,30
Karp	93,1	28	67,66	3,33
Płoc	10,9	151	7,92	0,07
Leszcz	2,5	2	1,82	1,25
Lin	9,0	8	6,54	1,13
Karaś pospolity	8,8	25	6,40	0,35
Karaś srebrzysty	9,1	16	6,61	0,57

Tabela 39. Jezioro Moczydło

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
21	236	132,2	180	6,30	11,24	0,56

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	22,2	8	16,79	2,78
Okoń	18,7	81	14,15	0,23
Karp	44,2	21	33,43	2,10
Leszcz	3,0	3	2,27	1,00
Lin	20,4	28	15,43	0,73
Karaś srebrzysty	19,2	23	14,52	0,83
Kleń	0,5	1	0,38	0,50
Pozostałe	4,0	15	3,03	0,27

Tabela 40. Jezioro Grójeckie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
27	141	124,9	661	4,63	5,22	0,89

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	28,1	15	22,50	1,87
Sandacz	11,0	6	8,81	1,83
Okoń	1,7	7	1,36	0,24
Węgorz	0,8	1	0,64	0,80
Karp	7,7	3	6,16	2,57

Płoć	28,4	262	22,74	0,11
Leszcz	23,7	98	18,98	0,24
Lin	10,9	12	8,73	0,91
Karaś srebrzysty	10,1	7	8,09	1,44
Ukleja	2,5	250	2,00	0,01

Tabela 41. Jezioro Ciechomickie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
34	252	122,2	190	3,59	7,41	0,48

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	24,3	12	19,89	2,03
Sandacz	22,8	17	18,66	1,34
Okoń	10,0	31	8,18	0,32
Węgorz	12,0	9	9,82	1,33
Karp	8,7	4	7,12	2,18
Płoć	7,5	47	6,14	0,16
Leszcz	32,9	66	26,92	0,50
Lin	3,6	3	2,95	1,20
Karaś srebrzysty	0,4	1	0,33	0,40

Tabela 42. Glinianki Gołków, Głosków, Zalesie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
18	119	117,9	427	6,55	6,61	0,99

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	10,8	8	9,16	1,35
Sandacz	1,5	1	1,27	1,50
Okoń	6,6	43	5,60	0,15
Karp	32,9	15	27,91	2,19
Płoć	33,2	282	28,16	0,12
Leszcz	3,3	4	2,80	0,83
Lin	10,3	9	8,74	1,14
Karaś srebrzysty	16,7	64	14,16	0,26
Amur	2,6	1	2,21	2,60

Tabela 43. Jezioro Skrzyneckie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
28	197	117,2	672	4,19	7,04	0,59

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	30,2	17	25,77	1,78
Sandacz	0,8	1	0,68	0,80
Okoń	8,0	47	6,83	0,17
Karp	5,8	4	4,95	1,45
Płoc	49,5	546	42,24	0,09
Leszcz	2,0	3	1,71	0,67
Lin	13,1	19	11,18	0,69
Karaś srebrzysty	3,3	4	2,82	0,83
Wzdreęga	4,5	31	3,84	0,15

Tabela 44. Rzeka Utrata nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
28	165	110,8	369	3,96	5,89	0,67

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	35,4	11	31,95	3,22
Sandacz	6,7	2	6,05	3,35
Okoń	8,4	44	7,58	0,19
Karp	4,5	2	4,06	2,25
Płoc	18,7	153	16,88	0,12
Leszcz	12,9	18	11,64	0,72
Lin	2,3	3	2,08	0,77
Karaś srebrzysty	20,7	131	18,68	0,16
Jaź	0,5	1	0,45	0,50
Jazgarz	0,7	4	0,63	0,18

Tabela 45. Jezioro Grom

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
17	52	109,2	688	6,42	3,06	2,10

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	11,6	8	10,62	1,45
Okoń	8,5	39	7,78	0,22
Płoc	38,3	493	35,07	0,08

Leszcz	36,7	66	33,61	0,56
Lin	6,0	3	5,49	2,00
Krąp	0,4	6	0,37	0,07
Wzdreęga	7,7	73	7,05	0,11

Tabela 46. Jezioro Górskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
21	232	105,8	375	5,04	11,05	0,46

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	18,5	15	17,49	1,23
Okoń	5,4	44	5,10	0,12
Węgorz	4,0	4	3,78	1,00
Płoc	22,7	209	21,46	0,11
Leszcz	40,1	57	37,90	0,70
Lin	9,6	7	9,07	1,37
Karaś srebrzysty	5,5	39	5,20	0,14

Tabela 47. Skoki I

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
36	212	103,4	459	2,87	5,89	0,49

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	19,0	9	18,38	2,11
Okoń	7,5	42	7,25	0,18
Węgorz	1,0	1	0,97	1,00
Karp	2,0	2	1,93	1,00
Płoc	31,7	257	30,66	0,12
Leszcz	35,2	47	34,04	0,75
Karaś srebrzysty	3,5	4	3,38	0,88
Krąp	1,8	18	1,74	0,10
Wzdreęga	1,0	23	0,97	0,04
Ukleja	0,7	56	0,68	0,01

Tabela 48. Staw Jedwabne

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
12	71	102,1	160	8,51	5,92	1,44

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Karp	68,2	34	66,80	2,01
Płoc	4,7	44	4,60	0,11
Lin	13,7	11	13,42	1,25
Karaś pospolity	11,7	63	11,46	0,19
Karaś srebrzysty	2,5	7	2,45	0,36
Amur	1,3	1	1,27	1,30

Tabela 49. Rzeka Orz nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
118	612	92,3	520	0,78	5,19	0,15

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	21,7	11	23,51	1,97
Okoń	16,8	78	18,20	0,22
Boleń	2,8	1	3,03	2,80
Płoc	43,8	425	47,45	0,10
Leszcz	0,9	1	0,98	0,90
Lin	6,3	4	6,83	1,58

Tabela 50. Jezioro Karaśnia

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
12	92	87,0	267	7,25	7,67	0,95

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	12,1	10	13,91	1,21
Okoń	6,6	28	7,59	0,24
Węgorz	3,4	4	3,91	0,85
Karp	19,0	4	21,84	4,75
Płoc	14,2	103	16,32	0,14
Leszcz	22,2	49	25,52	0,45
Lin	2,2	3	2,53	0,73
Krąp	5,0	54	5,75	0,09
Wzdreęga	2,3	12	2,64	0,19

Tabela 51. Jezioro Lutoborskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
23	147	85,8	172	3,73	6,39	0,58

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	11,6	9	13,54	1,29
Okoń	1,4	6	1,63	0,23
Karp	3,4	3	3,97	1,13
Płoc	11,1	128	12,95	0,09
Leszcz	18,7	17	21,82	1,10
Lin	9,0	7	10,50	1,29
Wzdreęga	0,5	1	0,58	0,50
Tołpyga	30,0	1	35,01	30,00

Tabela 52. Jezioro Skrwilno

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
16	133	76,3	986	4,77	8,31	0,57

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	11,9	4	15,60	2,98
Okoń	0,8	2	1,05	0,40
Karp	5,1	5	6,68	1,02
Płoc	55,9	959	73,26	0,06
Lin	1,0	2	1,31	0,50
Wzdreęga	1,6	14	2,10	0,11

Tabela 53. Rzeka Świder nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
15	241	74,2	323	4,95	16,07	0,31

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	15,0	8	20,22	1,88
Okoń	26,0	176	35,04	0,15
Karp	8,2	6	11,05	1,37
Płoc	10,0	100	13,48	0,10
Leszcz	6,6	8	8,89	0,83
Lin	4,5	5	6,06	0,90
Karaś srebrzysty	3,9	20	5,26	0,20

Tabela 54. Rzeka Zgłowiączka nr 2

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	112	71,8	512	7,18	11,20	0,64

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	4,1	4	5,71	1,03
Okoń	11,7	63	16,30	0,19
Płoć	45,3	393	63,09	0,12
Leszcz	1,0	3	1,39	0,33
Lin	0,7	1	0,97	0,70
Karaś srebrzysty	0,9	5	1,25	0,18
Jaź	5,4	5	7,52	1,08
Wzdreğa	2,7	38	3,76	0,07

Tabela 55. Zalew w Makowie Mazowieckim

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
70	437	69,2	95	0,99	6,24	0,16

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	6,2	4	8,96	1,55
Karp	42,2	18	60,98	2,34
Płoć	3,3	19	4,77	0,17
Leszcz	10,2	13	14,74	0,78
Lin	0,8	1	1,16	0,80
Karaś srebrzysty	2,6	14	3,76	0,19
Krąp	3,9	26	5,64	0,15

Tabela 56. Jezioro Świętajno (Narty)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
25	79	68,2	361	2,73	3,16	0,86

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	22,3	14	32,70	1,59
Okoń	36,7	247	53,81	0,15
Płoć	7,5	70	11,00	0,11
Leszcz	0,4	1	0,59	0,40
Krąp	1,0	9	1,47	0,11
Ukleja	0,3	20	0,44	0,02

Tabela 57. Jezioro Warchałdzkie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
20	79	66,6	272	3,33	3,95	0,84

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	20,0	14	30,03	1,43
Okoń	1,4	3	2,10	0,47
Węgorz	8,4	4	12,61	2,10
Płoc	15,1	176	22,67	0,09
Leszcz	19,2	67	28,83	0,29
Lin	2,1	3	3,15	0,70
Wzdreęga	0,4	5	0,60	0,08

Tabela 58. Glinianki Szczęśliwickie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
11	93	64,3	188	5,85	8,45	0,69

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	11,5	3	17,88	3,83
Okoń	3,2	19	4,98	0,17
Karp	17,5	5	27,22	3,50
Płoc	14,1	130	21,93	0,11
Leszcz	5,8	9	9,02	0,64
Lin	8,6	13	13,37	0,66
Karaś srebrzysty	3,6	9	5,60	0,40

Tabela 59. Jezioro Małszewckie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
12	46	61,8	719	5,15	3,83	1,34

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	1,0	9	1,62	0,11
Płoc	43,5	676	70,39	0,06
Leszcz	15,8	24	25,57	0,66
Krap	1,5	10	2,43	0,15

Tabela 60. Służewo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
14	58	60,1	494	4,29	4,14	1,04

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	3,3	2	5,49	1,65
Okoń	1,2	4	2,00	0,30
Karp	1,5	1	2,50	1,50
Płoc	18,2	422	30,28	0,04
Lin	9,5	10	15,81	0,95
Karaś pospolity	26,4	55	43,93	0,48

Tabela 61. Jezioro Burdąg

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
16	82	58,2	446	3,64	5,13	0,71

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	4,3	23	7,39	0,19
Płoc	32,3	375	55,50	0,09
Leszcz	18,0	32	30,93	0,56
Lin	2,3	3	3,95	0,77
Krap	0,5	3	0,86	0,17
Wzdręga	0,8	10	1,37	0,08

Tabela 62. Jezioro Bytoń

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
8	71	57,8	320	7,23	8,88	0,81

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	9,9	4	17,13	2,48
Okoń	15,9	99	27,51	0,16
Miętus	2,0	8	3,46	0,25
Karp	4,6	3	7,96	1,53
Płoc	18,1	181	31,31	0,10
Lin	1,2	1	2,08	1,20
Karaś srebrzysty	2,0	3	3,46	0,67
Wzdręga	4,1	21	7,09	0,20

Tabela 63. Jezioro Huta

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
17	76	56,3	518	3,31	4,47	0,74

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,5	1	2,66	1,50
Płoc	39,3	456	69,80	0,09
Leszcz	9,6	16	17,05	0,60
Lin	3,9	3	6,93	1,30
Wzdreęga	1,3	12	2,31	0,11
Ukleja	0,7	30	1,24	0,02

Tabela 64. Jezioro Piasutno

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
20	68	55,5	210	2,78	3,40	0,74

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	9,0	9	16,22	1,00
Okoń	7,1	38	12,79	0,19
Węgorz	1,0	1	1,80	1,00
Karp	7,8	4	14,05	1,95
Płoc	10,2	127	18,38	0,08
Leszcz	5,9	15	10,63	0,39
Lin	14,5	16	26,13	0,91

Tabela 65. Jezioro Ostrowickie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
14	89	52,3	633	3,74	6,36	0,59

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	2,8	20	5,35	0,14
Węgorz	1,3	1	2,49	1,30
Karp	2,5	1	4,78	2,50
Płoc	33,0	447	63,10	0,07
Lin	4,7	4	8,99	1,18
Karaś srebrzysty	0,2	1	0,38	0,20
Wzdreęga	7,8	159	14,91	0,05

Tabela 66. Jezioro Mierucie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
11	53	47,6	78	4,33	4,82	0,90

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	29,4	23	61,76	1,28
Okoń	2,4	9	5,04	0,27
Płoc	3,2	25	6,72	0,13
Lin	10,7	11	22,48	0,97
Karaś srebrzysty	0,3	1	0,63	0,30
Wzdręga	1,6	9	3,36	0,18

Tabela 67. Glinianka Włochy

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
6	104	47,1	77	7,85	17,33	0,45

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,4	1	2,97	1,40
Okoń	2,2	6	4,67	0,37
Karp	12,1	5	25,69	2,42
Płoc	2,5	26	5,31	0,10
Leszcz	9,4	8	19,96	1,18
Lin	13,7	19	29,09	0,72
Karaś srebrzysty	4,3	8	9,13	0,54
Wzdręga	1,5	4	3,18	0,38

Tabela 68. Jezioro Nożyce

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
19	99	44,6	241	2,35	5,21	0,45

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	18,0	13	40,36	1,38
Okoń	10,8	108	24,22	0,10
Płoc	5,2	55	11,66	0,09
Lin	1,5	3	3,36	0,50
Karaś pospolity	1,0	5	2,24	0,20
Karaś srebrzysty	0,4	1	0,90	0,40
Krąp	4,3	26	9,64	0,17
Wzdręga	3,4	30	7,62	0,11

Tabela 69. Glinianki Borowe

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
52	229	43,7	70	0,84	4,40	0,19

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,9	4	13,50	1,48
Okoń	1,2	3	2,75	0,40
Karp	22,6	14	51,72	1,61
Płoc	3,8	24	8,70	0,16
Leszcz	0,5	1	1,14	0,50
Lin	3,7	6	8,47	0,62
Karaś srebrzysty	3,5	16	8,01	0,22
Kleń	2,5	2	5,72	1,25

Tabela 70. Jezioro Machniacz

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	27	43,5	139	10,88	6,75	1,61

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	11,3	7	25,98	1,61
Okoń	1,0	3	2,30	0,33
Płoc	8,6	98	19,77	0,09
Leszcz	8,2	9	18,85	0,91
Lin	6,1	7	14,02	0,87
Karaś pospolity	6,7	13	15,40	0,52
Karaś srebrzysty	1,6	2	3,68	0,80

Tabela 71. Jezioro Okonin

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
13	85	38,4	193	2,95	6,54	0,45

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	13,6	10	35,42	1,36
Okoń	1,1	5	2,86	0,22
Płoc	16,1	168	41,93	0,10
Leszcz	6,7	5	17,45	1,34
Wzdreęga	0,9	5	2,34	0,18

Tabela 72. Jezioro Telążyzna

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
7	37	36,8	65	5,26	5,29	0,99

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	16,0	8	43,48	2,00
Okoń	0,5	2	1,36	0,25
Węgorz	1,8	2	4,89	0,90
Lin	12,9	16	35,05	0,81
Karaś pospolity	1,5	3	4,08	0,50
Karaś srebrzysty	2,1	4	5,71	0,53
Wzdreńga	2,0	30	5,43	0,07

Tabela 73. Jezioro Czarno-Czerskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	25	36,0	115	7,20	5,00	1,44

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,6	1	4,44	1,60
Okoń	2,7	7	7,50	0,39
Płoc	5,5	51	15,28	0,11
Leszcz	21,0	50	58,33	0,42
Lin	5,2	6	14,44	0,87

Tabela 74. Jezioro Lemańskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
16	37	34,6	87	2,16	2,31	0,94

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	11,7	5	33,82	2,34
Okoń	1,5	6	4,34	0,25
Płoc	6,6	57	19,08	0,12
Leszcz	2,4	2	6,94	1,20
Lin	10,6	12	30,64	0,88
Karaś pospolity	1,8	5	5,20	0,36

Tabela 75. Czarne Włocławskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
14	73	34,5	162	2,46	5,21	0,45

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	3,9	2	11,30	1,95
Sum	3,1	1	8,99	3,10
Okoń	1,4	7	4,06	0,20
Karp	11,3	3	32,75	3,77
Płoc	9,0	134	26,09	0,07
Leszcz	4,8	13	13,91	0,37
Lin	1,0	2	2,90	0,50

Tabela 76. Jezioro Łuba

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
14	67	33,8	139	2,41	4,79	0,50

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	10,6	7	31,36	1,51
Okoń	0,4	1	1,18	0,40
Płoc	9,5	114	28,11	0,08
Leszcz	3,4	3	10,06	1,13
Lin	9,7	11	28,70	0,88
Wzdreęga	0,2	3	0,59	0,07

Tabela 77. Jezioro Lubiechowo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
9	47	31,5	101	3,50	5,22	0,67

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	7,6	5	24,13	1,52
Okoń	3,0	28	9,52	0,11
Płoc	3,9	25	12,38	0,16
Lin	10,3	13	32,70	0,79
Karaś pospolity	1,3	3	4,13	0,43
Karaś srebrzysty	0,8	2	2,54	0,40
Wzdreęga	4,6	25	14,60	0,18

Tabela 78. Jezioro Rekowe

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
43	85	30,7	231	0,71	1,98	0,36

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	3,4	2	11,07	1,70
Okoń	3,2	26	10,42	0,12
Płoć	10,7	145	34,85	0,07
Leszcz	11,2	30	36,48	0,37
Krąp	1,8	10	5,86	0,18
Ukleja	0,4	18	1,30	0,02

Tabela 79. Jezioro Sędańskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
18	77	30,7	227	1,71	4,28	0,40

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	4,2	2	13,68	2,10
Okoń	4,6	25	14,98	0,18
Płoć	16,2	194	52,77	0,08
Leszcz	5,7	6	18,57	0,95

Tabela 80. Jezioro Borowiec (Wildno)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
12	53	30,4	141	2,53	4,42	0,57

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	7,4	4	24,34	1,85
Karp	4,0	1	13,16	4,00
Płoć	11,9	112	39,14	0,11
Leszcz	5,2	20	17,11	0,26
Lin	1,0	1	3,29	1,00
Karaś srebrzysty	0,9	3	2,96	0,30

Tabela 81. Jezioro Brzeźno

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	36	29,9	34	7,48	9,00	0,83

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	6,4	4	21,40	1,60
Lin	18,3	22	61,20	0,83
Karaś pospolity	4,4	5	14,72	0,88
Karaś srebrzysty	0,8	3	2,68	0,27

Tabela 82. Rzeka Bzura 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	76	28,2	71	9,40	25,33	0,37

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,5	2	8,87	1,25
Sandacz	2,9	1	10,28	2,90
Płoc	9,6	38	34,04	0,25
Leszcz	0,7	3	2,48	0,23
Karaś pospolity	2,7	8	9,57	0,34
Karaś srebrzysty	9,8	19	34,75	0,52

Tabela 83. Jezioro Płociczno

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
14	36	24,1	103	1,72	2,57	0,67

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	4,9	3	20,33	1,63
Okoń	5,7	22	23,65	0,26
Płoc	4,8	64	19,92	0,08
Leszcz	2,0	4	8,30	0,50
Lin	4,7	6	19,50	0,78
Krąp	2,0	4	8,30	0,50

Tabela 84. Jezioro Natac

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
6	15	22,9	140	3,82	2,50	1,53

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Płoc	11,4	81	49,78	0,14
Karaś pospolity	8,5	49	37,12	0,17
Karaś srebrzysty	2,5	5	10,92	0,50
Wzdreęga	0,5	5	2,18	0,10

Tabela 85. Jezioro Rybnica

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	22	22,7	148	2,27	2,20	1,03

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	3,2	2	14,10	1,60
Okoń	1,2	6	5,29	0,20
Płoc	5,7	91	25,11	0,06
Leszcz	1,8	4	7,93	0,45
Lin	0,9	1	3,96	0,90
Karaś srebrzysty	9,0	25	39,65	0,36
Krap	0,3	4	1,32	0,08
Wzdreęga	0,6	15	2,64	0,04

Tabela 86. Jezioro Widoń

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	13	22,5	79	5,63	3,25	1,73

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,5	2	11,11	1,25
Płoc	5,9	66	26,22	0,09
Leszcz	14,1	11	62,67	1,28

Tabela 87. Zbiornik Rogal

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	17	20,2	164	5,05	4,25	1,19

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	10,4	7	51,49	1,49
Płoc	9,8	157	48,51	0,06

Tabela 88. Staw Kobylocha

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
13	46	20,2	120	1,55	3,54	0,44

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,6	1	7,92	1,60
Płoc	9,3	104	46,04	0,09
Lin	4,1	5	20,30	0,82
Karaś srebrzysty	5,2	10	25,74	0,52

Tabela 89. Jezioro Peł

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	20	19,5	211	4,88	5,00	0,98

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	4,1	3	21,03	1,37
Okoń	0,4	3	2,05	0,13
Płoc	14,2	180	72,82	0,08
Ukleja	0,8	25	4,10	0,03

Tabela 90. Jezioro Chojno

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	15	19,1	197	6,37	5,00	1,27

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	0,9	6	4,71	0,15
Płoc	10,7	180	56,02	0,06
Lin	7,5	11	39,27	0,68

Tabela 91. Jezioro Białobrzegi

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	15	18,4	19	3,68	3,00	1,23

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,4	3	29,35	1,80
Okoń	2,0	5	10,87	0,40
Płoc	3,0	8	16,30	0,38
Leszcz	8,0	3	43,48	2,67

Tabela 92. Jezioro Trzebowo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	8	17,5	50	5,83	2,67	2,19

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Płoc	4,8	38	27,43	0,13
Lin	12,7	12	72,57	1,06

Tabela 93. Jezioro Głęboczek (na cieku bez nazwy)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
9	35	16,2	121	1,80	3,89	0,46

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,4	2	14,81	1,20
Okoń	1,0	4	6,17	0,25
Karp	1,2	1	7,41	1,20
Płoc	7,6	111	46,91	0,07
Leszcz	4,0	3	24,69	1,33

Tabela 94. Młyński Staw

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
9	27	14,8	95	1,64	3,00	0,55

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	6,3	46	42,57	0,14
Płoc	4,2	44	28,38	0,10
Lin	4,3	5	29,05	0,86

Tabela 95. Jezioro Łąki Zawistowe

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	36	14,6	38	2,92	7,20	0,41

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,2	1	15,07	2,20
Płoc	2,6	28	17,81	0,09
Leszcz	5,6	5	38,36	1,12
Lin	4,2	4	28,77	1,05

Tabela 96. Staw Wielgie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	12	14,0	26	4,67	4,00	1,17

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,3	2	9,29	0,65
Lin	10,9	19	77,86	0,57
Karaś srebrzysty	1,6	2	11,43	0,80
Wzdręga	0,2	3	1,43	0,07

Tabela 97. Sierpienica

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	26	13,5	77	4,50	8,67	0,52

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	3,7	3	27,41	1,23
Płoc	9,8	74	72,59	0,13

Tabela 98. Jezioro Głęboć (w obw. J. Rekowe)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
23	42	13,5	30	0,59	1,83	0,32

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	4,8	4	35,56	1,20
Sandacz	4,8	2	35,56	2,40
Okoń	1,1	4	8,15	0,28
Płoc	1,9	19	14,07	0,10
Lin	0,9	1	6,67	0,90

Tabela 99. Jezioro Kępka Szlachecka

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
7	12	12,5	197	1,79	1,71	1,04

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Płoc	9,6	183	76,80	0,05
Karaś pospolity	1,2	3	9,60	0,40
Karaś srebrzysty	1,4	9	11,20	0,16
Krąp	0,3	2	2,40	0,15

Tabela 100. Jezioro Radziszewo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	5	12,4	33	6,20	2,50	2,48

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,0	1	16,13	2,00
Płoc	3,2	25	25,81	0,13
Lin	7,2	7	58,06	1,03

Tabela 101. Jezioro Łażnica

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	7	11,9	34	3,97	2,33	1,70

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,2	1	10,08	1,20
Płoc	1,7	20	14,29	0,09
Lin	4,6	5	38,66	0,92
Karaś srebrzysty	4,4	8	36,97	0,55

Tabela 102. Jezioro Skonieczne

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	8	10,9	17	2,18	1,60	1,36

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	6,4	6	58,72	1,07
Okoń	2,7	9	24,77	0,30
Lin	1,8	2	16,51	0,90

Tabela 103. Jezioro Świesz

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	16	10,6	54	2,65	4,00	0,66

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	0,6	3	5,66	0,20
Płoc	3,4	35	32,08	0,10
Leszcz	4,5	11	42,45	0,41
Karaś srebrzysty	2,1	5	19,81	0,42

Tabela 104. Czarne Gostynińskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	45	10,1	11	2,02	9,00	0,22

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	7,4	6	73,27	1,23
Okoń	0,3	1	2,97	0,30
Lin	0,9	1	8,91	0,90
Karaś srebrzysty	1,5	3	14,85	0,50

Tabela 105. Jezioro Średnie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	20	10,0	55	2,00	4,00	0,50

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	4,4	3	44,00	1,47
Okoń	2,7	9	27,00	0,30
Płoc	2,6	29	26,00	0,09
Ukleja	0,3	14	3,00	0,02

Tabela 106. Staw Ruda

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	8	7,8	35	3,90	4,00	0,98

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	4,6	2	58,97	2,30
Płoc	1,0	16	12,82	0,06
Lin	1,2	1	15,38	1,20
Wzdręga	1,0	16	12,82	0,06

Tabela 107. Basen Brwinów

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	10	7,5	9	1,88	2,50	0,75

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,5	1	33,33	2,50

Okoń	0,5	2	6,67	0,25
Karp	4,0	2	53,33	2,00
Płoc	0,5	4	6,67	0,13

Tabela 108. Basen Kolejniak

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
6	54	7,2	4	1,20	9,00	0,13

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Karp	6,6	3	91,67	2,20
Lin	0,6	1	8,33	0,60

Tabela 109. Czarne Baruchowo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	7	7,1	98	3,55	3,50	1,01

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	0,4	2	5,63	0,20
Płoc	4,3	83	60,56	0,05
Leszcz	2,1	10	29,58	0,21
Wzdreęga	0,3	3	4,23	0,10

Tabela 110. Jezioro Fręcki

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	28	5,6	23	0,56	2,80	0,20

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	1,4	10	25,00	0,14
Płoc	1,0	10	17,86	0,10
Lin	3,2	3	57,14	1,07