

**OCENA PRESJI I POŁOWÓW WĘDKARSKICH W WODACH
UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG MAZOWIECKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
W 2019 ROKU**

Autorzy:

dr inż. Hanna Draszkievicz-Mioduszevska

prof. dr hab. Arkadiusz Wołos

Zakład Bioekonomiki Rybactwa

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

WPROWADZENIE	4
I. DANE OGÓLNE	7
1. ODŁOWY CAŁKOWITE – WYNIKI WĘDKARZY MAZOWIECKIEGO OKRĘGU PZW (TABELA NR I)	7
II. ŁOWISKA WĘDKARSKIE	7
1. OBWODY RYBACKIE.....	7
1.1. <i>Obwód rybacki Narew Nr 7 (Tabela nr 1, Rys. 1)</i>	7
1.2. <i>Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5 (Tabela nr 2, Rys. 2)</i>	8
1.3. <i>Obwód rybacki Wisła Nr 3 (Tabela nr 3, Rys. 3)</i>	9
1.4. <i>Obwód rybacki Narew Nr 6 (Tabela nr 4, Rys. 4)</i>	10
1.5. <i>Obwód rybacki Wisła Nr 4 (Tabela nr 5, Rys. 5)</i>	11
1.6. <i>Obwód rybacki Narew Nr 8 (Tabela nr 6, Rys. 6)</i>	11
1.7. <i>Obwód rybacki Bug Nr 5 (Tabela nr 7, Rys. 7)</i>	12
1.8. <i>Obwód rybacki Skrwa Prawa Nr 1 (Tabela nr 8, Rys. 8)</i>	13
1.9. <i>Obwód rybacki Elk Nr 45 (Tabela nr 10, Rys. 9)</i>	14
1.10. <i>Obwód rybacki Orzyc Nr 1 (Tabela nr 13, Rys. 10)</i>	14
1.11. <i>Obwód rybacki Rozoga Nr 1 (Tabela nr 14, Rys. 11)</i>	15
1.12. <i>Obwód rybacki Rządza Nr 1 (Tabela nr 17, Rys. 12)</i>	16
1.13. <i>Obwód rybacki Nurzec Nr 1 (Tabela nr 18, Rys. 13)</i>	16
1.15. <i>Obwód rybacki Omulew Nr 1 (Tabela nr 29, Rys. 15)</i>	18
1.16. <i>Obwód rybacki Brok Nr 1 (Tabela nr 31, Rys. 16)</i>	18
1.17. <i>Obwód rybacki Bzura Nr 1 (Tabela nr 33, Rys. 17)</i>	19
1.18. <i>Obwód rybacki Utrata Nr 1 (Tabela nr 43, Rys. 18)</i>	20
1.19. <i>Obwód rybacki Biebrza Nr 3 (Wissa) (Tabela nr 45, Rys. 19)</i>	20
1.20. <i>Obwód rybacki Świder Nr 1 (Tabela nr 54)</i>	21
1.21. <i>Obwód rybacki Orz Nr 1 (Tabela nr 59)</i>	21
1.22. <i>Obwód rybacki Zgłowiączka Nr 2 (Tabela nr 70)</i>	22
1.23. <i>Obwód rybacki Jegrznia Nr 11 (Tabela nr 75)</i>	22
1.24. <i>Obwód rybacki Szkwa Nr 1 (Tabela nr 105)</i>	22
1.25. <i>Obwód rybacki Tążyyna (Tabela nr 110)</i>	22
1.26. <i>Obwód rybacki Moltawa Nr 1 (Tabela nr 118)</i>	22
2. JEZIORA ZAKŁADU RYBACKIEGO JANOWO	23
2.1. <i>Jeziro Sasek Wielki (Kobylocha) (Tabela nr 12, Rys. 20)</i>	23
2.2. <i>Jeziro Wałpusz (Tabela nr 19, Rys. 21)</i>	23
2.3. <i>Jeziro Sasek Mały (Tabela nr 22, Rys. 22)</i>	24
2.4. <i>Jeziro Brajnickie (Tabela nr 23)</i>	24
2.5. <i>Jeziro Małszewskie (Tabela nr 28)</i>	25
2.6. <i>Jeziro Piasutno (Tabela nr 38, Rys. 23)</i>	25
2.7. <i>Jeziro Małszewskie (Tabela nr 42)</i>	26
2.8. <i>Pozostałe jeziora Zakładu Rybackiego Janowo</i>	26
3. INNE ŁOWISKA	27
3.1. <i>Jeziro Toczyłowo (Tabela nr 9, Rys. 24)</i>	27
3.2. <i>Jeziro Zdvorskie (Tabela nr 11, Rys. 25)</i>	28

3.3. Glinianki Zielonka (Tabela nr 15, Rys. 2)6.....	28	
3.4. Glinianki Gołków, Głusków, Zalesie (Tabela nr 16, Rys. 27).....	29	
3.5. Glinianki Grodzisk (Tabela nr 21, Rys. 28).....	30	
3.6. Jezioro Ługowskie (Tabela nr 24).....	30	
3.7. Jezioro Przytomne (Tabela nr 25).....	30	
3.8. Staw Krzywie (Tabela nr 26).....	31	
3.9. Jezioro Górskie (Tabela nr 27, Rys. 29).....	31	
3.10. Jezioro Ostrowąs (Plebanka) (Tabela nr 30, Rys. 30).....	32	
3.11. Skoki I (Tabela nr 32, Rys. 31).....	32	
3.12. Jezioro Lucieńskie (Tabela nr 34, Rys. 32).....	33	
3.13. Jezioro Lutoborskie (Tabela nr 35).....	34	
3.14. Jezioro Ciechomickie (Tabela nr 36, Rys. 33).....	34	
3.15. Jezioro Białe (Tabela nr 37, Rys. 34).....	35	
3.16. Jezioro Karaśnia (Tabela nr 39).....	35	
3.17. Zbiornik Chorzele (Tabela nr 40, Rys. 35).....	36	
3.18. Zalew w Makowie Mazowieckim (Tabela nr 41).....	36	
3.19. Jezioro Bytoń (Tabela nr 44, Rys. 36).....	37	
3.20. Glinianki Błonie (Tabela nr 46).....	37	
3.21. Jezioro Wikaryjskie (Tabela nr 47).....	38	
3.22. Jezioro Skrzyneckie (Tabela nr 48).....	38	
3.23. Pozostałe łowiska okręgu.....	38	
<i>Jezioro Mierucie (Tabela nr 49), Glinianki Borowe (Tabela nr 50), Jezioro Grójeckie (Tabela nr 52), Jezioro Okonin (Tabela nr 53), Jeziórko Moczydło (Tabela nr 55), Glinianki Szczęśliwickie (Tabela nr 56), Jezioro Borowiec (Wildno) (Tabela nr 57), Jezioro Skrwilno (Tabela nr 60), Staw Talar (Tabela nr 61), Jezioro Pomocnia (Tabela nr 62), Jezioro Telązyna (Tabela nr 63), Jezioro Czarne Włocławskie (Tabela nr 64), Jezioro Brzeźno (Tabela nr 67), Jezioro Ostrowickie (Tabela nr 68), Stawy w Parku Pruszków (Tabela nr 69), Staw Kozioł Wincenta (Tabela nr 72), Zbiornik Soczewka (Tabela nr 74), Jezioro Huta (Tabela nr 77), Jezioro Czarownica (Borzymińskie) (Tabela nr 78), Skoki II (Tabela nr 79), Jezioro Kępka Szlachecka (Tabela nr 80), Staw Montoprzem (Tabela nr 81), Zbiornik Niewiadoma (Tabela nr 82), Jezioro Czarne Gostynińskie (Tabela nr 83), Jezioro Łąki Zawistowe (Tabela nr 85), Jezioro Głębozec (na cieku bez nazwy) (Tabela nr 87), Kocioł (Tabela nr 88), Jezioro Łuba (Tabela nr 89), Jezioro Lubiechowo (Tabela nr 90), Jezioro Peł (Tabela nr 93), Jezioro Szczutkowskie (Tabela nr 94), Jezioro Rybnica (Tabela nr 95), Jezioro Białobrzegi (Tabela nr 96), Jezioro Służewo (Tabela nr 97), Jezioro Chojno (Tabela nr 98), Jezioro Widoń (Tabela nr 99), Sierpienica (Tabela 101), Jezioro Czarne Baruchowo (Tabela nr 103), Basen Brwinów (Tabela nr 104), Glinianka Włochy (Tabela nr 106), Jezioro Świesz (Tabela nr 107), Jezioro Czarno-Czerskie (Tabela nr 108), Tązyna (Tabela nr 110), Jezioro Radziszewo (Tabela nr 111), Staw Lubraniec (Tabela nr 112), Basen Kolejniak (Tabela nr 113), Jezioro Czerskie (Tabela nr 115), Staw Ruda (Tabela nr 119), Staw Wielgie (Tabela nr 120), Jezioro Trzebowo (Tabela nr 121), Jezioro Radzynek (Paproty) (Tabela nr 125), Wymysłów (Tabela nr 126), Glinianka Bagienice (Tabela nr 128), Jezioro Habdzin (Tabela nr 129), Glinianka Tłuszcz (Tabela nr 130), Zbiornik Garwolin (Tabela 131).....</i>		38

III. PODSUMOWANIE 39

IV. TABELE..... 41

WPROWADZENIE

Po zakończeniu sezonu wędkarskiego 2019, do analizy otrzymano prawidłowo wypełnione rejestry z danymi o odłowach wędkarskich uzyskanych przez badanych wędkarzy w następujących obwodach rybackich, użytkowanych przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego:

- **Wisła Nr 3** – odcinek od ujścia rzeki Pilica do ujścia rzeki Narew, jezioro Czerskie, jezioro Gocławskie, jezioro Kamionkowskie, jezioro Rokola, jeziora Wilanowskie, Stawy Skaryszewskie, jezioro Łacha Nowowiejska (Józefów k/Otwocka);
- **Wisła Nr 4** – odcinek od ujścia rzeki Narew do ujścia rzeki Motława;
- **Narew Nr 6** – odcinek od ujścia rzeki Szkwa do ujścia rzeki Orzyc, jezioro Sieluńskie, starorzecze Zimna Woda;
- **Narew Nr 7** – Zbiornik Zegrzyński, rzeka Narew od ujścia rzeki Orzyc, rzeka Bug od ujścia rzeki Liwiec, Kanał Żerański, jezioro Stawinoga, rzeka Prut;
- **Narew Nr 8** – odcinek od czoła zapory zbiornika Zegrzyńskiego do ujścia do rzeki Wisła;
- **Bug Nr 5** – rzeka Bug na odcinku od ujścia rzeki Nurzec do ujścia rzeki Liwiec oraz zbiorniki Sterdyn i Niewiadoma
- **Brok Nr 1** – rzeka Brok od źródeł do ujścia do rzeki Bug;
- **Omulew Nr 1** – rzeka Omulew od wypływu z jeziora Omulew do ujścia do rzeki Narew oraz rzeka Sawica, rzeka Czarka, rzeka Wałpusza, rzeka Lelkowska Struga;
- **Orzyc Nr 1** – rzeka Orzyc od jej źródeł do ujścia do rzeki Narew;
- **Orz Nr 1** – rzeka Orz od źródeł do ujścia do rzeki Narew;
- **Rozoga Nr 1** – rzeka Rozoga od wypływu z jeziora Marksoby do ujścia do rzeki Narew, kanał Wach;
- **Szkwa Nr 1** – rzeka Szkwa od mostu w miejscowości Rozogi do ujścia do rzeki Narew, rzeka Rozoga od wypływu z jeziora Świętajno do mostu w miejscowości Rozogi;
- **Jeziorka Nr 1** – rzeka Jeziorka od źródeł do ujścia do rzeki Wisła, rzeka Kraska oraz zbiorniki Głuchów i Osieczek;
- **Świder Nr 1** – rzeka Świder od źródeł do ujścia do rzeki Wisła;
- **Rządza Nr 1** – rzeka Rządza od źródeł do ujścia do zbiornika Zegrzyńskiego;
- **Utrata Nr 1** – rzeka Utrata od źródeł do ujścia do rzeki Bzura oraz rzeka Rokitnica;
- **Nurzec Nr 1** – rzeka Nurzec od źródeł do ujścia do rzeki Bug;
- **Elk Nr 45** – rzeka Elk na odcinku od jazu piętrzącego elektrowni w miejscowości Nowa Wieś Elcka do granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego (BNP), Kanał Kuwasy na odcinku od osi

podłużnej mostu w miejscowości Czarna Wieś do rzeki Ełk, Kanał Rudzki na odcinku od rzeki Ełk do granicy BNP;

- **Biebrza Nr 3 (Wissa)** – rzeka Kosodka (Golda) na odcinku od źródeł do granicy BPN, rzeka Klimaszewnica na odcinku od źródeł do granicy BPN, rzeka Wissa na odcinku od źródeł do granicy BPN (m. Łoje Awissa);
- **Jęgrznia Nr 11** – rzeka Jęgrznia na odcinku od ujścia cieką Zgniłka do granicy BPN;
- **Skrwa Prawa Nr 1** - rzeka Skrwa Prawa od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki. Uwaga: Rezerwaty przyrody „Sikórz” i „Brudzeńskie Jary” w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym zakaz połowu ryb na rzece Skrwa Prawa od miejscowości Sikórz do piętrzenia w miejscowości Radotki;
- **Zgłowiączka Nr 2** - rzeki Zgłowiączka na odcinku od przekroju poprzecznego w odległości 100 m od wypływu z jeziora Rybiny do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, rzeka Chodeczka na odcinku od 50 m poniżej wypływu z jeziora Krukowskie do ujścia do rzeki Zgłowiączka, rzeka Lubieńka na odcinku od 30 m od jej wypływu z jeziora Kaczawka do jej ujścia do rzeki Zgłowiączka wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki, z wyłączeniem jezior oraz z wyłączeniem odcinka rzeki Rakutówka od źródeł do wypływu z jeziora Rakutowskie;
- **Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5** - Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od ujścia rzeki Motława do granicy regionu wodnego Środkowej Wisły i regionu wodnego Dolnej Wisły stanowiącej linię prostopadłą do przeciwnego brzegu w 684+000 km biegu rzeki Wisła, wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Motława, Skrwa Lewa, Skrwa Prawa, Zgłowiączka, Ruda, Zuzanka, Rybniczanka, Wierzniczka, Bętlewianka i Chemiczka;
- **Moltawa nr 1** - Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Moltawa od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła;
- **Bzura nr 1** - Obwód rybacki obejmuje wody: rzeki Bzura na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Ochnia oraz wody rzeki Ochnia;
- **Tążyna** - Obwód rybacki obejmuje wody: rzeki Tążyna w górnym biegu zwanej Kanał Parchański, z wodami jej dopływów, od źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Służewo.

Oprócz tego, wędkarze zarejestrowali odłowy w innych wodach niebędących składnikami ww. obwodów rybackich. Były to wody:

– jeziora użytkowane przez Zakład Rybacki Janowo:

- **Brajnickie, Burdąg, Głębozec** (w obw. J. Rekowe), **Grom, Jasne, Klimek** (Konik), **Lemańskie, Łażnica, Machniacz, Malszeweckie, Malszewskie, Świętajno** (Narty), **Natać, Płociczno, Piasutno, Rekowe, Sasek Wielki, Sasek Mały, Sędańskie, Skonieczne, Średnie, Walpusz, Warchałdzkie, Zielonka, Nożyce** – w zlewni rzeki Szkwa nr 3, **Piasutno** (w obw. Rzeki Szkwa nr 4), **Staw Kobylucha** – m. Szczytno;

– oraz pozostałe wody Okręgu Mazowieckiego PZW:

- jeziora: **Białe** – gm. Gostynin, **Białobrzegi** – gm. Bodzanów, **Borowiec (Wildno)** – na cieku Struga Wilenica, gm. Lipno, **Brzeźno** – gm. Koneck, **Bytoń** – gm. Bytoń, **Chojno** – gm. Chrostkowo, **Ciechomiczkie** – gm. Łąck, **Czarno-Czerskie** – gm. Wielgie, **Czarownica (Borzymińskie)** – gm. Rypin, **Czerskie** – gm. Góra Kalwaria, **Głębozec** (na cieku bez nazwy – gm. Brzuze), **Górskie** – gm. Łąck, **Grójeckie** – gm. Boniewo, **Huta** – gm. Rypin, **Karaśnia** – gm. Izbica Kuj., **Kępka Szlachecka** – gm. Kowal, **Lubiechowo** – gm. Kowal, **Lucieńskie** – gm. Gostynin, **Lutoborskie** – gm. Chocień, **Łąki Zawistowe** – gm. Boniewo, **Luba** – gm. Włocławek, **Ługowskie** (w zlewni rzeki Chodeczka nr 5) – gm. Chocień, **Mierucie** – m. Grajewo, **Okonin** – gm. Brzuze, **Ostrowickie** – gm. Brzuze, **Peł** – gm. Chrostkowo, **Plebanka** (Ostrowąs) – gm. Aleksandrów Kuj., **Pomocnia** – m. Błędowo k/Pomiechówka, **Przytomne** – gm. Gostynin, **Rybnica** – gm. Włocławek, **Skrwilno** – gm. Skrwilno, **Skrzyneckie** – gm. Baruchowo, **Szczutkowskie** – gm. Chocień, **Świesz** – gm. Bytoń, **Telażyna** – gm. Włocławek, **Toczyłowo** w zlewni rzeki Ełk nr 43 – gm. Grajewo, **Widoń** – gm. Włocławek, **Wikaryjskie** – gm. Włocławek, **Zdworskie** – gm. Łąck;
- rzeka: **Sierpienica** – dopływ Skrwy Prawej;
- glinianki: **Bagienice** – gm. Chorzele, **Błonie** – m. Błonie, **Borowe** – gm. Zaręby Kościelne, **Gółków, Głosków, Zalesie** – miejscowość Piaseczno, **Grodzisk** – m. Grodzisk Mazowiecki, **Szczęśliwickie** – m. Warszawa Ochota, **Tłuszcz** – Mokra Wieś, **Włochy** – Warszawa Włochy, **Zielonka** – m. Zielonka k/Wołomina);
- stawy: **Jedwabne** – m. Jedwabne, **Koziół Wincenta** – gm. Kolno, **Krzywie** – gm. Zgierz, **Lubraniec** – gm. Lubraniec, **Młyński Staw** – gm. Koronowo, **Ruda** – Nadleśnictwo Ruda pow. Włocławek, **Wielgie** – gm. Wielgie, **W Parku Pruszków** – gm. Pruszków, **Talar i Montoprzem** – gm. Dobroń, **Wymysłów** – gm. Dobroń;
- inne zbiorniki: **Basen Brwinów** – m. Brwinów, **Basen Kolejniak** – m. Sulejówek, **Chorzele** – gm. Chorzele, **Czarne Baruchowo** – gm. Baruchowo, **Czarne Gostynińskie** – gm. Gostynin, **Czarne Włocławskie** – gm. Włocławek, **Habdzin** – gm. Konstancin –Jeziorna, **Jeziórko**

Moczydło – m. Karczew, **Kociol** – gm. Gostynin, **Niewiadoma** – gm. Wyszaków, **Skoki I** – gm. Włocławek, **Skoki II** – gm. Włocławek, **Służewo** – gm. Aleksandrów Kuj., **Soczewka** – gm. Gostynin, **Radziszewo** – gm. Baruchowo, **Radzynek** (Paproty) – gm. Brzuze, **Trzebowo** – gm. Baruchowo, **Zalew w Makowie Mazowieckim** – m. Maków Mazowiecki.

Wszystkie dane zawarte w kwestionariuszach ankietowych zostały wprowadzone do bazy danych komputera, a następnie poddane stosownym analizom, których wyniki przedstawione są w niniejszym opracowaniu.

W metodyce badań przyjęto, że dla wiarygodnego opracowania wyników odłowu niezbędne jest dysponowanie zbiorem danych, reprezentujących, co najmniej 3% całej populacji 74521 wędkarzy, członków Okręgu Mazowieckiego w 2019 roku. Zwrócono 49841 rejestrów, z czego 6681 zawierało dane o uzyskanych odłowach i zostało poddanych analizie, co stanowiło 8,97% ogólnej liczby członków tego okręgu.

I. Dane ogólne

1. Odłowy całkowite – wyniki wędkarzy Mazowieckiego Okręgu PZW (Tabela nr I)

Na 1 wędkarza średnio przypadało 10,14 dni wędkowania w ciągu całego roku, natomiast średni roczny odłów wyniósł 7,54 kg, co daje całkowity zarejestrowany odłów w wysokości 50352 kg ryb. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego osiągnął poziom 0,74 kg.

W odłowach wędkarskich wystąpiło ponad 28 gatunków ryb, z czego trzy w zdecydowanie największych ilościach: leszcz (34,3%), płóc (15,6%) i szczupak (11%).

W następnych rozdziałach opracowania, podobnie jak w poprzednich opracowaniach, skupimy się głównie na wynikach dotyczących wszystkich obwodów rybackich wymienionych we „Wprowadzeniu”, następnie jezior będących w gestii Zakładu Rybackiego Janowo i pozostałych łowisk okręgu, gdzie całkowity zarejestrowany odłów był wyższy niż 100 kg.

II. Łowiska wędkarskie

1. Obwody rybackie


1.1. Obwód rybacki Narew Nr 7 (Tabela nr 1, Rys. 1)

Przedstawione poniżej wyniki dotyczą całego obwodu rybackiego Narew Nr 7, w skład którego wchodzi głównie Zbiornik Zegrzyński, ale także dolne odcinki rzek Bug i Narew, jezioro Stawinoga oraz Kanał Żerański i rzeka Prut. W wodach całego obwodu Narew Nr 7 zarejestrowało połowy 1390

wędkarzy. Globalny odłów osiągnął 12352 kg ryb, na 1 wędkującego przypadało średnio 11,61 dni wędkowania w ciągu roku, 8,89 kg złowionych ryb, oraz dzienny odłów w wysokości 0,77 kg.

W odłowach z całego obwodu Narew Nr 7 wystąpiły 24 gatunki ryb, co dość dobrze świadczy o bioróżnorodności występującego w wodach obwodu pogłowia ryb (Rys. 1).

Z wyróżnionych grup gatunków, najliczniejsze były mniej cenne karpowate – leszcz, płoć i krap, stanowiące odpowiednio 50,6%, 8,8% i 7,4% (łącznie 66,8%), ale dość liczną grupą były także podstawowe gatunki drapieżne (łącznie 26,8%), a więc szczupak (10%), okoń (8%), sum (4,4%), sandacz (3,4%) oraz boleń (0,9%). Gwoli ścisłości warto jednak zaznaczyć, że łączny udział gatunków drapieżnych był o kilka punktów procentowych niższy niż w sezonie 2017. 3,8% odłowów stanowił lin, a udziały pozostałych gatunków nie przekraczały 1%. Sytuacja powyższa świadczy o korzystnych relacjach między gatunkami drapieżnymi a karpowatymi występującymi w wodach obwodu. Nieznaczące ilości gatunków reofilnych w odłowach wędkarskich wynikają z faktu, że przeważająca część odłowów była rejestrowana w Zbiorniku Zegrzyńskim i Kanale Żerańskim, a więc praktycznie w stagnujących partiach obwodu rybackiego Narew Nr 7. Ich niewielki udział nie przekreśla jednak faktu, że warunki wędkowania panujące w 2019 roku w tych wodach należy ocenić jako korzystne. Wypada stwierdzić za raportem z roku ubiegłego, że pomimo wysokiego poziomu troficznego Zbiornika Zegrzyńskiego, czego wyrazem jest przewaga mniej cennych gatunków karpowatych w pogłowiu ryb, umiejętnie prowadzona polityka zarybieniowa, a także odpowiednio sterowana eksploatacja narzędziami rybackimi, pozwalają utrzymać pogłowie ryb we względnej równowadze, a także zapewnić relatywnie wysokie walory wędkarskie wód wchodzących w skład obwodu rybackiego rzeki Narew Nr 7.




Rys. 1. Narew nr 7 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 12 352 kg)

1.2. Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5 (Tabela nr 2, Rys. 2)

W roku 2019 w obwodzie rzeki Wisły Nr 5 w Zbiorniku Włocławskim zarejestrowało swoje połowy 551 wędkarzy spędzając na łowisku średnio 12,46 dni. Sumaryczny odłów wyniósł 5590 kg ryb, średni roczny odłów na 1 wędkującego 10,15 kg, a średni odłów dzienny na poziomie 0,81 kg.

Na atrakcyjną strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 21 gatunków ryb (Rys. 2). W grupie drapieżników na pierwszym miejscu był, jak i przed rokiem sum (21,2%) o średniej masie osobniczej 8,63 kg, a towarzyszyły mu sandacz (8,6%), szczupak (6,4%), okoń (3,7%) i boleń (3,1%), co wraz z pojedynczo zanotowanymi egzemplarzami węgorza i miętusa łącznie dało 43-procentowy udział tej grupy w odłowach. W grupie karpiovatych leszcz stanowił 23,9%, karaś srebrzysty 15,8%, płoć 2,3%, krap 2,1%, a cenniejsze karpiovate reprezentował średnio 2,09-kilogramowy karp z odsetkiem 10,4%. Cenne gatunki uzupełniały pojedyncze sztuki reofilnych karpiovatych, a udziały pozostałych gatunków nie przekraczały 1%. Była to stosunkowo atrakcyjna struktura gatunkowa wśród opisywanych łowisk.




Rys. 2. Zbiornik Włocławski - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 5 590 kg)

1.3. Obwód rybacki Wisła Nr 3 (Tabela nr 3, Rys. 3)

W roku 2019 w wodach obwodu rybackiego Wisła Nr 3 zarejestrowało połowy 641 wędkarzy, którzy złowili ogółem 5008 kg ryb, średni roczny odłów uzyskany przez 1 wędkującego wyniósł 7,81 kg, przy 10,02 dniach wędkowania i średnim dziennym odłowem na 1 wędkarza wynoszącym 0,78 kg.

W odłowach odnotowano ponad 25 gatunków ryb, wśród których średnio 0,96-kilogramowy leszcz stanowił 42,6% masy wszystkich złowionych w omawianym obwodzie ryb (Rys. 3). Łącznie z krapkiem (10,4%) i płocią (4,7%) stanowił 57,7%. Łączny udział drapieżników wynosił 29,8%, w tym poza rzadko łowionymi miętusem i węgorzem – sum był obecny w 13,3%, szczupak 6,9%, sandacz 4,3%, boleń 3,6% i okoń 1,7%. Udziały reofilnych gatunków karpiovatych były zauważalne w całkowitym odłowem i wynosiły: klenia 2,5%, jazia 1,4%, certy 1,3%, średnio 1,88-kilogramowej brzany 0,6% i świnki (0,1%). Z innych gatunków warto wymienić karpia (2,3%) o średniej masie pojedynczego osobnika 2,82 kg i karasia srebrzystego (1,6%), natomiast pozostałe gatunki występowały w odłowach w niewielkich ilościach.




Rys. 3. Wisła nr 3 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 5 008 kg)

1.4. Obwód rybacki Narew Nr 6 (Tabela nr 4, Rys. 4)

W roku 2019 w wodach obwodu rybackiego rzeki Narew Nr 6 swoje połowy zarejestrowało 486 wędkarzy, łowiących ogółem 3032 kg ryb. Średnio na 1 wędkarza przypadało 14,53 dni wędkowania oraz roczny odłów 6,24 kg ryb, co daje wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego na poziomie 0,43 kg.

W odłowach zarejestrowanych w obwodzie Narew Nr 6 łączny udział drapieżników wyniósł 25,1%, natomiast łączny odsetek mniej cennych karpiowatych wyniósł około 61,8%. W grupie drapieżników poza szczupakiem (11%) sum, okoń i sandacz stanowiły odpowiednio 6,9%, 5,1% i 1,7%, a bolenie występowały w odłowach jako pojedyncze sztuki. Wśród mniej cennych karpiowatych, poza 34,3% udziałem dość atrakcyjnego leszcza (średnia masa 1,15 kg), odsetki płoci i krapia wynosiły odpowiednio 17,7% i 9,8% (Rys. 4). Z innych gatunków należy wymienić 4,8% udział lina, 3,7% klenia, 1,5% jazia oraz jedną 46-kilogramową sztukę tołpygi. Udziały pozostałych gatunków nie przekroczyły 1%.



Rys. 4. Narew nr 6 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 3 032 kg)


W sumie, tak jak przed rokiem, warunki wędkowania w wodach obwodu Narew Nr 6 były dość korzystne z racji obecności dużych leszczy oraz gatunków drapieżnych, a zwłaszcza szczupaka (średnia masa 1,77 kg), suma (średnia masa 9,91 kg) i boleń (średnia masa 1,94 kg). Obwód rzeki Narew Nr 6 należał do dość interesujących łowisk Mazowieckiego Okręgu PZW.

1.5. Obwód rybacki Wisła Nr 4 (Tabela nr 5, Rys. 5)

W roku 2019 w obwodzie Wisły Nr 4 rejestry wypełniło 210 wędkarzy, którzy pojedynczo łowili średnio 1,21 kg ryb na dzień, co dało całkowity zarejestrowany odłów na poziomie 2888 kg ryb. Na każdego z wędkarzy przypadało średnio 11,41 dni wędkowania, a rocznie łowili średnio 13,75 kg ryb.

W zarejestrowanych odłowach wędkarskich wystąpiło ponad 21 gatunków ryb (Rys. 5), z których przeważającą (63%) grupą były mniej cenne karpioвате – i identycznie jak w badaniach z lat 2005-2018, zwraca uwagę wysoka średnia masa złowionych osobników leszcza, wynosząca aż 2,26 kg z udziałem tego gatunku równym 55,9%. W grupie tej zanotowano także krapia (3,9%) i płoć (3,2%). Grupa gatunków drapieżnych, stanowiąca w przeciwstawie łącznie prawie 30,5%, reprezentowana była głównie przez dwa gatunki: średnio 11,01-kilogramowego suma z udziałem 18,3% oraz średnio 3,30-kilogramowego sandacza z udziałem 6,7%. Kolejne miejsca zajęły: szczupak (2,5%), średnio 2,43-kilogramowy boleń (2,3%) oraz okoń (0,6%).

Z pozostałych gatunków warto zauważyć karasia srebrzystego, który stanowił 2,1%, oraz rzadziej notowanego klenia, jazia, brzana, certę, świnkę oraz kilka sztuk karpia (0,6%) o atrakcyjnej średniej masie pojedynczego osobnika 3,20 kg.




Rys. 5. Wisła nr 4 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 2 888 kg)

1.6. Obwód rybacki Narew Nr 8 (Tabela nr 6, Rys. 6)

W wodach omawianego obwodu rybackiego w roku 2019 swoje połowy zarejestrowało 305 wędkarzy, a ogólny odłów wyniósł 2648 kg ryb. Przeciętnie na 1 wędkującego przypadało 9,80 dni

wędkowania i odłów roczny w wysokości 8,68 kg ryb, co daje wskaźnik średniego dziennego odłowu na poziomie 0,89 kg.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiły 22 gatunki ryb, wśród których w większości łowiono mniej cenne karpowate – leszcza, płoć i krąpia (Rys. 6), łącznie stanowiące 79,3%, przy czym leszcz stanowił 68,8%, a jego średnia masa osobnicza wynosiła 1,25 kg; płoć stanowiła 5,4%, a krąp 5,1%. Jeżeli chodzi o gatunki drapieżne, to stanowiły one odpowiednio: szczupak 7,3%, sum 3,6%, okoń 2,1%, sandacz 1,8%, boleń 1,1%, a węgorz i miętus to pojedynczo odnotowane sztuki. Ich łączny udział osiągnął jedynie 16,2% i był tym samym dużo niższy od poprzedniego sezonu. Udziały pozostałych gatunków nie przekraczały 1%.




Rys. 6. Narew nr 8 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 2 648 kg)

1.7. Obwód rybacki Bug Nr 5 (Tabela nr 7, Rys. 7)

W 2019 roku swoje połowy w wodach obwodu rybackiego rzeki Bug Nr 5 zarejestrowało 370 wędkarzy, którzy złowili ogółem 2614 kg ryb, średnio na 1 wędkarza przypadało 13,49 dni wędkowania. Średni roczny odłów wyniósł 7,06 kg ryb, co daje wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego na poziomie 0,52 kg.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiły 22 gatunki ryb. Łączny udział leszcza, krąpia i płoci wynosił 49,4% (Rys. 7), przy czym najwięcej łowiono średnio 1,03-kilogramowego leszcza (26,5%), następnie nieco mniej krąpia (13,3%) i płoci (9,6%). W grupie gatunków drapieżnych wyróżnić należy średnio 1,87-kilogramowego szczupaka z udziałem 16,4%, a następnie towarzyszące mu: sandacza (7,1%), suma (7,1%), okonia (3,3%), bolenia (1,7%) i miętusa. Karpowate reofilne reprezentował kleń z udziałem 3,3% i jaź 1,3% oraz pojedynczo brzana i świnka. Ponadto, należy wymienić karasia srebrzystego (3,8%) oraz lina (3,5%). W sumie warunki wędkowania w obwodzie rybackim Bug Nr 5 można uznać za dość korzystne.




Rys. 7. Bug nr 5 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 2 614 kg)

1.8. Obwód rybacki Skrwa Prawa Nr 1 (Tabela nr 8, Rys. 8)

W sezonie 2019 w łowisku tym zarejestrowało swoje połowy 234 wędkarzy, całkowity odłów wyniósł 2312 kg ryb. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego osiągnął 1,46 kg, rocznie 9,88 kg, a statystyczny wędkarz spędzał na łowisku średnio 6,78 dnia.

W odłowach wędkarskich wystąpiło 10 gatunków ryb (Rys. 8), z których cały zanotowany odłów ponownie i zdecydowanie zdominowała płoć z udziałem 91,3%. Przy takiej przewadze można wspomnieć jedynie o 4,6% leszcza, 1,3% szczupaka i 1,1% okonia, natomiast udziały innych gatunków nie przekraczały 1%. Należy jedynie dodać, iż z pozostałych gatunków zanotowano liny, krapie i wzdręgi oraz pojedynczo klenie, jazie i jelce. Strukturę gatunkową odłowów wędkarskich należy określić, jako bardzo monotonna.




Rys. 8. Skrwa Prawa nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 2 312 kg)

1.9. Obwód rybacki Elk Nr 45 (Tabela nr 10, Rys. 9)

W roku 2019 w omawianym obwodzie rybackim rzeki Elk Nr 45 swoje połowy zarejestrowało 32 wędkarzy, a całkowity odłów wyniósł 788,0 kg ryb, co daje średnio 24,63 kg na 1 wędkującego rocznie i 3,01 kg w 1 dniu wędkowania, przy spędzonych średnio 8,19 dniach nad wodą.

W odłowach wystąpiło 8 gatunków ryb (Rys. 9). Przeważały mniej cenne karpiowate – głównie płoć z udziałem 73,5%, leszcz 1,5%, krąp 1,1% oraz wzdreğa – stanowiły łącznie 76,1%. Drapieźniki (łącznie 15%) reprezentowane były jedynie przez średnio 1,60-kilogramowego szczupaka, który stanowił 14,3% oraz okonia z udziałem 0,7%. Grupę reofilnych reprezentowały: średnio 1,23-kilogramowy kleń (6,4%) i 1,06-kilogramowy jaź (2,6%).




Rys. 9. Elk nr 45 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 788,0 kg)

1.10. Obwód rybacki Orzyc Nr 1 (Tabela nr 13, Rys. 10)

W sezonie 2019 w łowisku tym zarejestrowało swoje połowy 119 wędkarzy. Całkowity odłów wyniósł 526,9 kg ryb. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego osiągnął 0,50 kg, rocznie 4,43 kg, a wędkarz spędzał na łowisku średnio 8,82 dnia.

W odłowach wędkarskich wystąpiło 14 gatunków ryb (Rys. 10). Grupa drapieźników (łącznie 29,1%) reprezentowana była głównie przez szczupaka o średniej masie osobniczej 1,60 kg, stanowiącego 20,1%, w towarzystwie okonia z udziałem 7,7% i sandacza (1,4%). Grupa mniej cennych karpiowatych (płoć, leszcz i krąp) stanowiła łącznie 37,8%, z przewagą płoci z udziałem 29,3% oraz udziałami leszcza (8,2%) i krąpia (0,3%). W połowach odnotowano 5,6% średnio 0,82-kilogramowego klenia oraz 1% średnio 0,87-kilogramowego jazia. Wśród pozostałych gatunków warto wymienić średnio 4,30-kilogramowego karpia z udziałem 12,2%, „pozostałe” gatunki (6,9%), lina z odsetkiem 5,2%, a także karasia srebrzystego (1,7%). Udziały pozostałych gatunków nie przekraczały 1%.




Rys. 10. Orzyc nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 526,9 kg)

1.11. Obwód rybacki Rozoga Nr 1 (Tabela nr 14, Rys. 11)

W wodach tego łowiska swoje połowy zarejestrowało 99 wędkarzy, całkowity odłów wyniósł 520,4 kg ryb, a wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkarza 0,57 kg, co daje średnio 5,26 kg na 1 wędkującego rocznie, przy spędzonych średnio 9,20 dniach nad wodą.

W odłowach wystąpiło 11 gatunków ryb (Rys. 11), z których grupa mniej cennych karpiowatych stanowiła łącznie 65,2% (w tym leszcza 54,3%, płoci 10,1% oraz kilka sztuk krąpia i wzdręgi). Wśród drapieżników łącznie stanowiących 20,5% przeważał szczupak z odsetkiem 10,4%, a towarzyszyły mu jedynie sandacz stanowiący 7,7% i okoń z udziałem 2,4%. Ponadto, zanotowano lina (11,4%) o średniej masie osobniczej 1,14 kg. Z innych łowionych gatunków należy wymienić karpia z udziałem 2% oraz pojedyncze sztuki karasia pospolitego i jazia.




Rys. 11. Rozoga nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 520,4 kg)

1.12. Obwód rybacki Rządza Nr 1 (Tabela nr 17, Rys. 12)

W obwodzie rybackim Rządza Nr 1 wędkowało 118 wędkarzy, a sumaryczny odłów wyniósł 381,6 kg ryb, co daje średni roczny i dzienny odłów na 1 wędkarza na poziomie odpowiednio 3,23 kg i 0,76 kg, przy 4,26 dniach spędzonych nad wodą w ciągu roku przez pojedynczego wędkarza.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 14 gatunków ryb (Rys. 12). Łączny udział trzech zanotowanych gatunków drapieżnych wynosił jedynie 16%, przy czym średnio 1,45-kilogramowy szczupak stanowił 9,1%, okoń 6,7%, a węgorza odnotowano jako pojedynczy egzemplarz. Mniej cenne gatunki karpiołate łącznie stanowiły 61,7%, przy czym leszcz 32,6%, płoć 22,7%, krap 3,7%, a wzdrega 2,7%. Z pozostałych złowionych gatunków niewątpliwą atrakcją łowiska był ponownie lin (17%) o średniej masie 1,05 kg. Zanotowano także 1,7% karpia oraz pojedyncze sztuki jazia (1,5%), klenia i karasi obu gatunków. Przedstawione wyniki wskazują, że stan ichtiofauny i warunki wędkowania w wodach tego obwodu rybackiego były stosunkowo korzystne.




Rys. 12. Rządza nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 381,6 kg)

1.13. Obwód rybacki Nurzec Nr 1 (Tabela nr 18, Rys. 13)

W roku 2019 w obwodzie Nurzec Nr 1 zarejestrowało swoje połowy 65 wędkarzy spędzając nad wodą średnio 9,78 dni, a sumaryczny odłów osiągnął 374,4 kg ryb, przy średnim rocznym odłowieniu na 1 wędkującego 5,76 kg i odłowieniu dziennym na poziomie 0,59 kg.

Na dość atrakcyjną strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 14 gatunków ryb (Rys. 13). Wśród drapieżników (łącznie 47,6%) przeważał średnio 1,70-kilogramowy szczupak stanowiący 39,5%, a towarzyszyły mu jedynie okoń z udziałem 6,8% oraz boleń (1,3%). Grupa mniej cennych karpiołatych (płoć, leszcz, krap, wzdrega i ukleja) stanowiła łącznie 33,1%, w tym głównie z 17,2% udziałem leszcz, 12,9% płoć i 2,9% krap. W połowach odnotowano także karpia (9,5%), lina (5,8%), klenia (2%) oraz jazia (1,3%). Karasie obu gatunków zanotowano jako pojedyncze sztuki.




Rys. 13. Nurzec nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 374,4 kg)

1.14. Obwód rybacki Jeziorka Nr 1 (Tabela nr 20, Rys. 14)

W łowisku tym zarejestrowało swoje połowy 59 wędkarzy, a sumaryczny odłów wyniósł 270,5 kg ryb, co daje średnio 4,58 kg na 1 wędkarza rocznie i 0,73 kg w jednym dniu wędkowania.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło ponad 12 gatunków ryb, a strukturę gatunkową tych odłowów przedstawiono na Rys. 14. Znaczącą część odłowów (łącznie 31%) stanowiły mniej cenne karpowate, w tym płoc 17,6%, leszcz 11,8%, oraz krap, wzdręga i „pozostałe”. W grupie drapieżników (łącznie 25,5%) okoń stanowił 15,3%, średnio 1,75-kilogramowy szczupak 9,7%, a sandacz 0,5% masy zarejestrowanych ryb. Gatunki reofilne reprezentowane były przez klenia (16,6%) i jazia (11,1%). Ponadto, odnotowano 7,7% lina i kilka sztuk karasia srebrzystego. Jeziorkę w omawianym obwodzie można określić, jako rzekę atrakcyjną dla wędkujących.




Rys. 14. Jeziorka nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 270,5 kg)

1.15. Obwód rybacki Omulew Nr 1 (Tabela nr 29, Rys. 15)

W obwodzie rybackim rzeki Omulew Nr 1 w roku 2019 parametry wędkowania były następujące: swoje połowy zarejestrowało 50 wędkarzy, łowiących w sumie 177,6 kg ryb przez średnio 10,62 dnia w roku. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkarza wynosił 0,33 kg, a rocznego 3,55 kg.

W odłowach wystąpiło 12 gatunków ryb (Rys. 15). Grupa mniej cennych gatunków karpiowatych (płoc, leszcz, ukleja i krap) łącznie stanowiła 32,9%, przy czym płoc 28,5%, leszcz 3%, ukleja 1,2%, a krap 0,4%. Gatunki reofilne łącznie stanowiły 24,3% i reprezentowane były przez średnio 1,27-kilogramowego klenia z odsetkiem 12,9% oraz jazia z udziałem 11,4%. Grupę drapieżników (łącznie 36,7%) reprezentowały dwa gatunki – szczupak z udziałem 20,7% i okoń stanowiący 16%. Wymienione trzy grupy gatunków uzupełniane były przez występujące w nieco mniejszych ilościach karasie pospolite (3,9%) i karpie (1,7%). Dość atrakcyjna struktura gatunkowa pozostała zbliżona do dwóch poprzednich sezonów.




Rys. 15. Omulew nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 177,6 kg)

1.16. Obwód rybacki Brok Nr 1 (Tabela nr 31, Rys. 16)

W 2019 roku w łowisku tym zarejestrowało swoje połowy 38 wędkarzy. Całkowity odłów osiągnął 174,5 kg ryb. Średni roczny odłów na 1 wędkującego wyniósł 4,59 kg, a średni odłów dzienny osiągnął poziom 0,59 kg, przy średnio 7,76 dniach spędzonych nad wodą w ciągu roku.

W odłowach zanotowano 10 gatunków ryb (Rys. 16). W omawianym, jak i w poprzednim sezonie, w równowadze pozostawały dwie znaczące grupy: pierwsza drapieżników stanowiących łącznie 48,4% wszystkich zarejestrowanych ryb, z czego 30,4% przypadało na szczupaka, 9,7% na sumę, 6,7% na okonia i 1,6% na sandacza, oraz druga grupa mniej cennych karpiowatych (płoci, leszcza i krapia) stanowiące łącznie 41,8%, przy czym udział płoci wynosił 31,5% a leszcza 9,7%. Ponadto, zanotowano 6,4% lina, 2,4% jazia oraz 1,1% klenia.




Rys. 16. Brok nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 174,5 kg)

1.17. Obwód rybacki Bzura Nr 1 (Tabela nr 33, Rys. 17)

W obwodzie rybackim rzeki Bzura Nr 1 w 2019 roku 39 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 167,7 kg ryb, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 4,30 kg i 0,28 kg. Średnio wędkarz spędził nad wodami omawianego obwodu 15,54 dnia.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 11 taksonów ryb (Rys. 17). Zdecydowanie w strukturze łwionych w obwodzie ryb przeważał karp o średniej masie osobniczej 2,88 kg stanowiący 61,8%. Drapieżniki stanowiły łącznie jedynie 9,5% wszystkich zarejestrowanych ryb. Zdecydowanie najczęściej łwiono szczupaka – 5,7%, któremu towarzyszył sandacz (3,8%). Mniej cennych karpiowatych (płoci, leszcza, krapia i wzdręgi) to łącznie 5,5%. Leszcz stanowił 4,5%, a pojedynczo zanotowano płoc, wzdręgę i krapia. Za atrakcję łwiska można uznać średnio prawie kilogramowego lina z udziałem 12,1%. Karaś pospolity stanowił 5,7%, a srebrzysty 5,1%. Gatunki reofilne odnotowano sporadycznie. W sumie warunki wędkowania w obwodzie rybackim Bzura Nr 1 w roku 2019 można uznać za dość ciekawe.




Rys. 17. Bzura nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 167,7 kg)

1.18. Obwód rybacki Utrata Nr 1 (Tabela nr 43, Rys. 18)

W obwodzie rybackim rzeki Utrata Nr 1 swoje połowy zarejestrowało 39 wędkarzy, łowiących w sumie 124,1 kg ryb, co daje średnio 3,18 kg na 1 wędkującego rocznie i 0,44 kg w 1 dniu wędkowania, przy spędzonych średnio 7,18 dniach nad wodą.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 12 gatunków ryb (Rys. 18). Największym udziałem charakteryzował się średnio 2,77-kilogramowy karp (33,5%), a kolejną grupą były mniej cenne karpiołate – leszcz, płoć, wzdręga i krap, łącznie stanowiące 25,9%, przy czym leszcz 13,1%, płoć 9,2%, wzdręga 2,1%, a krap 1,5%. Drapieżniki reprezentujące trzecią grupę, których łączny udział osiągnął 19,7%, to głównie szczupak (12,5%), okoń (4,8%) i sandacz (2,4%). Udział karasia srebrzystego wynosił 12,5%, lina 4%, jazia 2,4%, a klenia 2%.




Rys. 18. Utrata nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 124,1 kg)

1.19. Obwód rybacki Biebrza Nr 3 (Wissa) (Tabela nr 45, Rys. 19)

W obwodzie rybackim rzeki Biebrza (Wissa) Nr 3 w 2019 roku 8 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 117,7 kg ryb, spędzając na łowisku średnio 7,75 dni, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 14,71 kg i 1,90 kg.

W omawianym obwodzie w strukturze gatunkowej odłowów odnotowano 6 taksonów ryb (Rys. 19). Grupa drapieżników zdominowała (łącznie 72,3%) zanotowane w Biebrzy połowy. Szczupak o atrakcyjnej średniej masie osobniczej 1,80 kg stanowił 55,1% wszystkich zarejestrowanych w tym łowisku ryb i towarzyszył mu jedynie okoń (17,3%). 25,2% należało do płoci, a klenie, jazie i wzdręgi łowiono jako pojedyncze sztuki.



Rys. 19. Biebrza nr 3 (Wissa) - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 117,7 kg)

1.20. Obwód rybacki Świder Nr 1 (Tabela nr 54)

W obwodzie rybackim rzeki Świder Nr 1 swoje połowy zarejestrowało 15 wędkarzy, łowiących w sumie 93,9 kg ryb, wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkarza wynosił 0,60 kg, co daje średnio 6,26 kg na 1 wędkującego rocznie, przy spędzonych średnio 10,40 dniach nad wodą.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 7 gatunków ryb. Wśród odnotowanych gatunków znaczącą rolę pełniła grupa mniej cennych karpiowatych – płoć oraz leszcz (łącznie 45,6%), przy czym płoć stanowiła 29,9%, a leszcz 15,7%. Drapieżniki (łącznie 34,5%) reprezentowane były przez dwa gatunki – szczupaka stanowiącego 24,3% odłowów oraz okonia z udziałem 10,2%. Udział karasia srebrzystego wynosił 9,3%, średnio 2,67-kilogramowego karpia 8,5%, a lina 2,1%.

1.21. Obwód rybacki Orz Nr 1 (Tabela nr 59)

W obwodzie rybackim Orz Nr 1 swoje połowy zarejestrowało 33 wędkarzy, a całkowity odłów zanotowany w roku 2019 wyniósł 86,6 kg ryb, co daje średnio 2,62 kg na 1 wędkującego rocznie i 0,43 kg w 1 dniu wędkowania. Pojedynczy wędkarz spędził średnio na łowisku 6,09 dnia.

W odłowach wystąpiło 8 gatunków ryb, przy czym przeważały mniej cenne karpioвате – głównie płoć z udziałem 36,5% oraz kilkanaście sztuk leszcza (18,6%). W grupie drapieżników (łącznie 32,3%) zarejestrowano: średnio 1,73-kilogramowego szczupaka, którego udział wynosił 20% oraz okonia (12,4%). Z pozostałych gatunków wymienić należy lina (8%) oraz karasia pospolitego (3%) i jedną sztukę klenia. Struktura gatunkowa zanotowanych w roku 2019 połowów bardzo przypomina tę z sezonu 2018.

1.22. Obwód rybacki Zgłowiączka Nr 2 (Tabela nr 70)

W obwodzie rybackim Zgłowiączka Nr 2 wędkowało 13 wędkarzy, a sumaryczny odłów ryb wyniósł 60,0 kg ryb, co daje średni roczny i dzienny odłów na 1 wędkarza na poziomie odpowiednio 4,62 kg i 0,75 kg, przy 6,15 dniach spędzonych nad wodą w ciągu roku przez pojedynczego wędkarza.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 8 gatunków ryb. Łączny udział dwóch zanotowanych gatunków drapieżnych – okonia i szczupaka wynosił 41%, przy czym średnio 1,43-kilogramowy szczupak stanowił 38%, a okoń 3%. Z mniej cennych gatunków karpiowatych (łącznie płoć, krap i wzdręga 45%) należy wyróżnić płoć z udziałem 40,2%. Z pozostałych złowionych gatunków zanotowano także karasia pospolitego (7,8%) oraz pojedyncze osobniki świnki (5,3%) i lina. Struktura gatunkowa zanotowanych taksonów ryb była dość zbliżona do omówionej w poprzednim sezonie.

1.23. Obwód rybacki Jegrznia Nr 11 (Tabela nr 75)

W obwodzie rybackim rzeki Jegrznia Nr 11 w 2019 roku 9 wędkarzy spędzając średnio 4,89 dnia nad wodą, zarejestrowało swoje połowy w ilości 43,6 kg ryb, co daje średnio 4,84 kg na 1 wędkarza rocznie i 0,99 kg w jednym dniu wędkowania.

W omawianym obwodzie w strukturze gatunkowej odłowów odnotowano 8 taksonów ryb. Wśród odnotowanych gatunków przeważała grupa mniej cennych gatunków karpiowatych (łącznie 64,9%), przy czym krap stanowił 36,7%, płoć 20%, a leszcz 8,3% wszystkich zarejestrowanych w obwodzie Jegrzni ryb. Grupa drapieżników reprezentowana była przez 4 gatunki – szczupaka stanowiącego 12,2% odłowów, sandacza 11,9%, okonia z udziałem 7,6% oraz jedną sztukę bolenia (2,1%). Warto zaznaczyć także obecność jazia (1,4%).

1.24. Obwód rybacki Szkwa Nr 1 (Tabela nr 105)

W obwodzie rybackim rzeki Szkwa Nr 1 czterech wędkarzy zanotowało 11,1 kg złowionych ryb. Była to głównie płoć i szczupak. Trudno omówić stan pogłowia ryb, przy tak ograniczonej liczbie parametrów opisujących połowy.

1.25. Obwód rybacki Tążyna (Tabela nr 110)

W obwodzie rybackim rzeki Tążyna dwóch wędkarzy zanotowało odłów 8,0 kg (głównie płoć oraz po kilka sztuk jazia i szczupaka) i bardzo trudno jest omówić stan pogłowia ryb w tym obwodzie.

1.26. Obwód rybacki Mołtawa Nr 1 (Tabela nr 118)


W obwodzie rybackim rzeki Mołtawa Nr 1 dwóch wędkarzy zanotowało odłów 4,5 kg ryb, i tym samym i na tym łowisku, bardzo trudno jest omówić stan pogłowia ryb w tym obwodzie.

2. Jeziora Zakładu Rybackiego Janowo

2.1. Jezioro Sasek Wielki (Kobyłocha) (Tabela nr 12, Rys. 20)

W roku 2019 w jeziorze Sasek Wielki całkowity zarejestrowany odłów wyniósł 753,4 kg ryb, a frekwencja na łowisku – 98 wędkarzy, którzy średnio łowili 1,32 kg ryb dziennie oraz rocznie 7,69 kg, spędzając na łowisku średnio 5,82 dnia.

W omawianym sezonie w składzie odłowów wędkarskich z jeziora Sasek Wielki wystąpiło 9 gatunków ryb (Rys. 20). Łączny udział mniej cennych karpiowatych wynosił 60,9%. Najwięcej złowiono płoci (30,3%) i leszcza (21,1%), mniej wzdregi (7,7%), krapia (1,2%) i ukleja (0,5%). Grupa drapieżników reprezentowana przez szczupaka (26,5%), okonia (9,2%) i bolenia (1,4%) stanowiła łącznie 37% odłowów. Udziały średnio 0,93-kilogramowego lina wynosiły 2,1%. W stosunku do poprzedniego sezonu korzystne warunki wędkowania w jeziorze Sasek Wielki były porównywalne.




Rys. 20. Jezioro Sasek Wielki - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 753,4 kg)

2.2. Jezioro Wałpusz (Tabela nr 19, Rys. 21)

W jeziorze Wałpusz 48 wędkarzy zarejestrowało swe połowy w ilości 278,1 kg ryb, spędzając na łowisku średnio 6,19 dni, natomiast średni odłów roczny i dzienny w przeliczeniu na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 5,79 kg i 0,94 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 8 taksonów (Rys. 21). Z grupy mniej cennych karpiowatych, które łącznie stanowiły 52% wszystkich zarejestrowanych w Wałpuszu ryb, a tym samym przeważały udziały innych gatunków, płoć stanowiła 27,4%, leszcz 18,3%, wzdregę 4,1%, a krap 2,1%. Z drapieżników, które stanowiły 43,3% zdecydowanie najczęściej łowiono szczupaka – 32,7%, w drugiej kolejności okonia – 10,7%. Udział bardzo atrakcyjnego, średnio 1,64-kilogramowego lina wyniósł 4,7%.




Rys. 21. Jezioro Wałpusz - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 278,1 kg)

2.3. Jezioro Sasek Mały (Tabela nr 22, Rys. 22)

W jeziorze Sasek Mały w roku 2019 zarejestrowało swoje połowy 46 wędkarzy, a sumaryczny odłów osiągnął 266,0 kg ryb, przy średnim rocznym odłowie na 1 wędkującego 5,78 kg i odłowie dziennym na poziomie 1,49 kg. Wędkarze spędzali średnio 3,87 dni nad wodą w ciągu roku.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 12 taksonów ryb (Rys. 22). Na mniej cenne gatunki karpioвате rejestrowane najczęściej (łącznie stanowiące 78,5%) składały się płoć (36,7%), leszcz z udziałem 26,1%, krap 14,2%, ukleja 0,9% i wzdrega 0,6%. Drapieżniki, to tylko okoń stanowiący 14,3% złowionych ryb i szczupak z udziałem 2,1%, a pozostałe zarejestrowane gatunki, to lin i karaś srebrzysty z udziałami odpowiednio: 2,4% i 1,5% oraz pojedyncze sztuki klenia i jazia.



Rys. 22. Jezioro Sasek Mały- struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 266,0 kg)

2.4. Jezioro Brajnickskie (Tabela nr 23)

W sezonie 2019 w jeziorze Brajnickskim całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 262,0 kg ryb, a na jednego z 42 wędkarzy, którzy zarejestrowali swoje połowy dziennie przypadało średnio 1,16 kg ryb. Pozostałe parametry opisujące łowisko, to średni roczny odłów na 1 wędkującego na poziomie 6,24 kg i 5,36 dni spędzonych nad wodą.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska, składająca się z ponad 12 gatunków, była następująca: podobnie jak w poprzednim sezonie największym udziałem charakteryzowała się grupa mniej cennych karpiovatych, które łącznie stanowiły 84,7% wszystkich zarejestrowanych w Brajnikach ryb. Leszcz stanowił 37,4%, płoć 31,8%, krap 13,2%, ukleja 1,4%, wzdręga 0,7%. Z grupy drapieźników wymienić można jedynie okonia (1,7%) i po jednej sztuce szczupaka i sandacza. Pozostałe gatunki występowały w znacznie mniejszości: karaś srebrzysty 7,8%, pospolity 2,9%, a lin niecały 1%. Opisana struktura odłowów wędkarskich była jedną z mniej atrakcyjnych wśród analizowanych łowisk.

2.5. Jezioro Małszewskie (Tabela nr 28)


W jeziorze Małszewskim w roku 2019 zarejestrowało swoje połowy, spędzając średnio prawie tydzień, 25 wędkarzy. Sumaryczny odłów osiągnął 185,1 kg ryb, przy średnim rocznym odłowieniu na 1 wędkującego 7,40 kg i odłowieniu dziennym na poziomie 1,01 kg.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 8 gatunków ryb. Łączny udział mniej cennych karpiovatych wynosił 54,7%, z czego najwięcej złowiono płoci (39,9%), a mniej leszcza (12,6%) i krapia (2,2%). Drapieźniki – to szczupak stanowiący 27,5% złowionych ryb oraz okoń z udziałem 12,1%. Z pozostałych gatunków należy wymienić po kilka osobników lina (3,5%), karasia pospolitego (1,7%) i srebrzystego (0,5%).

2.6. Jezioro Piasutno (Tabela nr 38, Rys. 23)

W jeziorze Piasutno w roku 2019 zarejestrowało swoje połowy, spędzając średnio prawie tydzień, 23 wędkarzy. Sumaryczny odłów osiągnął 148,6 kg ryb, przy średnim rocznym odłowieniu na 1 wędkującego 6,46 kg i odłowieniu dziennym na poziomie 0,98 kg.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 10 gatunków ryb (Rys. 23).



Rys. 23. Jezioro Piasutno - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 148,6 kg)

Drapieżniki – to średnio 1,63-kilogramowy szczupak stanowiący 35,1% złowionych ryb, okoi z udziałem 7,1% oraz pojedynczy węgorz. Łączny udział mniej cennych karpiowatych wynosił 33,7%, z czego najwięcej złowiono leszcza (20,9%), a mniej płoci (11,2%) i krąpia (1,7%). Z pozostałych gatunków należy wymienić średnio 1,05-kilogramowego lina (16,9%) oraz pojedynczo występujące osobniki karasia pospolitego i jazia.

2.7. Jezioro Małszewckie (Tabela nr 42)

W jeziorze Małszewckim w roku 2019 zarejestrowało swoje połowy 10 wędkarzy, spędzając średnio 7,60 dni. Sumaryczny odłów osiągnął 125,4 kg ryb, przy średnim rocznym odłowie na 1 wędkującego 12,54 kg i odłowie dziennym na poziomie 1,65 kg.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 9 gatunków ryb. Łączny udział mniej cennych karpiowatych wynosił 86,7%, z czego najwięcej złowiono drobnej płoci (51,8%), a mniej leszcza (32,5%), krąpia (2%) i wzdręgi. Drapieżniki – to jedynie po kilka sztuk szczupaka (5,4%) i okonia (1,1%). Z pozostałych gatunków należy wymienić po kilka osobników lina (3,7%), karasia srebrzystego (2,4%) i pospolitego (0,7%).

2.8. Pozostałe jeziora Zakładu Rybackiego Janowo

Jezioro Burdąg (Tabela nr 51), Staw Jedwabne (Tabela nr 58), Jezioro Warchałdzkie (Tabela nr 65), Jezioro Świętajno (Narty) (Tabela nr 66), Jezioro Sędańskie (Tabela nr 71), Jezioro Grom (Tabela nr 73), Jezioro Rekowe (Tabela nr 76), Staw Kobylcha (Tabela nr 84), Jezioro Głębozec (w obw. J. Rekowe, Tabela nr 86), Jezioro Klimek (Konik) (Tabela nr 91), Jezioro Lemańskie (Tabela nr 92), Jezioro Machniacz (Tabela nr 100), Jezioro Płociczno (Tabela nr 102), Jezioro Średnie (Tabela nr 109), Jezioro Jasne (Tabela nr 114), Jezioro Zielonka (Tabela nr 116), Jezioro Nożyce (Tabela nr 117), Jezioro Natać (Tabela nr 122), Jezioro Skonieczne (Tabela nr 123), Młyński Staw (Tabela nr 124), Jezioro Łażnica (Tabela nr 115).

Na wymienionych jeziorach będących w użytkowaniu Zakładu Rybackiego Janowo w nadesłanych rejestrach odłowy wędkarskie nie przekraczały 100 kg. Poszczególne z ww. łowisk charakteryzowały się następująco:

- **Burdąg** – przewaga mniej cennych gatunków karpiowatych (82%);
- **Staw Jedwabne** – 59,7% karpia;
- **Warchałdzkie** – przewaga drapieżników (51,3%), głównie szczupaka (36%), a także lina (10%);
- **Jezioro Świętajno (Narty)** – przewaga drapieżników, głównie okonia (51,1%)
- **Sędańskie** – przewaga mniej cennych gatunków karpiowatych (80,3%);
- **Grom** – przewaga mniej cennych gatunków karpiowatych (51,2%), drapieżniki 39,7% oraz lin 9,2%;
- **Rekowe** – przewaga mniej cennych gatunków karpiowatych (74,6%);


- **Staw Kobylocha** – przewaga mniej cennych gatunków karpiowatych (53%) oraz 22,5% okonia;
- **Głęбочek (w obw. J. Rekowe)** – przewaga mniej cennych gatunków karpiowatych (56,3%), drapieźniki 37,2% oraz lin 6,6%;
- **Klimek (Konik)** – przewaga drapieźników (52,5% – głównie sandacza (21,2%));
- **Lemańskie** – przewaga mniej cennych gatunków karpiowatych (66,7%);
- **jeziora: Machniacz, Płociczno, Średnie, Jasne, Zielonka, Nożyce, Natać, Skonieczne, Młyński Staw**, – zarejestrowane tu odłowy wynoszą poniżej 20 kg, stąd też bardzo trudno ocenić warunki wędkowania panujące w tych jeziorach, ponadto w jeziorze **Łażnica** nie zanotowano żadnych odłowów, a jedynie obecność jednego wędkarza.

3. Inne łowiska

3.1. Jezioro Toczyłowo (Tabela nr 9, Rys. 24)

W jeziorze Toczyłowo w roku 2019 całkowite zarejestrowane przez 68 wędkarzy odłowy wędkarskie wyniosły 793,7 kg ryb. Wędkarze spędzali średnio 8,87 dnia na łowisku i zarejestrowali swe połowy na dziennym poziomie średnio 1,32 kg, a w ciągu roku po 11,67 kg.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska składała się z 15 taksonów (Rys. 24). Łowiono tu w przewadze drapieźniki (łącznie 52,4%), przy czym ponownie najwięcej było okonia z udziałem 31,4%, szczupaka 14,6%, średnio 16,90-kilogramowego suma (4,3%), sandacza 1,7% oraz pojedyncze egzemplarze bolenia i węgorza. Leszcz, płoć i krap stanowiły odpowiednio 20,3%, 18,6%, 1,1%, co łącznie ze wzdregą dało odsetek 40,1%. Ciekawym urozmaiceniem składu gatunkowego odłowów były: średnio 1,22-kilogramowy lin (3,9%), średnio 2,39-kilogramowy karp (2,4%), oraz po kilka osobników karasia srebrzystego, klenia i jazia.




Rys. 24. Jezioro Toczyłowo - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 793,7 kg)

3.2. Jezioro Zdwońskie (Tabela nr 11, Rys. 25)

W sezonie 2019 w jeziorze Zdwońskim całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 759,6 kg ryb, a na jednego z 75 wędkarzy, którzy zarejestrowali swe połowy dziennie przypadało średnio 0,88 kg, przy średnim rocznym odłowieniu na 1 wędkującego 10,13 kg i średnio 11,53 dniach spędzonych na łowisku.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska składała się z 15 taksonów (Rys. 25). Największym, jeszcze wyższym jak w poprzednim sezonie, łącznym udziałem (53,7%) charakteryzowała się grupa drapieżników, a w grupie tej wyróżniał się ponownie szczupak (31,8%) o średniej masie pojedynczego osobnika 1,87 kg i średnio 2,93-kilogramowy sandacz (16,6%), a towarzyszyły im okoń (2,1%), sum (1,8%) i węgorz (1,5%). Mniej cenione karpowate łącznie stanowiły 33,7%, w tym 14,7% wzdregą, 10,4% leszcz, płoć 6,9%, krap 1,7%, a ukleja 0,1%. Ponadto, zanotowano 6,6% karaśa srebrzystego, 2,8% karpia i 1,9% lina oraz pojedyncze sztuki karaśa pospolitego i amura, które podnosiły dodatkowo atrakcyjność tego łowiska.




Rys. 25. Jezioro Zdwońskie - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 759,6 kg)

3.3. Glinianki Zielonka (Tabela nr 15, Rys. 2)6

W sezonie 2019 Glinianki w Zielonce k/Wołomina odwiedziło 69 wędkarzy, którzy zarejestrowali swe połowy na poziomie 418,1 kg ryb, a na 1 wędkarza spędzającego nad wodą średnio 9,32 dnia, dziennie przypadało średnio 0,65 kg ryb, a rocznie 6,06 kg.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska składała się z 12 taksonów (Rys. 26). Grupa drapieżników – szczupak (12,9%), jedna 15-kilogramowa sztuka suma (3,6%) i okoń (2,2%) – łącznie stanowiła 18,7% połowów i pozostawała w równowadze z grupą mniej cenionych karpowatych, które łącznie stanowiły niemal 12,4% (leszcz 6,8%, płoć 5,2%, a krap 0,4%). Drapieżniki i grupę mniej cenionych karpowatych z odsetkiem 45,8% równoważył z kolei średnio 3,25-kilogramowy karp. Amur (13,5%; średnia masa 5,66 kg), lin o średniej masie 1,05 kg z udziałem 4,3%, oraz karaś srebrzysty

(4,8%) uzupełniały pulę odłowów z tego łowiska, czyniąc je dość urozmaiconym i ciekawym pod względem wędkarskim.




Rys. 26. Glinianki Zielonka - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 418,1 kg)

3.4. Glinianki Gołków, Głoków, Zalesie (Tabela nr 16, Rys. 27)

W 2019 roku 61 wędkarzy odłowiło i zarejestrowało na omawianym łowisku swe połowy na poziomie 415,6 kg ryb, spędzając dziennie nad wodą średnio 9,89 dni, przy średnim rocznym i dziennym odłowieniu na 1 wędkującego w wysokości odpowiednio 6,81 kg i 0,69 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano ponad 14 taksonów (Rys. 27). Głównie łowiono gatunek charakterystyczny dla tego typu wód – średnio 2,50-kilogramowego karpia (63,3%) będącego zdecydowaną atrakcją omawianego łowiska. Jeżeli chodzi o drapieżniki łącznie stanowiące 16% odłowionych ryb, to szczupak stanowił 11,2%, okoń 4,2%, a sandacz 0,9%. Ponadto zanotowano płoc (6,3%), karasia srebrzystego (4,6%), leszcza (3,8%), lina (2,6%), jednego amura (1,2%). Udziały pozostałych sześciu gatunków nie przekraczały poziomu 1%.




Rys. 27. Glinianki Gołków, Głoków, Zalesie - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 415,6 kg)

3.5. Glinianki Grodzisk (Tabela nr 21, Rys. 28)

Warunki wędkowania w omawianym łowisku w roku 2019 charakteryzowały następujące parametry: swoje połowy zarejestrowało 66 wędkarzy na poziomie 269,3 kg ryb, co dało wskaźnik średnio 0,27 kg w 1 dniu wędkowania oraz 4,08 kg w ciągu roku, a pojedynczy wędkarz spędzał na łowisku 15,05 dni.

Struktura gatunkowa zarejestrowanych odłowów składała się z 11 taksonów ryb (Rys. 28), z czego najwięcej złowiono średnio 1,34-kilogramowego karpia (62,3%). Grupa drapieżników stanowiła łącznie 13,9%, przy czym udział szczupaka wyniósł 9,5%, sandacza 2,6%, okonia 1%, a węgorza 0,8%. Poza tym, z pozostałych gatunków warto wymienić 6,7% karasia srebrzystego, 5,4% leszcza, 4,8% krapia, 4,6% amura, 1,8% płoci oraz pojedyncze sztuki lina. Można określić omawiane łowisko dość urozmaiconym i ciekawym pod względem wędkarskim.



Rys. 28. Glinianki Grodzisk - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 269,3 kg)

3.6. Jezioro Ługowskie (Tabela nr 24)

W roku 2019 w jeziorze Ługowskim całkowity zarejestrowany przez 44 wędkarzy odłów wyniósł 254,1 kg ryb, którzy średnio łowili 1,07 kg ryb dziennie oraz rocznie 5,78 kg.

W omawianym sezonie w składzie odłowów wędkarskich z omawianego jeziora wystąpiło 8 gatunków ryb. Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska zdominowana była przez mniej cenione karpowate (86,1%), a głównie płoć (71,5%), leszcz (7%), krapia (5,5%), ukleję (1,5%) i wzdręę. Wobec takiej dominacji odnotowano jedynie 6,9% okonia oraz kilka sztuk szczupaka (1%), a kilkanaście sztuk lina (6%) uzupełniało pulę taksonów w jeziorze.

3.7. Jezioro Przytomne (Tabela nr 25)

W jeziorze Przytomne w 2019 roku 33 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 222,7 kg ryb ogółem, spędzając na łowisku średnio 8,79 dni, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosiły odpowiednio 6,75 kg i 0,77 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 10 taksonów. Z grupy mniej cennych karpiowatych, które łącznie stanowiły 51,7% wszystkich zarejestrowanych w opisywanym jeziorze ryb leszcz stanowił 32,8%, płoć 13,5%, krąp 4,3% oraz mniejsze ilości wzdreğa i ukleja. Drapieźniki, które stanowiły łącznie 36,2%, reprezentowane były przez średnio 1,59-kilogramowego szczupaka (21,4%), suma (9,2%) oraz okonia (5,6%). Należy podkreślić obecność lina, który stanowił 9,5% oraz 2,6% karasia pospolitego.

3.8. Staw Krzywie (Tabela nr 26)


W omawianym łowisku w roku 2019 zarejestrowało swoje połowy 33 wędkarzy, a sumaryczny odłów osiągnął 193,2 kg ryb, przy średnim rocznym odłowem na 1 wędkującego 5,85 kg i odłowem dziennym na poziomie 0,38 kg. Wędkarze spędzali średnio 15,42 dni nad wodą w ciągu roku.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 9 taksonów ryb. Atrakcją łowiska był niewątpliwie 51,9% udział średnio 1,82-kilogramowego karpia. Drapieźniki – szczupak z sandaczem stanowiły łącznie 21,7% złowionych ryb, z czego udziałowi szczupaka wynoszącemu 13,1% towarzyszyło 8,6% sandacza. Na mniej cenne gatunki karpiowate składały się leszcz (10,9%), krąp (1,8%) i płoć. Udział średnio 3,43-kilogramowego amura wynosił 7,1%, lina 4,9%, a karasia pospolitego 1,7%.

3.9. Jezioro Górskie (Tabela nr 27, Rys. 29)

W roku 2019 w jeziorze Górskim całkowity zarejestrowany odłów wyniósł 191,5 kg ryb, a to za sprawą 22 wędkarzy, którzy średnio łowili 0,79 kg ryb dziennie oraz rocznie 8,70 kg, spędzając na łowisku 10,95 dnia.

W strukturze odłowów wędkarskich z omawianego jeziora wystąpiło 11 gatunków ryb (Rys. 29).




Rys. 29. Jezioro Górskie - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 191,5 kg)

Pierwsza grupa mniej cennych karpiowatych, reprezentowana była przez leszcza z udziałem 34,8%, bardzo drobną płoć z odsetkiem 5,7% oraz wzdręgę (1,2%). Grupa ta stanowiła łącznie 41,7% odłowów. Wobec tych udziałów w mniejszości pozostawał łączny udział drapieźników (20,7%), przy czym najwięcej złowiono średnio 1,51-kilogramowego szczupaka (14,2%), następnie 2,5% okonia oraz pojedyncze sztuki węgorza (2%), sandacza (1,3%) i suma. W odłowach zanotowano ponadto atrakcyjnego, średnio 5,32-kilogramowego karpia (16,7%) karasia srebrzystego (12,3%), oraz lina (8,6%). Na podstawie omówionych parametrów można uznać omawiane łowisko, jako dość ciekawe pod względem wędkarskim.

3.10. Jezioro Ostrowąs (Plebanka) (Tabela nr 30, Rys. 30)

W roku 2019 w omawianym jeziorze swoje połowy zarejestrowało 22 wędkarzy, łowiących w sumie 176,8 kg ryb, średnio 8,04 kg w ciągu roku i 1,03 kg w 1 dniu wędkowania, spędzając nad wodą średnio 7,77 dnia.

Struktura gatunkowa zarejestrowanych odłowów składała się z 11 taksonów (Rys. 30). Pierwsze w kolejności, to drapieźniki (łączny udział 43%), z których najwięcej złowiono średnio 1,88-kilogramowego szczupaka (30,9%), a dalej sandacza (8,1%) i okonia (4%). Na grupę mniej cennych karpiowatych składały się leszcz (15,2%), krąp (8,3%) i płoć (7,7%). W odłowach zanotowano także karasia pospolitego (17,7%), lina (5,6%), karpia (1,8%) oraz karasia srebrzystego (0,6%). Warunki wędkowania w jeziorze Ostrowąs można określić jako dość ciekawe.




Rys. 30. Jezioro Ostrowąs (Plebanka) - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 176,8 kg)

3.11. Skoki I (Tabela nr 32, Rys. 31)

W roku 2019 w omawianym łowisku swoje połowy zarejestrowało 25 wędkarzy, łowiących w sumie 168,7 kg ryb, średnio 6,75 kg w ciągu roku i 0,80 kg w 1 dniu wędkowania, spędzając nad wodą średnio 8,40 dnia.

Struktura gatunkowa zarejestrowanych odłowów składała się z 10 taksonów (Rys. 31). Pierwsze w kolejności, to drapieżniki (łączny udział 47,7%), z których najczęściej złowiono średnio 1,77-kilogramowego szczupaka (33,5%), a dalej okonia (8%), sandacza (3,7%) i węgorza (2,5%). Na grupę mniej cennych karpiowatych, która łącznie stanowiła 41,1% zanotowanych w Skokach ryb, składały się leszcz (20,6%), płoć (18,1%), wzdrega (1,8%) i ukleja. W odłowach zanotowano także średnio 1,75-kilogramowego karpia (8,3%) oraz lina (3%). Warunki wędkowania w omawianym zbiorniku można określić jako dość korzystne.




Rys. 31. Skoki I - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 168,7 kg)

3.12. Jezioro Lucieńskie (Tabela nr 34, Rys. 32)

W roku 2019 w jeziorze Lucieńskim zarejestrowało swoje połowy 20 wędkarzy, a łączny odłów wyniósł 166,3 kg, co dało średni wskaźnik dziennego odłowu na 1 wędkarza na poziomie 0,95 kg i roczny 8,32 kg, przy 8,75 dniach spędzonych nad wodą.

W odłowach wśród 9 zarejestrowanych gatunków (Rys. 32) przeważały drapieżniki łącznie stanowiące 60,6% zarejestrowanych ryb.



Rys. 32. Jezioro Lucieńskie - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 166,3 kg)

Były to trzy taksony – średnio 2,04-kilogramowy szczupak (29,5%), okoń (22,1%) i sum (9%). Mniej cenione karpowate stanowiły (35,5%). Była to głównie płóc (17,2%), leszcz (14,4%) oraz wzdręga (3,9%) i krap. W odłowach zanotowano także średnio 1,30-kilogramowego lina (2,4%) oraz karasia srebrzystego (1,5%). Łowisko można uznać za dość ciekawe pod względem wędkarskim.

3.13. Jezioro Lutoborskie (Tabela nr 35)


W jeziorze Lutoborskim w 2019 roku 28 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 158,0 kg ryb ogółem, spędzając na łowisku średnio 7,89 dni, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 5,64 kg i 0,71 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 10 taksonów. Z grupy mniej cennych karpowatych, które łącznie stanowiły 70,4% wszystkich zarejestrowanych w opisywanym jeziorze ryb płóc stanowiła 48,5%, leszcz 19,1%, a wzdręga, ukleja i krap pozostawały w mniejszych ilościach. Grupa drapieźników, które stanowiły łącznie 20,3%, reprezentowana była głównie przez węgorze (11,7%), średnio 2,56-kilogramowego szczupaka (8,1%) oraz pojedyncze sztuki okonia. Należy podkreślić 8,4% udział lina oraz jedną sztukę karpia. W sumie jezioro Lutoborskie należy ocenić jako dość ciekawe łowisko Mazowieckiego Okręgu PZW.

3.14. Jezioro Ciechomickie (Tabela nr 36, Rys. 33)

W sezonie 2019 w jeziorze Ciechomickim całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 155,6 kg ryb, a na jednego z 30 wędkarzy, którzy spędzali średnio 10,33 dni na łowisku oraz zarejestrowali swe połowy, dziennie przypadało średnio 0,50 kg ryb, a rocznie 5,19 kg.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska, składała się z 9 gatunków (Rys. 33).




Rys. 33. Jezioro Ciechomickie - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 155,6 kg)

W połowach zdecydowanie przeważały drapieżniki stanowiące łącznie 63,8%, w tym średnio 2,01-kilogramowy szczupak z udziałem 35%, sandacz (24,7%), okoń (2,5%) oraz pojedyncze sztuki suma i węgorza. Należy ponadto wymienić 30,3% leszcza, średnio 1,83-kilogramowego lina (3,5%) oraz po kilka sztuk karasia srebrzystego (1,8%) i karpia.

3.15. Jezioro Białe (Tabela nr 37, Rys. 34)

W jeziorze Białym zarejestrowało swoje połowy 27 wędkarzy, a łączny odłów wyniósł 155,4 kg, co dało średni wskaźnik dziennego odłowu na 1 wędkarza na poziomie 0,72 kg i roczny 5,76 kg, przy 8,04 dniach spędzonych nad wodą.

W odłowach wśród 7 zarejestrowanych gatunków (Rys. 34) przeważały drapieżniki stanowiące łącznie 51,4% zarejestrowanych ryb. Były to tylko dwa taksony – średnio 2,98-kilogramowy szczupak (42,2%) i okoń (9,2%). Mniej cennie karpiołate stanowiły łącznie 41,7%. Była to głównie płoć (29,3%), leszcz (9,9%) oraz w mniejszych ilościach wzdręga i krap. W odłowach zanotowano także średnio 0,72-kilogramowego lina z udziałem 7% wszystkich zanotowanych w jeziorze Białym ryb.



Rys. 34. Jezioro Białe - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 155,4 kg)

3.16. Jezioro Karaśnia (Tabela nr 39)

W sezonie 2019 w omawianym zbiorniku całkowite zanotowane odłowu wędkarskie wyniosły 147,4 kg ryb, każdy z 18 wędkarzy, którzy spędzali średnio 5,83 dni na łowisku zarejestrował swe połowy na średnim poziomie 1,40 kg ryb dziennie i 8,19 kg rocznie. Wszystkie parametry opisujące to łowisko, były bardzo zbliżone do tych sprzed roku.


W strukturze odłowów wędkarskich z omawianego zbiornika zarejestrowano 8 gatunków ryb. Na pierwszym miejscu znalazł się leszcz z udziałem 25%, a zaraz za nim krap (24,2%). Ta grupa mniej cennych karpiołatych wraz z płocią (3,8%) i wzdręgą łącznie stanowiła 72,3% złowionych w Karaśni ryb. Drapieżniki stanowiły łącznie 14,1%, z czego najwięcej złowiono średnio 1,33-kilogramowego

szczupaka (9%), a okonia 5,1%. W odłowach zanotowano także jednego osobnika karpia (10,9%) o masie szesnastu kilogramów oraz pojedynczo występującego lina (2,8%).

3.17. Zbiornik Chorzele (Tabela nr 40, Rys. 35)

W sezonie 2019 w omawianym zbiorniku całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 136,9 kg ryb, jeden z 38 wędkarzy, którzy spędzali średnio 8,13 dni na łowisku zarejestrował swe połowy na średnim poziomie 0,44 kg ryb dziennie i 3,60 kg rocznie.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska, składała się z 11 gatunków (Rys. 35). Najwyższym udziałem (51,1%) odznaczył się ponownie karp o średniej masie 2,06 kg. Wobec tej dominacji pozostałe gatunki występowały w mniejszości. Grupa mniej cennych karpiovatych (łącznie 12,1%), to jedynie leszcz z udziałem 6,4%, płoć (3,9%) i krap (1,8%). Drapieżniki reprezentowane były jedynie przez szczupaka z udziałem 5,8% i jednego osobnika boleń. W odłowach zanotowano znaczący udział średnio 0,36-kilogramowego karasia srebrzystego – 24,3% oraz po kilka sztuk lina (2,3%), jazia (1,5%), amura (1,2%) i karasia pospolitego (1,1%).



Rys. 35. Zbiornik Chorzele - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 136,9 kg)

3.18. Zalew w Makowie Mazowieckim (Tabela nr 41)

W sezonie 2019 w omawianym zbiorniku całkowite zanotowane przez 38 wędkarzy odłowy wędkarskie wyniosły 134,2 kg ryb, spędzali oni średnio 8,08 dni na łowisku łowiąc średnio 0,44 kg ryb dziennie i 3,53 kg rocznie.


W strukturze odłowów wędkarskich z omawianego zbiornika zarejestrowano 11 gatunków ryb. Na pierwszym miejscu znalazł się średnio 1,75-kilogramowy karp z udziałem 44,3%. Drapieżniki stanowiły łącznie 16%, z czego najwięcej złowiono średnio 1,54-kilogramowego szczupaka (11,5%), 4% sandacza i jedna sztukę okonia. Grupa mniej cennych karpiovatych, reprezentowana była przez krapia z udziałem

13,8%, leszcza (9%), płoć (7,8%) oraz wzdręę. W odłowach zanotowano 5,4% karasia srebrzystego, 2,6% jazia oraz pojedynczo występującego klenia.

3.19. Jezioro Bytoń (Tabela nr 44, Rys. 36)

W roku 2019 w omawianym zbiorniku wodnym całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 121,8 kg ryb, średni roczny i dzienny odłów na jednego z 12 wędkarzy, przebywających średnio 8,08 dni na łowisku, osiągnął odpowiednio 10,15 kg i 1,26 kg.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska, składała się z 7 taksonów (Rys. 36). Najwyższym, jak i w poprzednim sezonie – 32,9% – udziałem wśród wszystkich zanotowanych gatunków charakteryzował się średnio 1,15-kilogramowy lin. Dość znaczącym udziałem charakteryzowała się grupa drapieźników, które stanowiły łącznie 30,5% zarejestrowanych ryb i były to: szczupak (26%) oraz okoń (4,4%). Mniej cenione gatunki karpowate, gdzie płoć stanowiła 20,3%, a wzdręga 6,2%, uzupełniały pulę łowionych gatunków łącznym odsetkiem 26,6%. W odłowach zanotowano także pojedynczo karpia (6,2%) i karasia pospolitego (3,9%).



Rys. 36. Jezioro Bytoń - struktura odłowów wędkarskich w roku 2019 (100% = 121,8 kg)

3.20. Glinianki Błonie (Tabela nr 46)

Warunki wędkowania w omawianych Gliniankach w roku 2019 charakteryzowały następujące parametry: swoje połowy zarejestrowało tutaj 34 wędkarzy na poziomie 114,4 kg ryb, co dało wskaźnik średnio 0,25 kg w 1 dniu wędkowania oraz 3,36 kg w ciągu roku, a pojedynczy wędkarz spędzał na łowisku prawie 2 tygodnie (13,24 dni).

Struktura gatunkowa zarejestrowanych odłowów składała się z 13 taksonów ryb, z czego najwięcej złowiono średnio 1,54-kilogramowego karpia (41,8%). Grupa drapieźników (łącznie 19,2%) pozostawała w równowadze z grupą mniej cenionych gatunków karpowatych (łącznie 18,5%). Odnotowano 15,3% szczupaka, pojedyncze bolenie (2,2%), okonie i węgorze. Ponadto, 12,9% płoci,

4,4% leszcza, 1,1% wzdręgi oraz krąpia. Warto także wymienić 13,7% karasia srebrzystego, 3% lina, a rzadziej karasia pospolitego (2%) i amura (1,8%).

3.21. Jezioro Wikaryjskie (Tabela nr 47)

W jeziorze Wikaryjskim w 2019 roku 30 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 102,5 kg ryb ogółem, spędzając na łowisku średnio 8,17 dnia, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 3,42 kg i 0,42 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 10 taksonów. Z grupy mniej cennych karpiowatych, które łącznie stanowiły 43,1% wszystkich zarejestrowanych w opisywanym jeziorze ryb leszcz stanowił 26,1%, płoć 10,5%, krąp 3,5%, wzdręga 2,4%. Drapieżniki (łącznie 26,2%) reprezentowane były przez średnio 1,60-kilogramowego szczupaka (18,7%), okonia (5,5%) oraz węgorza (2,1%). W odłowach z tego łowiska wyróżniały się ponadto, średnio kilogramowy lin (22,3%) oraz karp o średniej masie 4,25 kg z udziałem 8,3%.

3.22. Jezioro Skrzyneckie (Tabela nr 48)

W sezonie 2019 w jeziorze Skrzyneckim całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 100,6 kg ryb. Średnie parametry 24 wędkarzy były następujące: 0,89 kg ryb dziennie, w ciągu roku 4,19 kg, dni rocznie 4,71.

Struktura gatunkowa odłowów składała się z 9 taksonów. Grupa mniej cenionych gatunków karpiowatych (łącznie 41,2%) pozostawała we względnej równowadze z grupą drapieżników (łącznie 37,1%). Na drapieżniki łącznie stanowiące składały się udziały 1,55-kilogramowego szczupaka (34%), któremu towarzyszył jedynie okoń (3,1%). Płoci złowiono tu 27,3%, leszcza 9,4%, a wzdręgi 4,2%. Ponadto, zanotowano średnio prawie kilogramowego lina (13,8%), 4,70-kilogramowego karpia z odsetkiem 4,7% i karasia srebrzystego (3,3%), które uzupełniały pulę odłowów z omawianego jeziora.

3.23. Pozostałe łowiska okręgu

Jezioro Mierucie (Tabela nr 49), Glinianki Borowe (Tabela nr 50), Jezioro Grójeckie (Tabela nr 52), Jezioro Okonin (Tabela nr 53), Jeziórko Moczydło (Tabela nr 55), Glinianki Szczęśliwickie (Tabela nr 56), Jezioro Borowiec (Wildno) (Tabela nr 57), Jezioro Skrwilno (Tabela nr 60), Staw Talar (Tabela nr 61), Jezioro Pomocnia (Tabela nr 62), Jezioro Telążyzna (Tabela nr 63), Jezioro Czarne Włocławskie (Tabela nr 64), Jezioro Brzeźno (Tabela nr 67), Jezioro Ostrowickie (Tabela nr 68), Stawy w Parku Pruszków (Tabela nr 69), Staw Koziół Wincenta (Tabela nr 72), Zbiornik Soczewka (Tabela nr 74), Jezioro Huta (Tabela nr 77), Jezioro Czarownica (Borzymińskie) (Tabela nr 78), Skoki II (Tabela nr 79), Jezioro Kępka Szlachecka (Tabela nr 80), Staw Montoprzem (Tabela nr 81), Zbiornik Niewiadoma (Tabela nr 82), Jezioro Czarne Gostynińskie (Tabela nr 83), Jezioro Łąki Zawistowe (Tabela nr 85), Jezioro Głębocek (na ciek bez nazwy) (Tabela nr 87), Kocioł (Tabela nr 88), Jezioro Łuba (Tabela nr 89), Jezioro

Lubiechowo (Tabela nr 90), Jezioro Peł (Tabela nr 93), Jezioro Szczutkowskie (Tabela nr 94), Jezioro Rybnica (Tabela nr 95), Jezioro Białobrzegi (Tabela nr 96), Jezioro Służewo (Tabela nr 97), Jezioro Chojno (Tabela nr 98), Jezioro Widoń (Tabela nr 99), Sierpienica (Tabela 101), Jezioro Czarne Baruchowo (Tabela nr 103), Basen Brwinów (Tabela nr 104), Glinianka Włochy (Tabela nr 106), Jezioro Świesz (Tabela nr 107), Jezioro Czarno-Czerskie (Tabela nr 108), Tażyna (Tabela nr 110), Jezioro Radziszewo (Tabela nr 111), Staw Lubraniec (Tabela nr 112), Basen Kolejniak (Tabela nr 113), Jezioro Czerskie (Tabela nr 115), Staw Ruda (Tabela nr 119), Staw Wielgie (Tabela nr 120), Jezioro Trzebowo (Tabela nr 121), Jezioro Radzynek (Paproty) (Tabela nr 125), Wymysłów (Tabela nr 126), Glinianka Bagienice (Tabela nr 128), Jezioro Habdzin (Tabela nr 129), Glinianka Tłuszcz (Tabela nr 130), Zbiornik Garwolin (Tabela 131).

Na wymienionych zbiornikach będących w użytkowaniu okręgu w nadesłanych rejestrach odłowy wędkarskie nie przekraczały 100 kg. Wśród ww. łowisk wyróżnić można jedynie te, które charakteryzuje znaczący udział gatunków atrakcyjnych wędkarsko:

- wysoki odsetek szczupaka – **J. Białobrzegi (73%), Sierpienica (62,6%), J. Peł (57,8%), J. Brzeźno (48,8%), J. Lubiechowo (47,3%), J. Czarne Gostynińskie (44,1%), J. Telążyna (42,8%), J. Czerskie (35,1%), J. Czarownica (Borzymińskie) (34,4%), J. Chojno (34,1%), J. Łąki Zawistowe (33,3%);**
- wysoki odsetek karpia – **Wymysłów (100%), Staw Montoprzem (97,5%), Basen Brwinów (87%), Glinianki Borowe (75,6%), Staw Talar (62%), Skoki II (61,4%), Staw Kocioł Wincenta (47,1%), Glinianka Włochy (40,4%), Jeziórko Moczydło (36,2%), Glinianki Szczęśliwickie (30,9%), J. Borowiec (Wildno) (30,8%), Stawy w Parku Pruszków (33,4%);**
- wysoki odsetek lina – **J. Czarno-Czerskie (100%), J. Radzynek (Paproty) (100%), Staw Wielgie (65,1%), J. Radziszewo (54,4%), Zbiornik Niewiadoma (48,4%), J. Czerskie (47,4%), Basen Kolejniak (42,3%), Kocioł (41,2%), J. Mierucie (36,4%), J. Kępka Szlachecka (33,5%), J. Widoń (32%), Staw Ruda (31,8%), J. Telążyna (30,6%).**

III. Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki analizy rejestrów połowów uzyskanych przez członków Okręgu Mazowieckiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 2019 roku pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków natury ogólniejszej:

- Całkowity odłów zarejestrowany we wszystkich objętych opracowaniem wodach, osiągnięty przez badaną populację wędkarzy wyniósł w 2019 roku prawie 50,4 tony ryb, na jednego wędkarza przypadła średni roczny odłów w wysokości 7,54 kg, zaś średni dzienny odłów uzyskany przez 1 wędkującego osiągnął poziom 0,74 kg ryb.
- Wyniki analizy rejestrów z 2019 roku potwierdziły większość wniosków wypływających z analizy rejestrów połowów z 2018 roku i lat wcześniejszych. W badaniach tych podobnie wyglądała hierarchia

najważniejszych łowisk, w większości z nich uzyskano zbieżne wyniki charakteryzujące struktury gatunkowe odłowów, a zatem i zbieżne oceny wędkarskiej atrakcyjności poszczególnych łowisk. Po obwodzie rybackim Narew Nr 7 najważniejsze łowiska Okręgu są następujące: Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5, Wisła Nr 3, Narew Nr 6, Wisła Nr 4, Narew Nr 8, Bug Nr 5, Skrwa Prawa Nr 1. W większości z wymienionych w opracowaniu obwodów rybackich uzyskano atrakcyjne struktury odłowów wędkarskich, w których wystąpiły poprawne relacje między najbardziej cennymi i atrakcyjnymi gatunkami drapieżnymi a grupą mniej cennych gatunków karpiowatych, reprezentowaną przez leszcza, płoć, krąpia, wzdręgę i ukleję. Do najbardziej atrakcyjnych łowisk zaliczamy te, w których zanotowano największe udziały gatunków drapieżnych – **szczupaka, sandacza, okonia, suma, bolenia, miętusa i węgorza**. Najwyższe odsetki tych gatunków zanotowaliśmy w następujących obwodach: Biebrza Nr 3 (Wissa) (72,3%), Brok Nr 1 (48,4%), Nurzec Nr 1 (47,6%), Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5 (43%) i Zgłowiączka nr 2 (41%), gdzie udział drapieżników przekraczał 40% zarejestrowanych odłowów. Poza tymi obwodami we wszystkich pozostałych: Omulew Nr 1, Bug Nr 5, Świder nr 1, Jegrznia Nr 11, Orz Nr 1, Wisła Nr 4, Wisła Nr 3, Orzyc Nr 1, Jezioro Nr 1, Narew Nr 6, Rozoga Nr 1, Utrata Nr 1, Narew Nr 8, Rządza Nr 1, Ełk Nr 45, Szkwa nr 1, Bzura Nr 1, Skrwa Prawa Nr 1 i Moltawa nr 1 udziały drapieżników były znacznie niższe. W najważniejszym dla wędkarzy obwodzie Narew Nr 7 odsetek drapieżników w odłowach wędkarskich wynosił 26,8%. Warto zaznaczyć, że w przypadku większości rozpatrywanych obwodów rybackich udziały gatunków drapieżnych były wysokie, co dobrze świadczy o gospodarce zarybieniowej prowadzonej przez Okręg Mazowiecki.

IV. TABELE

WSZYSTKIE ŁOWISKA

L.p.	Łowisko	Pow. zbiornika (ha)	Liczba wędkarzy	Presja (dni)	Całkowity odłów (kg)	Kg ryb na wędkarza	Liczba dni na wędkarza	Kg ryb na 1 dzień wędkowania	Kg/ha	Presja dni/ha
1	Narew 7 (Zbiornik Zegrzyński)	3852,00	1390	16141	12351,5	8,89	11,61	0,77	3,21	4,19
2	Zbiornik Włocławski	7911,34	551	6867	5590,3	10,15	12,46	0,81	0,71	0,87
3	Wisła 3	4744,00	641	6420	5008,3	7,81	10,02	0,78	1,06	1,35
4	Narew 6	1025,00	486	7061	3031,9	6,24	14,53	0,43	2,96	6,89
5	Wisła 4	3240,00	210	2396	2888,2	13,75	11,41	1,21	0,89	0,74
6	Narew 8	487,00	305	2989	2648,3	8,68	9,80	0,89	5,44	6,14
7	Bug 5	1226,00	370	4990	2613,9	7,06	13,49	0,52	2,13	4,07
8	Skrwa Prawa 1	139,75	234	1587	2311,9	9,88	6,78	1,46	16,54	11,36
9	J. Toczyłowo	105,00	68	603	793,7	11,67	8,87	1,32	7,56	5,74
10	Ełk 45	112,00	32	262	788,0	24,63	8,19	3,01	7,04	2,34
11	J. Zdvorskie	340,00	75	865	759,6	10,13	11,53	0,88	2,23	2,54
12	J. Sasek Wielki	887,90	98	570	753,4	7,69	5,82	1,32	0,85	0,64
13	Orzyc 1	209,00	119	1050	526,9	4,43	8,82	0,50	2,52	5,02
14	Rozoga 1	104,00	99	911	520,4	5,26	9,20	0,57	5,00	8,76
15	Glinianki Zielonka	26,00	69	643	418,1	6,06	9,32	0,65	16,08	24,73
16	Glinianki Gołków, Głusków, Zalesie	26,00	61	603	415,6	6,81	9,89	0,69	15,98	23,19
17	Rządza 1	42,00	118	503	381,6	3,23	4,26	0,76	9,09	11,98
18	Nurzec 1	153,00	65	636	374,4	5,76	9,78	0,59	2,45	4,16
19	J. Wałpusz	431,60	48	297	278,1	5,79	6,19	0,94	0,64	0,69
20	Jeziorka 1	120,00	59	371	270,5	4,58	6,29	0,73	2,25	3,09
21	Glinianki Grodzisk	19,00	66	993	269,3	4,08	15,05	0,27	14,17	52,26
22	J. Sasek Mały	332,40	46	178	266,0	5,78	3,87	1,49	0,80	0,54
23	J. Brajnckie	211,00	42	225	262,0	6,24	5,36	1,16	1,24	1,07
24	J. Ługowskie	62,20	44	238	254,1	5,78	5,41	1,07	4,09	3,83
25	J. Przytomne	38,00	33	290	222,7	6,75	8,79	0,77	5,86	7,63
26	Krzywie	21,00	33	509	193,2	5,85	15,42	0,38	9,20	24,24
27	J. Górskie	45,00	22	241	191,5	8,70	10,95	0,79	4,26	5,36
28	J. Małszewskie	208,80	25	183	185,1	7,40	7,32	1,01	0,89	0,88
29	Omulew 1	189,00	50	531	177,6	3,55	10,62	0,33	0,94	2,81
30	J. Ostrowąs (Plebanka)	42,10	22	171	176,8	8,04	7,77	1,03	4,20	4,06
31	Brok 1	45,00	38	295	174,5	4,59	7,76	0,59	3,88	6,56
32	Skoki I	24,00	25	210	168,7	6,75	8,40	0,80	7,03	8,75
33	Bzura 1	86,00	39	606	167,7	4,30	15,54	0,28	1,95	7,05
34	J. Lucieńskie	203,20	20	175	166,3	8,32	8,75	0,95	0,82	0,86
35	J. Lutoborskie	22,30	28	221	158,0	5,64	7,89	0,71	7,09	9,91
36	J. Ciechomicke	47,00	30	310	155,6	5,19	10,33	0,50	3,31	6,60
37	J. Białe	148,00	27	217	155,4	5,76	8,04	0,72	1,05	1,47
38	J. Piasutno	49,00	23	151	148,6	6,46	6,57	0,98	3,03	3,08
39	J. Karaśnia	46,00	18	105	147,4	8,19	5,83	1,40	3,20	2,28
40	Zbiornik Chorzele	5,00	38	309	136,9	3,60	8,13	0,44	27,38	61,80
41	Zalew w Makowie Mazowieckim	17,00	38	307	134,2	3,53	8,08	0,44	7,89	18,06
42	J. Małszewskie	36,61	10	76	125,4	12,54	7,60	1,65	3,43	2,08
43	Utrata 1	46,00	39	280	124,1	3,18	7,18	0,44	2,70	6,09
44	J. Bytoń	10,30	12	97	121,8	10,15	8,08	1,26	11,83	9,42
45	Biebrza 3 (Wissa)	17,00	8	62	117,7	14,71	7,75	1,90	6,92	3,65
46	Glinianki Błonie	6,00	34	450	114,4	3,36	13,24	0,25	19,07	75,00
47	J. Wikaryjskie	66,50	30	245	102,5	3,42	8,17	0,42	1,54	3,68
48	J. Skrzyneckie	26,90	24	113	100,6	4,19	4,71	0,89	3,74	4,20
49	J. Mierucie	32,00	12	81	99,8	8,32	6,75	1,23	3,12	2,53
50	Glinianki Borowe	4,00	16	132	99,3	6,21	8,25	0,75	24,83	33,00
51	J. Burdag	38,92	7	37	99,2	14,17	5,29	2,68	2,55	0,95
52	J. Grójeckie	27,90	26	123	96,8	3,72	4,73	0,79	3,47	4,41
53	J. Okonin	10,30	18	125	94,5	5,25	6,94	0,76	9,17	12,14

54	Świder 1	90,00	15	156	93,9	6,26	10,40	0,60	1,04	1,73
55	Jeziórko Moczydło	4,00	39	237	93,0	2,38	6,08	0,39	23,25	59,25
56	Glinianki Szczęśliwickie	7,00	20	217	91,0	4,55	10,85	0,42	13,00	31,00
57	J. Borowiec (Wildno)	12,80	12	50	90,9	7,58	4,17	1,82	7,10	3,91
58	Staw Jedwabne	2,00	7	52	90,5	12,93	7,43	1,74	45,25	26,00
59	Orz 1	23,00	33	201	86,6	2,62	6,09	0,43	3,77	8,74
60	J. Skrwilno	87,70	11	223	85,5	7,77	20,27	0,38	0,97	2,54
61	Staw Talar	3,40	13	108	82,6	6,35	8,31	0,76	24,29	31,76
62	J. Pomocnia	9,00	29	184	75,0	2,59	6,34	0,41	8,33	20,44
63	J. Telążyna	25,40	5	33	69,9	13,98	6,60	2,12	2,75	1,30
64	Czarne Włocławskie	6,80	17	115	69,3	4,08	6,76	0,60	10,19	16,91
65	J. Warchałdzkie	46,42	16	89	67,8	4,24	5,56	0,76	1,46	1,92
66	J. Świętajno (Narty)	217,19	12	64	63,0	5,25	5,33	0,98	0,29	0,29
67	J. Brzeżno	16,40	10	58	62,9	6,29	5,80	1,08	3,84	3,54
68	J. Ostrowickie	55,10	20	116	61,0	3,05	5,80	0,53	1,11	2,11
69	Stawy w Parku	7,00	19	99	61,0	3,21	5,21	0,62	8,71	14,14
70	Zgłowiączka 2	23,00	13	80	60,0	4,62	6,15	0,75	2,61	3,48
71	J. Sędańskie	185,99	12	40	58,9	4,91	3,33	1,47	0,32	0,22
72	Staw Kozioł Wincenta	0,35	5	33	51,6	10,32	6,60	1,56	147,43	94,29
73	J. Grom	216,18	14	52	50,2	3,59	3,71	0,97	0,23	0,24
74	Zbiornik Soczewka	46,20	13	54	49,8	3,83	4,15	0,92	1,08	1,17
75	Jegrznia 11	6,00	9	44	43,6	4,84	4,89	0,99	7,27	7,33
76	J. Rekowe	70,84	10	52	42,1	4,21	5,20	0,81	0,59	0,73
77	J. Huta	34,50	11	61	40,9	3,72	5,55	0,67	1,19	1,77
78	J. Czarownica (Borzymińskie)	25,09	8	41	40,4	5,05	5,13	0,99	1,61	1,63
79	Skoki II	22,00	8	77	39,1	4,89	9,63	0,51	1,78	3,50
80	J. Kępka Szlachecka	12,90	11	38	38,5	3,50	3,45	1,01	2,98	2,95
81	Staw Montoprzem	2,00	5	52	36,5	7,30	10,40	0,70	18,25	26,00
82	Zbiornik Niewiadoma	42,00	17	73	33,9	1,99	4,29	0,46	0,81	1,74
83	Czarne Gostynińskie	4,00	8	88	32,9	4,11	11,00	0,37	8,23	22,00
84	Staw Kobylocha	39,16	8	33	31,5	3,94	4,13	0,95	0,80	0,84
85	J. Łąki Zawistowe	10,30	7	30	30,9	4,41	4,29	1,03	3,00	2,91
86	J. Głębocek (w obw. J. Rekowe)	25,05	10	41	30,4	3,04	4,10	0,74	1,21	1,64
87	J. Głębocek (na cieku bez nazwy)	12,00	7	68	27,5	3,93	9,71	0,40	2,29	5,67
88	Kocioł	4,00	4	33	26,0	6,50	8,25	0,79	6,50	8,25
89	J. Łuba	12,00	12	69	25,5	2,13	5,75	0,37	2,13	5,75
90	J. Lubiechowo	19,40	10	28	23,7	2,37	2,80	0,85	1,22	1,44
91	J. Klimek (Konik)	35,92	21	42	23,6	1,12	2,00	0,56	0,66	1,17
92	J. Lemańskie	23,52	5	18	22,8	4,56	3,60	1,27	0,97	0,77
93	J. Peł	12,00	4	27	20,6	5,15	6,75	0,76	1,72	2,25
94	J. Szczutkowskie	9,00	5	12	20,6	4,12	2,40	1,72	2,29	1,33
95	J. Rybnica	7,60	6	27	19,7	3,28	4,50	0,73	2,59	3,55
96	J. Białobrzegi	10,00	7	26	17,8	2,54	3,71	0,68	1,78	2,60
97	J. Służewo	4,70	6	18	16,9	2,82	3,00	0,94	3,60	3,83
98	J. Chojno	10,20	5	31	16,7	3,34	6,20	0,54	1,64	3,04
99	J. Widoń	10,00	4	12	15,0	3,75	3,00	1,25	1,50	1,20
100	J. Machniacz	12,04	4	19	14,8	3,70	4,75	0,78	1,23	1,58
101	Sierpienica	2,00	3	49	14,7	4,90	16,33	0,30	7,35	24,50
102	J. Płociczno	21,67	4	32	12,6	3,15	8,00	0,39	0,58	1,48
103	Czarne Baruchowo	6,70	3	21	11,9	3,97	7,00	0,57	1,78	3,13
104	Basen Brwinów	2,00	4	28	11,5	2,88	7,00	0,41	5,75	14,00
105	Szkwa 1	33,00	4	27	11,1	2,78	6,75	0,41	0,34	0,82
106	Glinianka Włochy	3,00	9	14	10,4	1,16	1,56	0,74	3,47	4,67
107	J. Świesz	18,50	1	4	9,9	9,90	4,00	2,48	0,54	0,22
108	J. Czarno-Czerskie	10,10	3	29	8,1	2,70	9,67	0,28	0,80	2,87
109	J. Średnie	29,10	3	8	8,0	2,67	2,67	1,00	0,27	0,27
110	Tążyna	9,30	2	5	8,0	4,00	2,50	1,60	0,86	0,54
111	J. Radziszewo	7,00	2	6	7,9	3,95	3,00	1,32	1,13	0,86

112	Staw Lubraniec	1,73	2	6	7,7	3,85	3,00	1,28	4,45	3,47
113	Basen Kolejniak	4,00	9	33	7,1	0,79	3,67	0,22	1,78	8,25
114	J. Jasne	18,28	3	6	6,4	2,13	2,00	1,07	0,35	0,33
115	J. Czarskie	9,00	2	10	5,7	2,85	5,00	0,57	0,63	1,11
116	J. Zielonka	6,37	2	9	5,1	2,55	4,50	0,57	0,80	1,41
117	J. Nożyce	55,00	12	28	4,5	0,38	2,33	0,16	0,08	0,51
118	Mołtawa 1	12,60	2	10	4,5	2,25	5,00	0,45	0,36	0,79
119	Staw Ruda	3,00	2	20	4,4	2,20	10,00	0,22	1,47	6,67
120	Staw Wielgie	4,20	1	12	4,3	4,30	12,00	0,36	1,02	2,86
121	J. Trzebowo	9,70	2	2	2,2	1,10	1,00	1,10	0,23	0,21
122	J. Natać	21,77	3	4	2,0	0,67	1,33	0,50	0,09	0,18
123	J. Skonieczne	30,37	1	3	2,0	2,00	3,00	0,67	0,07	0,10
124	Młyński Staw	12,30	2	3	1,5	0,75	1,50	0,50	0,12	0,24
125	J. Radzynek (Paproty)	7,50	1	1	1,0	1,00	1,00	1,00	0,13	0,13
126	Wymysłów	4,50	1	4	1,0	1,00	4,00	0,25	0,22	0,89
127	J. Łażnica	25,86	1	1	0,0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,04
128	Glinianki Bagienice	3,00	5	6	0,0	0,00	1,20	0,00	0,00	2,00
129	J. Hądzin	b.d.	2	10	0,0	0,00	5,00	0,00	b.d.	b.d.
130	Glinanka Tłuszcz	3,00	1	4	0,0	0,00	4,00	0,00	0,00	1,33
131	Zbiornik Garwolin	b.d.	1	3	0,0	0,00	3,00	0,00	b.d.	b.d.

Tabela I. Wyniki wędkarzy okręgu mazowieckiego

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
6681	67770	50352	118796	7,54	10,14	0,74

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5529,4	3171	10,98	1,74
Sandacz	1910,2	780	3,79	2,45
Sum	3528,1	453	7,01	7,79
Okoń	2613,9	10836	5,19	0,24
Boleń	630,6	309	1,25	2,04
Miętus	13,6	36	0,03	0,38
Węgorz	76,3	75	0,15	1,02
Karp	2645,6	1248	5,25	2,12
Płoc	7858,0	56327	15,61	0,14
Leszcz	17246,2	18334	34,25	0,94
Lin	1717,1	1943	3,41	0,88
Karaś pospolity	266,3	723	0,53	0,37
Karaś srebrzysty	1577,1	3621	3,13	0,44
Amur	139,8	40	0,28	3,50
Brzana	82,3	36	0,16	2,29
Świnka	13,7	27	0,03	0,51
Pstrąg potokowy	10,0	23	0,02	0,43
Certa	121,1	261	0,24	0,46
Kleń	576,8	664	1,15	0,87
Jaź	330,0	347	0,66	0,95
Jelec	5,5	28	0,01	0,20
Krap	2813,3	14570	5,59	0,19
Wzdreğa	442,1	2640	0,88	0,17
Jazgarz	2,9	46	0,01	0,06
Ukleja	57,9	1961	0,11	0,03
Tołpyga	46,0	1	0,09	46,00
Sieja	4,2	2	0,01	2,10
Pozostałe	94,1	294	0,18	0,32

Tabela 1. Rzeka Narew nr 7 (Zbiornik Zegrzyński)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1390	16141	12351,5	24110	8,89	11,61	0,77

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1237,9	658	10,02	1,88
Sandacz	419,4	190	3,40	2,21
Sum	539,6	98	4,37	5,51
Okoń	990,7	2466	8,02	0,40
Boleń	109,7	52	0,89	2,11
Miętus	0,9	1	0,01	0,90
Węgorz	5,5	7	0,04	0,79
Karp	101,4	48	0,82	2,11
Płoc	1084,2	7319	8,78	0,15
Leszcz	6248,7	6751	50,59	0,93
Lin	473,1	457	3,83	1,04
Karaś pospolity	20,9	43	0,17	0,49
Karaś srebrzysty	69,3	179	0,56	0,39
Amur	9,0	1	0,07	9,00
Brzana	1,3	1	0,01	1,30
Pstrąg potokowy	1,8	2	0,01	0,90
Certa	0,4	1	0,01	0,40
Kleń	26,3	31	0,21	0,85
Jaź	10,8	13	0,09	0,83
Jelec	0,6	5	0,01	0,12
Krap	910,6	4674	7,37	0,19
Wzdreęga	72,0	421	0,58	0,17
Jazgarz	0,4	8	0,01	0,05
Ukleja	17,0	684	0,13	0,02

Tabela 2. Zbiornik Włocławski na rzece Wisła nr 5

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
551	6867	5590,3	7206	10,15	12,46	0,81

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	355,1	151	6,35	2,35
Sandacz	480,5	189	8,60	2,54
Sum	1182,6	137	21,15	8,63
Okoń	204,0	1192	3,65	0,17
Boleń	170,7	64	3,05	2,67
Miętus	0,3	1	0,01	0,30
Węgorz	7,7	7	0,14	1,10
Karp	582,8	279	10,43	2,09
Płoc	126,9	754	2,27	0,17
Leszcz	1336,2	1288	23,90	1,04
Lin	4,1	3	0,07	1,37
Karaś pospolity	50,7	185	0,91	0,27
Karaś srebrzysty	885,6	2108	15,84	0,42
Brzana	2,5	1	0,04	2,50
Certa	23,6	52	0,42	0,45
Kleń	2,1	1	0,04	2,10
Jaź	5,2	10	0,09	0,52
Jelec	0,5	2	0,01	0,25
Krap	119,6	419	2,14	0,29
Wzdreęga	47,9	327	0,86	0,15
Ukleja	1,7	36	0,03	0,05

Tabela 3. Rzeka Wisła nr 3

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
641	6420	5008,3	7952	7,81	10,02	0,78

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	343,8	194	6,86	1,77
Sandacz	217,1	88	4,33	2,47
Sum	666,4	91	13,31	7,32
Okoń	84,1	341	1,68	0,25
Boleń	178,2	113	3,56	1,58
Miętus	0,7	2	0,01	0,35
Węgorz	1,0	1	0,02	1,00
Karp	112,8	40	2,25	2,82
Płoć	237,1	1468	4,73	0,16
Leszcz	2135,3	2232	42,64	0,96
Lin	63,9	83	1,28	0,77
Karaś pospolity	17,2	30	0,34	0,57
Karaś srebrzysty	80,4	139	1,61	0,58
Amur	8,0	5	0,16	1,60
Brzana	31,9	17	0,64	1,88
Świnka	5,0	15	0,10	0,33
Pstrąg potokowy	5,0	15	0,10	0,33
Certa	64,6	144	1,29	0,45
Kleń	123,5	173	2,47	0,71
Jaź	67,5	79	1,35	0,85
Jelec	0,4	2	0,01	0,20
Krap	518,5	2347	10,35	0,22
Wzdrenga	2,6	23	0,05	0,11
Jazgarz	0,2	5	0,01	0,04
Ukleja	5,7	186	0,10	0,03
Pozostałe	37,4	119	0,75	0,31

Tabela 4. Rzeka Narew nr 6

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
486	7061	3031,9	6948	6,24	14,53	0,43

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	334,2	189	11,02	1,77
Sandacz	52,5	19	1,73	2,76
Sum	208,1	21	6,86	9,91
Okoń	155,3	826	5,12	0,19
Boleń	9,7	5	0,32	1,94
Karp	6,4	5	0,21	1,28
Płoć	536,9	2896	17,71	0,19
Leszcz	1040,1	906	34,31	1,15
Lin	146,4	142	4,83	1,03
Karaś pospolity	32,0	112	1,06	0,29
Karaś srebrzysty	1,5	2	0,05	0,75
Kleń	112,1	105	3,70	1,07
Jaź	46,8	49	1,54	0,96
Krap	296,3	1563	9,77	0,19
Wzdrenga	5,4	24	0,18	0,23
Ukleja	2,2	83	0,07	0,03
Tołpyga	46,0	1	1,52	46,00

Tabela 5. Rzeka Wisła nr 4

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
210	2396	2888,2	2422	13,75	11,41	1,21

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	71,3	37	2,47	1,93
Sandacz	194,8	59	6,74	3,30
Sum	528,3	48	18,29	11,01
Okoń	17,0	52	0,59	0,33
Boleń	65,7	27	2,27	2,43
Miętus	0,6	2	0,02	0,30
Węgorz	2,6	3	0,09	0,87
Karp	16,0	5	0,55	3,20
Płoc	93,1	505	3,22	0,18
Leszcz	1613,9	714	55,88	2,26
Lin	10,1	10	0,35	1,01
Karaś pospolity	4,5	14	0,16	0,32
Karaś srebrzysty	60,7	123	2,10	0,49
Brzana	19,0	7	0,66	2,71
Świnka	2,5	1	0,09	2,50
Certa	19,2	49	0,66	0,39
Kleń	18,7	20	0,65	0,94
Jaź	20,7	17	0,72	1,22
Krąp	113,1	562	3,92	0,20
Wzdreğa	2,0	10	0,07	0,20
Ukleja	3,1	131	0,11	0,02
Pozostałe	11,3	24	0,39	0,47

Tabela 6. Rzeka Narew nr 8

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
305	2989	2648,3	3774	8,68	9,80	0,89

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	194,3	101	7,34	1,92
Sandacz	48,2	19	1,82	2,54
Sum	96,3	10	3,64	9,63
Okoń	56,2	245	2,12	0,23
Boleń	29,5	12	1,11	2,46
Miętus	2,6	2	0,10	1,30
Węgorz	0,8	1	0,03	0,80
Karp	6,5	2	0,25	3,25
Płoc	143,8	971	5,43	0,15
Leszcz	1821,3	1452	68,77	1,25
Lin	12,7	14	0,48	0,91
Karaś pospolity	3,8	16	0,14	0,24
Karaś srebrzysty	10,9	19	0,41	0,57
Brzana	8,6	3	0,32	2,87
Świnka	2,0	5	0,08	0,40
Certa	13,3	15	0,50	0,89
Kleń	25,9	36	0,98	0,72
Jaź	25,9	24	0,98	1,08
Jelec	1,5	6	0,06	0,25
Krąp	136,2	625	5,14	0,22
Wzdreğa	3,3	27	0,12	0,12
Ukleja	4,7	169	0,18	0,03

Tabela 7. Rzeka Bug nr 5

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
370	4990	2613,9	5505	7,06	13,49	0,52

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	429,4	230	16,43	1,87
Sandacz	185,1	75	7,08	2,47
Sum	184,7	30	7,07	6,16
Okoń	85,1	361	3,26	0,24
Boleń	44,2	22	1,69	2,01
Miętus	8,5	28	0,33	0,30
Karp	22,7	7	0,87	3,24
Płoc	252	1427	9,63	0,18
Leszcz	692,3	669	26,49	1,03
Lin	92,2	303	3,53	0,30
Karaś pospolity	12,8	54	0,49	0,24
Karaś srebrzysty	98,0	112	3,75	0,88
Brzana	19,0	7	0,73	2,71
Świnka	4,2	6	0,16	0,70
Kleń	85,1	92	3,26	0,93
Jaź	35,1	38	1,34	0,92
Jelec	1,5	8	0,06	0,19
Krąp	346,9	1934	13,26	0,18
Wzdreğa	8,9	77	0,34	0,12
Jazgarz	1,9	20	0,06	0,10
Ukleja	0,1	3	0,01	0,03
Sieja	4,2	2	0,16	2,10

Tabela 8. Rzeka Skrwa Prawa nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
234	1587	2311,9	14191	9,88	6,78	1,46

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	29,4	17	1,27	1,73
Okoń	25,8	184	1,12	0,14
Płoc	2111,7	13526	91,34	0,16
Leszcz	105,8	229	4,58	0,46
Lin	13,6	14	0,59	0,97
Kleń	6,7	9	0,29	0,74
Jaź	0,8	1	0,03	0,80
Jelec	0,2	1	0,01	0,20
Krąp	11,4	137	0,49	0,08
Wzdreğa	6,5	73	0,28	0,09

Tabela 9. Jezioro Toczyłowo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
68	603	793,7	2830	11,67	8,87	1,32

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	116,2	173	14,64	0,67
Sandacz	13,4	8	1,69	1,68
Sum	33,8	2	4,26	16,90
Okoń	249,3	1291	31,41	0,19
Boleń	2,8	1	0,35	2,80
Węgorz	0,5	1	0,06	0,50
Karp	19,1	8	2,41	2,39
Płoć	147,5	931	18,57	0,16
Leszcz	161,3	321	20,32	0,50
Lin	30,6	25	3,86	1,22
Karaś srebrzysty	1,8	4	0,23	0,45
Kleń	6,0	6	0,76	1,00
Jaź	1,9	2	0,24	0,95
Krąp	8,7	49	1,10	0,18
Wzdrenga	0,8	8	0,10	0,10

Tabela 10. Rzeka Elk nr 45

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
32	262	788,0	3499	24,63	8,19	3,01

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	112,3	70	14,25	1,60
Okoń	5,7	23	0,72	0,25
Płoć	578,9	3270	73,46	0,18
Leszcz	11,8	14	1,50	0,84
Kleń	50,5	41	6,41	1,23
Jaź	20,2	19	2,56	1,06
Krąp	8,3	61	1,06	0,14
Wzdrenga	0,3	1	0,04	0,30

Tabela 11. Jezioro Zdrowskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
75	865	759,6	1169	10,13	11,53	0,88

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	241,2	129	31,75	1,87
Sandacz	126,2	43	16,61	2,93
Sum	13,6	4	1,79	3,40
Okoń	15,7	57	2,07	0,28
Węgorz	11,4	11	1,50	1,04
Karp	20,9	18	2,75	1,16
Płoć	52,5	317	6,91	0,17
Leszcz	78,8	143	10,37	0,55
Lin	14,4	17	1,90	0,85
Karaś pospolity	5,1	9	0,67	0,57
Karaś srebrzysty	50,4	84	6,64	0,60
Amur	4,7	2	0,62	2,35
Krąp	12,6	39	1,66	0,32
Wzdrenga	111,6	284	14,69	0,39
Ukleja	0,5	12	0,07	0,04

Tabela 12. Jezioro Sasek Wielki

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
98	570	753,4	3735	7,69	5,82	1,32

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	199,3	121	26,45	1,65
Okoń	69,0	253	9,16	0,27
Boleń	10,7	7	1,42	1,53
Płoc	228,3	2432	30,30	0,09
Leszcz	159,1	302	21,12	0,53
Lin	15,8	17	2,10	0,93
Krap	9,3	97	1,23	0,10
Wzdreęga	58,2	386	7,73	0,15
Ukleja	3,7	120	0,49	0,03

Tabela 13. Rzeka Orzyc nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
119	1050	526,9	1881	4,43	8,82	0,50

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	105,7	66	20,06	1,60
Sandacz	7,5	4	1,42	1,88
Okoń	40,3	181	7,65	0,22
Karp	64,5	15	12,24	4,30
Płoc	154,3	1314	29,28	0,12
Leszcz	43,3	62	8,22	0,70
Lin	27,5	23	5,22	1,20
Karaś pospolity	2,4	8	0,46	0,30
Karaś srebrzysty	8,9	52	1,68	0,17
Kleń	29,4	36	5,58	0,82
Jaź	5,2	6	0,99	0,87
Krap	1,4	9	0,27	0,16
Jazgarz	0,1	1	0,02	0,10
Pozostałe	36,4	104	6,91	0,35

Tabela 14. Rzeka Rozoga nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
99	911	520,4	1275	5,26	9,20	0,57

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	54,1	31	10,40	1,75
Sandacz	40,2	19	7,72	2,12
Okoń	12,4	86	2,38	0,14
Karp	10,4	7	2,00	1,49
Płoc	52,6	538	10,11	0,10
Leszcz	282,5	527	54,29	0,54
Lin	59,5	52	11,43	1,14
Karaś pospolity	1,7	3	0,33	0,57
Jaź	2,7	2	0,52	1,35
Krap	3,2	8	0,61	0,40
Wzdreęga	1,1	2	0,21	0,55

Tabela 15. Glinianki Zielonka

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
69	643	418,1	461	6,06	9,32	0,65

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	54,1	28	12,94	1,93
Sum	15,0	1	3,59	15,00
Okoń	9,1	39	2,18	0,23
Karp	191,6	59	45,83	3,25
Płoć	21,8	174	5,20	0,13
Leszcz	28,6	72	6,83	0,40
Lin	17,8	17	4,26	1,05
Karaś pospolity	1,5	5	0,36	0,30
Karaś srebrzysty	20,1	51	4,81	0,39
Amur	56,6	10	13,54	5,66
Jaź	0,4	2	0,10	0,20
Krąp	1,5	3	0,36	0,50

Tabela 16. Glinianki Gołków, Głusków, Zalesie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
61	603	415,6	590	6,81	9,89	0,69

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	46,4	20	11,16	2,32
Sandacz	2,5	1	0,60	2,50
Okoń	17,4	82	4,19	0,21
Karp	263,0	105	63,28	2,50
Płoć	26,0	247	6,26	0,11
Leszcz	15,8	19	3,81	0,83
Lin	10,9	12	2,62	0,91
Karaś pospolity	1,6	1	0,38	1,60
Karaś srebrzysty	19,1	58	4,60	0,33
Amur	5,0	1	1,20	5,00
Kleń	0,7	1	0,17	0,70
Jaź	2,1	2	0,51	1,05
Krąp	3,0	20	0,72	0,15
Wzdreęga	0,1	1	0,02	0,10
Pozostałe	2,0	20	0,48	0,10

Tabela 17. Rzeka Rządza nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
118	503	381,6	1018	3,23	4,26	0,76

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	34,7	24	9,09	1,45
Okoń	25,7	115	6,73	0,22
Węgorz	0,7	1	0,18	0,70
Karp	6,5	3	1,70	2,17
Płoc	86,5	485	22,67	0,18
Leszcz	124,5	204	32,63	0,61
Lin	65,0	62	17,03	1,05
Karaś pospolity	1,8	8	0,47	0,23
Karaś srebrzysty	2,5	2	0,66	1,25
Kleń	3,0	2	0,79	1,50
Jaź	5,8	5	1,52	1,16
Krąp	14,2	69	3,73	0,21
Wzdreęga	10,2	30	2,67	0,34
Ukleja	0,5	6	0,13	0,08

Tabela 18. Rzeka Nurzec nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
65	636	374,4	654	5,76	9,78	0,59

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	147,8	87	39,48	1,70
Okoń	25,3	109	6,75	0,23
Boleń	5,0	2	1,34	2,50
Karp	35,5	29	9,48	1,22
Płoc	48,1	241	12,85	0,20
Leszcz	64,2	53	17,15	1,21
Lin	21,8	32	5,82	0,68
Karaś pospolity	1,2	3	0,32	0,40
Karaś srebrzysty	1,7	8	0,45	0,21
Kleń	7,4	7	1,98	1,06
Jaź	4,7	6	1,26	0,78
Krąp	10,9	60	2,90	0,18
Wzdreęga	0,4	7	0,11	0,06
Ukleja	0,4	10	0,11	0,04

Tabela 19. Jezioro Wałpusz

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
48	297	278,1	1368	5,79	6,19	0,94

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	90,8	59	32,65	1,54
Okoń	29,7	214	10,68	0,14
Płoc	76,3	790	27,44	0,10
Leszcz	51,0	144	18,34	0,35
Lin	13,1	8	4,71	1,64
Krąp	5,7	33	2,05	0,17
Wzdreęga	11,3	113	4,06	0,10
Ukleja	0,2	7	0,07	0,03

Tabela 20. Rzeka Jeziorka nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
59	371	270,5	870	4,58	6,29	0,73

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	26,3	15	9,72	1,75
Sandacz	1,4	1	0,52	1,40
Okoń	41,4	212	15,30	0,20
Karp	19,8	14	7,32	1,41
Płoc	47,6	425	17,60	0,11
Leszcz	31,9	53	11,79	0,60
Lin	20,9	15	7,73	1,39
Karaś srebrzysty	1,9	10	0,70	0,19
Kleń	44,8	72	16,56	0,62
Jaź	30,1	25	11,13	1,20
Krap	1,6	4	0,59	0,40
Wzdreęga	1,8	19	0,67	0,09
Pozostałe	1,0	5	0,37	0,20

Tabela 21. Glinianki Grodzisk

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
66	993	269,3	285	4,08	15,05	0,27

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	25,5	13	9,47	1,96
Sandacz	7,0	4	2,60	1,75
Okoń	2,7	9	1,00	0,30
Węgorz	2,1	2	0,78	1,05
Karp	167,8	125	62,31	1,34
Płoc	4,7	76	1,75	0,06
Leszcz	14,6	14	5,42	1,04
Lin	1,6	2	0,59	0,80
Karaś srebrzysty	17,9	26	6,65	0,69
Amur	12,4	3	4,60	4,13
Krap	13,0	11	4,83	1,18

Tabela 22. Jezioro Sasek Mały

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
46	178	266,0	1825	5,78	3,87	1,49

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,5	3	2,07	1,83
Okoń	37,9	213	14,25	0,18
Karp	2,6	3	0,98	0,87
Płoc	97,7	917	36,73	0,11
Leszcz	69,4	236	26,09	0,29
Lin	6,3	23	2,37	0,27
Karaś srebrzysty	3,9	12	1,46	0,33
Kleń	0,5	1	0,19	0,50
Jaź	0,5	1	0,19	0,50
Krap	37,8	336	14,21	0,11
Wzdreęga	1,6	10	0,60	0,16
Ukleja	2,3	70	0,86	0,03

Tabela 23. Jezioro Brajnckie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
42	225	262,0	1261	6,24	5,36	1,16

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,4	1	0,53	1,40
Sandacz	1,3	1	0,51	1,30
Okoń	4,4	17	1,68	0,26
Karp	2,5	1	0,95	2,50
Płoc	83,3	647	31,79	0,13
Leszcz	97,9	178	37,37	0,55
Lin	2,5	2	0,95	1,25
Karaś pospolity	7,5	19	2,86	0,39
Karaś srebrzysty	20,5	68	7,83	0,30
Krap	34,7	255	13,24	0,14
Wzdreęga	1,9	16	0,73	0,12
Ukleja	3,6	55	1,37	0,07
Pozostałe	0,5	1	0,19	0,50

Tabela 24. Jezioro Ługowskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
44	238	254,1	1849	5,78	5,41	1,07

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,6	3	1,02	0,87
Okoń	17,5	140	6,89	0,13
Płoc	181,7	1372	71,51	0,13
Leszcz	17,9	25	7,04	0,72
Lin	15,2	17	5,98	0,89
Krap	14,0	122	5,51	0,11
Wzdreęga	1,3	21	0,52	0,06
Ukleja	3,9	149	1,53	0,03

Tabela 25. Jezioro Przytomne

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
33	290	222,7	667	6,75	8,79	0,77

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	47,6	30	21,37	1,59
Sum	20,5	5	9,21	4,10
Okoń	12,5	57	5,61	0,22
Płoc	30,1	159	13,52	0,19
Leszcz	73,1	261	32,82	0,28
Lin	21,2	28	9,52	0,76
Karaś pospolity	5,8	8	2,60	0,73
Krap	9,5	91	4,27	0,10
Wzdreęga	2,0	17	0,90	0,12
Ukleja	0,4	11	0,18	0,04

Tabela 26. Staw Krzywie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
33	509	193,2	140	5,85	15,42	0,38

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	25,3	11	13,10	2,30
Sandacz	16,6	6	8,59	2,77
Karp	100,3	55	51,92	1,82
Płoc	0,2	1	0,10	0,20
Leszcz	21,0	35	10,86	0,60
Lin	9,5	9	4,92	1,06
Karaś pospolity	3,2	6	1,66	0,53
Amur	13,7	4	7,09	3,43
Krap	3,4	13	1,76	0,26

Tabela 27. Jezioro Górskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
22	241	191,5	372	8,70	10,95	0,79

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	27,1	18	14,15	1,51
Sandacz	2,5	1	1,31	2,50
Sum	1,5	1	0,78	1,50
Okoń	4,8	32	2,51	0,15
Węgorz	3,8	3	1,98	1,27
Karp	31,9	6	16,66	5,32
Płoc	10,9	170	5,69	0,06
Leszcz	66,7	77	34,83	0,87
Lin	16,5	18	8,62	0,92
Karaś srebrzysty	23,6	26	12,32	0,91
Wzdreęga	2,2	20	1,15	0,11

Tabela 28. Jezioro Małszewskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
25	183	185,1	767	7,40	7,32	1,01

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	50,9	34	27,50	1,50
Okoń	22,4	82	12,10	0,27
Płoc	73,8	546	39,87	0,14
Leszcz	23,4	43	12,64	0,54
Lin	6,5	9	3,51	0,72
Karaś pospolity	3,1	8	1,67	0,39
Karaś srebrzysty	0,9	4	0,49	0,23
Krap	4,1	41	2,22	0,10

Tabela 29. Rzeka Omulew nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
50	531	177,6	655	3,55	10,62	0,33

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	36,7	30	20,66	1,22
Okoń	28,4	172	15,99	0,17
Karp	3,0	2	1,69	1,50
Płoć	50,6	299	28,49	0,17
Leszcz	5,4	12	3,04	0,45
Karaś pospolity	6,9	32	3,89	0,22
Kleń	22,9	18	12,89	1,27
Jaź	20,3	20	11,43	1,02
Jelec	0,8	4	0,45	0,20
Krąp	0,4	2	0,23	0,20
Jazgarz	0,1	2	0,06	0,05
Ukleja	2,1	62	1,18	0,03

Tabela 30. Jezioro Ostrowąs (Plebanka)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
22	171	176,8	350	8,04	7,77	1,03

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	54,6	29	30,88	1,88
Sandacz	14,4	10	8,14	1,44
Okoń	7,1	9	4,02	0,79
Karp	3,1	3	1,75	1,03
Płoć	13,6	150	7,69	0,09
Leszcz	26,9	40	15,21	0,67
Lin	9,9	11	5,60	0,90
Karaś pospolity	31,3	33	17,71	0,95
Karaś srebrzysty	1,0	2	0,57	0,50
Krąp	14,7	57	8,32	0,26
Wzdreńga	0,2	6	0,11	0,03

Tabela 31. Rzeka Brok nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
38	295	174,5	586	4,59	7,76	0,59

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	53,0	33	30,37	1,61
Sandacz	2,8	2	1,60	1,40
Sum	17,0	1	9,74	17,00
Okoń	11,6	53	6,65	0,22
Płoć	54,9	459	31,47	0,12
Leszcz	16,9	11	9,68	1,54
Lin	11,1	11	6,36	1,01
Kleń	1,9	5	1,09	0,38
Jaź	4,1	4	2,35	1,03
Krąp	1,2	7	0,69	0,17

Tabela 32. Skoki I

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
25	210	168,7	558	6,75	8,40	0,80

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	56,5	32	33,49	1,77
Sandacz	6,2	4	3,68	1,55
Okoń	13,5	67	8,00	0,20
Węgorz	4,2	3	2,49	1,40
Karp	14,0	8	8,30	1,75
Płoc	30,6	297	18,14	0,10
Leszcz	34,8	98	20,63	0,36
Lin	5,0	5	2,96	1,00
Wzdreęga	3,0	17	1,78	0,18
Ukleja	0,9	27	0,53	0,03

Tabela 33. Rzeka Bzura 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
39	606	167,7	162	4,30	15,54	0,28

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	9,6	6	5,72	1,60
Sandacz	6,3	3	3,76	2,10
Karp	103,6	36	61,78	2,88
Płoc	1,0	7	0,60	0,14
Leszcz	7,6	18	4,53	0,42
Lin	20,2	21	12,05	0,96
Karaś pospolity	9,5	36	5,65	0,26
Karaś srebrzysty	8,5	30	5,07	0,28
Jaź	0,8	1	0,48	0,80
Krap	0,4	2	0,24	0,20
Wzdreęga	0,2	2	0,12	0,10

Tabela 34. Jezioro Lucieńskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
20	175	166,3	506	8,32	8,75	0,95

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	49,0	24	29,46	2,04
Sum	15,0	2	9,02	7,50
Okoń	36,8	189	22,13	0,19
Płoc	28,6	185	17,20	0,15
Leszcz	23,9	21	14,37	1,14
Lin	3,9	3	2,35	1,30
Karaś srebrzysty	2,5	6	1,50	0,42
Krap	0,1	1	0,06	0,10
Wzdreęga	6,5	75	3,91	0,09

Tabela 35. Jezioro Lutoborskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
28	221	158,0	1152	5,64	7,89	0,71

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	12,8	5	8,10	2,56
Okoń	0,8	6	0,51	0,13
Węgorz	18,4	17	11,65	1,08
Karp	1,6	1	1,01	1,60
Płoć	76,6	996	48,48	0,08
Leszcz	30,1	50	19,05	0,60
Lin	13,2	16	8,35	0,83
Krąp	0,9	12	0,57	0,08
Wzdreęga	2,1	29	1,33	0,07
Ukleja	1,5	20	0,95	0,08

Tabela 36. Jezioro Ciechomickie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
30	310	155,6	138	5,19	10,33	0,50

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	54,4	27	34,96	2,01
Sandacz	38,5	20	24,74	1,93
Sum	1,5	1	0,96	1,50
Okoń	3,9	15	2,52	0,26
Węgorz	1,0	1	0,64	1,00
Karp	0,8	1	0,51	0,80
Leszcz	47,2	67	30,33	0,70
Lin	5,5	3	3,53	1,83
Karaś srebrzysty	2,8	3	1,81	0,93

Tabela 37. Jezioro Białe

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
27	217	155,4	489	5,76	8,04	0,72

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	65,5	22	42,15	2,98
Okoń	14,3	99	9,20	0,14
Płoć	45,5	306	29,28	0,15
Leszcz	15,3	10	9,85	1,53
Lin	10,8	15	6,95	0,72
Krąp	1,0	10	0,64	0,10
Wzdreęga	3,0	27	1,93	0,11

Tabela 38. Jezioro Piasutno

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
23	151	148,6	485	6,46	6,57	0,98

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	52,1	32	35,06	1,63
Okoń	10,5	45	7,07	0,23
Węgorz	0,9	1	0,61	0,90
Karp	8,2	2	5,52	4,10
Płoc	16,6	306	11,17	0,05
Leszcz	31,0	59	20,86	0,53
Lin	25,1	24	16,89	1,05
Karaś pospolity	1,2	2	0,81	0,60
Jaź	0,5	1	0,34	0,50
Krap	2,5	13	1,67	0,19

Tabela 39. Jezioro Karaśnia

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
18	105	147,4	559	8,19	5,83	1,40

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	13,3	10	9,02	1,33
Okoń	7,5	21	5,09	0,36
Karp	16,0	1	10,85	16,00
Płoc	32,8	293	22,25	0,11
Leszcz	36,8	98	24,97	0,38
Lin	4,1	5	2,78	0,82
Krap	35,6	125	24,16	0,28
Wzdreęga	1,3	6	0,88	0,22

Tabela 40. Zbiornik Chorzele

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
38	309	136,9	194	3,60	8,13	0,44

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	7,9	5	5,77	1,58
Boleń	1,0	1	0,73	1,00
Karp	70	34	51,13	2,06
Płoc	5,3	38	3,87	0,14
Leszcz	8,7	6	6,36	1,45
Lin	3,1	3	2,26	1,03
Karaś pospolity	1,5	5	1,10	0,30
Karaś srebrzysty	33,2	92	24,25	0,36
Amur	1,7	1	1,24	1,70
Jaź	2,0	2	1,46	1,00
Krap	2,5	7	1,83	0,36

Tabela 41. Zalew w Makowie Mazowieckim

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
38	307	134,2	264	3,53	8,08	0,44

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	15,4	10	11,48	1,54
Sandacz	5,4	2	4,02	2,70
Okoń	0,7	1	0,52	0,70
Karp	59,5	34	44,34	1,75
Płoc	10,4	78	7,75	0,13
Leszcz	12,1	10	9,02	1,21
Karaś srebrzysty	7,3	30	5,44	0,24
Kleń	1,0	1	0,75	1,00
Jaź	3,5	2	2,60	1,75
Krąp	18,5	93	13,78	0,20
Wzdreęga	0,4	3	0,30	0,13

Tabela 42. Jezioro Malszeweckie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	76	125,4	762	12,54	7,60	1,65

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	6,8	5	5,42	1,36
Okoń	1,4	7	1,12	0,20
Płoc	64,9	685	51,75	0,09
Leszcz	40,7	39	32,46	1,04
Lin	4,6	4	3,67	1,15
Karaś pospolity	0,9	1	0,72	0,90
Karaś srebrzysty	3,0	6	2,39	0,50
Krąp	2,5	9	1,99	0,28
Wzdreęga	0,6	6	0,48	0,10

Tabela 43. Rzeka Utrata nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
39	280	124,1	258	3,18	7,18	0,44

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	15,5	9	12,49	1,72
Sandacz	3,0	2	2,42	1,50
Okoń	6,0	30	4,83	0,20
Karp	41,6	5	33,52	8,32
Płoc	11,4	99	9,19	0,12
Leszcz	16,3	27	13,13	0,60
Lin	4,9	4	3,95	1,23
Karaś srebrzysty	15,5	56	12,49	0,28
Kleń	2,5	2	2,01	1,25
Jaź	3,0	4	2,42	0,75
Krąp	1,8	7	1,45	0,26
Wzdreęga	2,6	13	2,10	0,20

Tabela 44. Jezioro Bytoń

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
12	97	121,8	345	10,15	8,08	1,26

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	31,7	14	26,03	2,26
Okoń	5,4	43	4,43	0,13
Karp	7,5	3	6,16	2,50
Płoc	24,7	224	20,28	0,11
Lin	40,1	35	32,92	1,15
Karaś pospolity	4,7	4	3,86	1,18
Wzdreęga	7,7	22	6,32	0,35

Tabela 45. Rzeka Biebrza nr 3 (Wissa)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
8	62	117,7	446	14,71	7,75	1,90

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	64,8	36	55,06	1,80
Okoń	20,3	126	17,25	0,16
Płoc	29,6	279	25,15	0,11
Kleń	0,8	1	0,68	0,80
Jaź	1,8	1	1,52	1,80
Wzdreęga	0,4	3	0,34	0,13

Tabela 46. Glinianki Błonie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
34	450	114,4	213	3,36	13,24	0,25

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	17,5	11	15,30	1,59
Okoń	1,0	5	0,87	0,20
Boleń	2,5	2	2,19	1,25
Węgorz	1,0	1	0,87	1,00
Karp	47,8	31	41,78	1,54
Płoc	14,7	55	12,85	0,27
Leszcz	5,0	39	4,37	0,13
Lin	3,4	6	2,97	0,57
Karaś pospolity	2,3	2	2,02	1,15
Karaś srebrzysty	15,7	45	13,72	0,35
Amur	2,0	2	1,75	1,00
Krap	0,2	1	0,17	0,20
Wzdreęga	1,3	13	1,14	0,10

Tabela 47. Jezioro Wikaryjskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
30	245	102,5	380	3,42	8,17	0,42

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	19,2	12	18,73	1,60
Okoń	5,6	20	5,46	0,28
Węgorz	2,1	2	2,05	1,05
Karp	8,5	2	8,29	4,25
Płoc	10,8	206	10,54	0,05
Leszcz	26,7	46	26,05	0,58
Lin	22,9	23	22,34	1,00
Krąp	3,6	34	3,51	0,11
Wzdreęga	2,5	19	2,44	0,13
Ukleja	0,6	16	0,59	0,04

Tabela 48. Jezioro Skrzyneckie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
24	113	100,6	321	4,19	4,71	0,89

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	34,2	22	34,00	1,55
Okoń	3,1	10	3,08	0,31
Karp	4,7	1	4,67	4,70
Płoc	27,5	231	27,34	0,12
Leszcz	9,5	11	9,44	0,86
Lin	13,9	14	13,82	0,99
Karaś srebrzysty	3,3	3	3,28	1,10
Wzdreęga	4,2	27	4,17	0,16
Ukleja	0,2	2	0,20	0,10

Tabela 49. Jezioro Mierucie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
12	81	99,8	267	8,32	6,75	1,23

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	17,7	10	17,74	1,77
Sandacz	3,8	1	3,81	3,80
Okoń	2,1	4	2,10	0,53
Karp	6,5	5	6,51	1,30
Płoc	19,8	192	19,84	0,10
Leszcz	8,7	6	8,72	1,45
Lin	36,3	31	36,37	1,17
Karaś pospolity	2,3	3	2,30	0,77
Krąp	0,9	3	0,90	0,30
Wzdreęga	1,7	12	1,71	0,14

Tabela 50. Glinianki Borowe

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
16	132	99,3	50	6,21	8,25	0,75

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	7,1	4	7,15	1,78
Węgorz	0,8	1	0,81	0,80
Karp	75,1	23	75,63	3,27
Płóć	1,6	8	1,61	0,20
Lin	1,1	1	1,11	1,10
Karaś pospolity	1,5	5	1,51	0,30
Karaś srebrzysty	0,8	2	0,81	0,40
Amur	4,2	1	4,23	4,20
Kleń	4,1	3	4,13	1,37
Jaź	3,0	2	3,01	1,50

Tabela 51. Jezioro Burdąg

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
7	37	99,2	591	14,17	5,29	2,68

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	8,8	24	8,87	0,37
Płóć	40,1	339	40,42	0,12
Leszcz	20,1	28	20,26	0,72
Lin	9,1	12	9,17	0,76
Krap	16,3	147	16,44	0,11
Wzdrenga	4,8	41	4,84	0,12

Tabela 52. Jezioro Grójeckie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
26	123	96,8	376	3,72	4,73	0,79

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	25,0	15	25,83	1,67
Okoń	1,1	3	1,14	0,37
Węgorz	3,2	3	3,31	1,07
Płóć	36,3	298	37,50	0,12
Leszcz	21,7	42	22,42	0,52
Lin	7,8	7	8,06	1,11
Karaś srebrzysty	1,0	2	1,02	0,50
Wzdrenga	0,7	6	0,72	0,12

Tabela 53. Jezioro Okonin

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
18	125	94,5	309	5,25	6,94	0,76

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	4,4	4	4,66	1,10
Okoń	2,6	11	2,75	0,24
Płóć	26,9	224	28,47	0,12
Leszcz	42,7	41	45,19	1,04
Lin	16,4	23	17,35	0,71
Krap	1,5	6	1,58	0,25

Tabela 54. Rzeka Świder nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
15	156	93,9	346	6,26	10,40	0,60

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	22,8	14	24,28	1,63
Okoń	9,6	30	10,22	0,32
Karp	8,0	3	8,52	2,67
Płoć	28,1	199	29,93	0,14
Leszcz	14,7	18	15,65	0,82
Lin	2,0	2	2,13	1,00
Karaś srebrzysty	8,7	80	9,27	0,11

Tabela 55. Jeziórko Moczydło

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
39	237	93,0	144	2,38	6,08	0,39

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,5	4	5,91	1,38
Okoń	6,5	19	6,99	0,34
Karp	33,7	15	36,24	2,25
Płoć	5,8	37	6,24	0,16
Leszcz	25,5	43	27,42	0,59
Lin	3,0	4	3,23	0,75
Karaś srebrzysty	0,6	2	0,65	0,30
Amur	9,1	6	9,78	1,52
Krąp	1,8	8	1,94	0,23
Wzdreğa	1,5	6	1,60	0,25

Tabela 56. Glinianki Szczęśliwickie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
20	217	91,0	165	4,55	10,85	0,42

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,6	3	6,15	1,87
Okoń	1,5	7	1,65	0,21
Karp	28,1	22	30,88	1,28
Płoć	7,4	51	8,13	0,15
Leszcz	22,3	45	24,51	0,50
Lin	15,1	12	16,59	1,26
Karaś pospolity	0,7	1	0,77	0,70
Karaś srebrzysty	10,3	24	11,32	0,43

Tabela 57. Jezioro Borowiec (Wildno)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
12	50	90,9	469	7,58	4,17	1,82

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,0	2	5,50	2,50
Okoń	2,6	17	2,86	0,15
Karp	28	3	30,80	9,33
Płoc	18,9	394	20,79	0,05
Leszcz	9,3	16	10,23	0,58
Lin	16,8	16	18,48	1,05
Karaś srebrzysty	7,8	12	8,58	0,65
Krap	2,5	9	2,76	0,28

Tabela 58. Staw Jedwabne

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
7	52	90,5	147	12,93	7,43	1,74

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	9,5	3	10,50	3,17
Okoń	2,6	13	2,87	0,20
Karp	54	27	59,67	2,00
Płoc	9,1	53	10,06	0,17
Lin	1,0	1	1,10	1,00
Karaś pospolity	4,2	21	4,64	0,20
Karaś srebrzysty	10,1	29	11,16	0,35

Tabela 59. Rzeka Orz nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
33	201	86,6	419	2,62	6,09	0,43

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	17,3	10	19,98	1,73
Okoń	10,7	48	12,36	0,22
Płoc	31,6	318	36,48	0,10
Leszcz	16,1	18	18,59	0,89
Lin	6,9	7	7,97	0,99
Karaś pospolity	2,6	12	3,00	0,22
Kleń	0,9	1	1,04	0,90
Krap	0,5	5	0,58	0,10

Tabela 60. Jezioro Skrwilno

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
11	223	85,5	775	7,77	20,27	0,38

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,2	1	2,57	2,20
Okoń	0,3	5	0,36	0,06
Karp	17,6	3	20,58	5,87
Płoc	35,8	553	41,87	0,06
Lin	8,6	8	10,06	1,08
Karaś pospolity	0,9	1	1,06	0,90
Karaś srebrzysty	5,1	9	5,96	0,57
Krap	15,0	195	17,54	0,08

Tabela 61. Staw Talar

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
13	108	82,6	97	6,35	8,31	0,76

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	4,5	3	5,45	1,50
Sandacz	3,4	2	4,12	1,70
Okoń	0,6	3	0,73	0,20
Karp	51,2	39	61,99	1,31
Płoc	3,6	18	4,36	0,20
Leszcz	11,1	14	13,44	0,79
Lin	2,0	2	2,42	1,00
Amur	1,8	1	2,18	1,80
Krap	0,2	2	0,24	0,10
Pozostałe	4,2	14	5,07	0,30

Tabela 62. Jezioro Pomocnia

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
29	184	75,0	290	2,59	6,34	0,41

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	3,7	2	4,93	1,85
Okoń	0,9	6	1,20	0,15
Karp	17,4	4	23,20	4,35
Płoc	32,1	257	42,80	0,12
Leszcz	12,6	14	16,80	0,90
Lin	6,5	4	8,67	1,63
Karaś srebrzysty	0,8	1	1,07	0,80
Krap	1,0	2	1,33	0,50

Tabela 63. Jezioro Telązyna

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	33	69,9	108	13,98	6,60	2,12

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	29,9	14	42,78	2,14
Okoń	1,7	21	2,43	0,08
Węgorz	0,9	1	1,29	0,90
Karp	2,9	1	4,15	2,90
Płoc	2,9	40	4,15	0,07
Lin	21,4	19	30,62	1,13
Karaś srebrzysty	10,2	12	14,58	0,85

Tabela 64. Czarne Włocławskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
17	115	69,3	339	4,08	6,76	0,60

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	7,5	8	10,82	0,94
Okoń	0,8	4	1,15	0,20
Karp	1,0	1	1,44	1,00
Płoć	13,4	204	19,34	0,07
Leszcz	40,2	91	58,01	0,44
Lin	1,0	4	1,44	0,25
Karaś pospolity	2,7	3	3,90	0,90
Karaś srebrzysty	0,3	1	0,43	0,30
Krap	1,7	5	2,46	0,34
Wzdręga	0,5	8	0,72	0,06
Ukleja	0,2	10	0,29	0,02

Tabela 65. Jezioro Warchałdzkie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
16	89	67,8	294	4,24	5,56	0,76

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	24,4	21	35,99	1,16
Okoń	9,1	62	13,42	0,15
Węgorz	1,3	1	1,92	1,30
Płoć	18,2	155	26,84	0,12
Leszcz	5,8	14	8,55	0,41
Lin	6,8	9	10,04	0,76
Wzdręga	2,2	32	3,24	0,07

Tabela 66. Jezioro Świętajno (Narty)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
12	64	63,0	320	5,25	5,33	0,98

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	13,7	9	21,75	1,52
Okoń	32,2	205	51,11	0,16
Płoć	13,8	81	21,90	0,17
Wzdręga	3,3	25	5,24	0,13

Tabela 67. Jezioro Brzeźno

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	58	62,9	98	6,29	5,80	1,08

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	30,7	16	48,81	1,92
Okoń	4,1	25	6,52	0,16
Płoć	3,4	14	5,40	0,24
Lin	11	13	17,49	0,85
Karaś pospolity	5,5	12	8,74	0,46
Karaś srebrzysty	8,2	18	13,04	0,46

Tabela 68. Jezioro Ostrowickie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
20	116	61,0	698	3,05	5,80	0,53

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,5	1	2,46	1,50
Okoń	5,0	70	8,20	0,07
Karp	1,9	1	3,11	1,90
Płoc	39,8	538	65,25	0,07
Lin	6,8	6	11,15	1,13
Krap	2,5	6	4,10	0,42
Wzdreęga	3,1	52	5,08	0,06
Ukleja	0,4	24	0,65	0,02

Tabela 69. Stawy w Parku Pruszków

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
19	99	61,0	55	3,21	5,21	0,62

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,8	3	9,51	1,93
Karp	20,4	13	33,44	1,57
Płoc	0,5	1	0,82	0,50
Leszcz	0,8	1	1,32	0,80
Lin	5,2	4	8,52	1,30
Karaś pospolity	0,4	1	0,66	0,40
Karaś srebrzysty	23,5	30	38,52	0,78
Amur	4,4	2	7,21	2,20

Tabela 70. Rzeka Zgłowiączka nr 2

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
13	80	60,0	300	4,62	6,15	0,75

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	22,8	16	38,00	1,43
Okoń	1,8	13	3,00	0,14
Płoc	24,1	245	40,17	0,10
Lin	0,5	1	0,83	0,50
Karaś pospolity	4,7	7	7,83	0,67
Świnka	3,2	6	5,33	0,53
Krap	2,2	10	3,67	0,22
Wzdreęga	0,7	2	1,17	0,35

Tabela 71. Jezioro Sędańskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
12	40	58,9	591	4,91	3,33	1,47

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	11,4	120	19,35	0,10
Płoc	38,4	351	65,20	0,11
Leszcz	4,0	11	6,79	0,36
Karaś srebrzysty	0,2	1	0,34	0,20
Krap	2,7	30	4,58	0,09
Ukleja	2,2	78	3,74	0,03

Tabela 72. Staw Kozioł Wincenta

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	33	51,6	82	10,32	6,60	1,56

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	0,8	5	1,55	0,16
Karp	24,3	21	47,09	1,16
Płoć	2,8	38	5,43	0,07
Leszcz	15,8	16	30,62	0,99
Lin	0,7	1	1,36	0,70
Amur	7,2	1	13,95	7,20

Tabela 73. Jezioro Grom

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
14	52	50,2	153	3,59	3,71	0,97

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	11,8	9	23,51	1,31
Okoń	8,1	39	16,14	0,21
Płoć	9,3	79	18,53	0,12
Leszcz	15,2	13	30,28	1,17
Lin	4,6	3	9,16	1,53
Wzdreęga	1,2	10	2,38	0,12

Tabela 74. Zbiornik Soczewka

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
13	54	49,8	108	3,83	4,15	0,92

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,2	3	10,44	1,73
Sum	4,2	1	8,43	4,20
Węgorz	2,7	2	5,42	1,35
Płoć	6,8	41	13,65	0,17
Leszcz	29,9	41	60,04	0,73
Wzdreęga	1,0	20	2,02	0,05

Tabela 75. Rzeka Jegrznia nr 11

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
9	44	43,6	222	4,84	4,89	0,99

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,3	3	12,16	1,77
Sandacz	5,2	4	11,93	1,30
Okoń	3,3	25	7,57	0,13
Boleń	0,9	1	2,06	0,90
Płoć	8,7	64	19,95	0,14
Leszcz	3,6	5	8,26	0,72
Jaź	0,6	1	1,38	0,60
Krap	16,0	119	36,69	0,13

Tabela 76. Jezioro Rekowe

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	52	42,1	125	4,21	5,20	0,81

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	4,4	3	10,45	1,47
Okoń	5,8	22	13,78	0,26
Płoć	7,7	64	18,29	0,12
Leszcz	23,7	35	56,29	0,68
Lin	0,5	1	1,19	0,50

Tabela 77. Jezioro Huta

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
11	61	40,9	355	3,72	5,55	0,67

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,0	1	2,44	1,00
Okoń	1,1	4	2,69	0,28
Płoć	32,8	329	80,20	0,10
Lin	3,0	6	7,33	0,50
Wzdreęga	3,0	15	7,34	0,20

Tabela 78. Jezioro Czarownica (Borzymińskie)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
8	41	40,4	161	5,05	5,13	0,99

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	13,9	10	34,41	1,39
Płoć	15	139	37,13	0,11
Leszcz	8,1	8	20,05	1,01
Lin	3,4	4	8,41	0,85

Tabela 79. Skoki II

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
8	77	39,1	64	4,89	9,63	0,51

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,2	1	3,07	1,20
Karp	24	11	61,38	2,18
Płoć	7,8	47	19,95	0,17
Leszcz	6,1	5	15,60	1,22

Tabela 80. Jezioro Kępka Szlachecka

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
11	38	38,5	193	3,50	3,45	1,01

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,0	3	12,98	1,67
Okoń	1,5	10	3,90	0,15
Karp	4,0	2	10,38	2,00
Płoć	12,8	158	33,25	0,08
Leszcz	0,9	1	2,34	0,90
Lin	12,9	12	33,51	1,08
Wzdreęga	1,4	7	3,64	0,20

Tabela 81. Staw Montoprzem

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	52	36,5	25	7,30	10,40	0,70

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Karp	35,6	22	97,53	1,62
Pozostałe	0,9	3	2,47	0,30

Tabela 82. Zbiornik Niewiadoma

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
17	73	33,9	81	1,99	4,29	0,46

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Karp	1,5	1	4,42	1,50
Płoc	0,3	2	0,88	0,15
Leszcz	8,0	13	23,60	0,62
Lin	16,4	10	48,38	1,64
Karaś srebrzysty	5,2	15	15,34	0,35
Wzdreęga	2,5	40	7,38	0,06

Tabela 83. Czarne Gostynińskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
8	88	32,9	69	4,11	11,00	0,37

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	14,5	10	44,07	1,45
Okoń	1,0	10	3,04	0,10
Karp	4,9	5	14,89	0,98
Płoc	1,5	30	4,56	0,05
Leszcz	1,2	2	3,65	0,60
Lin	8,4	8	25,53	1,05
Krap	1,4	4	4,26	0,35

Tabela 84. Staw Kobylucha

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
8	33	31,5	151	3,94	4,13	0,95

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,6	2	8,25	1,30
Okoń	7,1	47	22,54	0,15
Karp	3,8	1	12,06	3,80
Płoc	3,7	18	11,75	0,21
Lin	1,3	1	4,13	1,30
Krap	2,0	3	6,35	0,67
Wzdreęga	11,0	79	34,92	0,14

Tabela 85. Jezioro Łąki Zawistowe

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
7	30	30,9	147	4,41	4,29	1,03

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	10,3	5	33,33	2,06
Okoń	4,8	32	15,53	0,15
Węgorz	0,8	1	2,59	0,80
Płoc	7,8	99	25,24	0,08
Leszcz	2,8	5	9,06	0,56
Lin	3,5	4	11,33	0,88
Krap	0,9	1	2,92	0,90

Tabela 86. Jezioro Głębocek (w obw. J. Rekowe)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	41	30,4	205	3,04	4,10	0,74

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	3,3	2	10,86	1,65
Okoń	6,6	36	21,71	0,18
Węgorz	1,4	2	4,61	0,70
Płoc	15,5	160	50,98	0,10
Leszcz	1,6	3	5,26	0,53
Lin	2,0	2	6,58	1,00

Tabela 87. Jezioro Głębocek (na cieku bez nazwy)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
7	68	27,5	78	3,93	9,71	0,40

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Węgorz	1,5	2	5,45	0,75
Płoc	4,9	51	17,82	0,10
Leszcz	15,7	21	57,09	0,75
Lin	5,4	4	19,64	1,35

Tabela 88. Kocioł

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	33	26,0	75	6,50	8,25	0,79

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Karp	4,8	2	18,46	2,40
Płoc	3,4	45	13,08	0,08
Leszcz	4,2	4	16,15	1,05
Lin	10,7	8	41,15	1,34
Karaś srebrzysty	2,4	6	9,23	0,40
Krap	0,5	10	1,93	0,05

Tabela 89. Jezioro Łuba

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
12	69	25,5	81	2,13	5,75	0,37

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,4	4	21,18	1,35
Okoń	3,9	9	15,29	0,43
Karp	1,0	2	3,92	0,50
Płoć	6,5	54	25,49	0,12
Lin	7	9	27,45	0,78
Karaś srebrzysty	1,7	3	6,67	0,57

Tabela 90. Jezioro Lubiechowo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	28	23,7	67	2,37	2,80	0,85

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	11,2	7	47,26	1,60
Okoń	1,8	13	7,59	0,14
Płoć	0,4	3	1,69	0,13
Lin	3,1	3	13,08	1,03
Karaś pospolity	0,7	1	2,95	0,70
Wzdreńga	6,5	40	27,43	0,16

Tabela 91. Jezioro Klimek (Konik)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
21	42	23,6	83	1,12	2,00	0,56

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	4,6	3	19,49	1,53
Sandacz	5,0	3	21,19	1,67
Okoń	2,8	14	11,86	0,20
Płoć	3,9	38	16,53	0,10
Leszcz	5,5	10	23,31	0,55
Krap	1,8	15	7,62	0,12

Tabela 92. Jezioro Lemańskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	18	22,8	138	4,56	3,60	1,27

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	3,9	3	17,11	1,30
Okoń	1,1	7	4,82	0,16
Płoć	13,6	111	59,65	0,12
Lin	2,6	4	11,40	0,65
Wzdreńga	1,6	13	7,02	0,12

Tabela 93. Jezioro Peł

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	27	20,6	211	5,15	6,75	0,76

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	11,9	7	57,77	1,70
Płoc	7,7	188	37,38	0,04
Wzdreęga	1,0	16	4,85	0,06

Tabela 94. Jezioro Szczutkowskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	12	20,6	78	4,12	2,40	1,72

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,4	2	11,65	1,20
Okoń	0,5	1	2,43	0,50
Karp	2,8	2	13,59	1,40
Płoc	8,8	59	42,72	0,15
Leszcz	2,2	7	10,68	0,31
Lin	0,4	1	1,94	0,40
Krap	3,5	6	16,99	0,58

Tabela 95. Jezioro Rybnica

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
6	27	19,7	153	3,28	4,50	0,73

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,8	3	29,44	1,93
Okoń	0,3	1	1,52	0,30
Płoc	8,5	138	43,15	0,06
Leszcz	3,0	2	15,23	1,50
Lin	0,6	2	3,05	0,30
Krap	1,0	4	5,07	0,25
Wzdreęga	0,5	3	2,54	0,17

Tabela 96. Jezioro Białobrzegi

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
7	26	17,8	25	2,54	3,71	0,68

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	13,0	6	73,03	2,17
Okoń	0,5	1	2,81	0,50
Karp	1,5	1	8,43	1,50
Płoc	0,8	14	4,49	0,06
Leszcz	2,0	3	11,24	0,67

Tabela 97. Służewo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
6	18	16,9	44	2,82	3,00	0,94

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,0	3	29,59	1,67
Płoc	3,4	28	20,12	0,12
Karaś pospolity	3,3	5	19,53	0,66
Karaś srebrzysty	5,2	8	30,76	0,65

Tabela 98. Jezioro Chojno

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	31	16,7	217	3,34	6,20	0,54

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,7	5	34,13	1,14
Okoń	0,8	12	4,79	0,07
Płoc	7,5	197	44,91	0,04
Lin	2,7	3	16,17	0,90

Tabela 99. Jezioro Widoń

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	12	15,0	69	3,75	3,00	1,25

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,5	1	10,00	1,50
Okoń	1,1	4	7,33	0,28
Płoc	5,5	55	36,67	0,10
Lin	4,8	5	32,00	0,96
Wzdreęga	2,1	4	14,00	0,53

Tabela 100. Jezioro Machniacz

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	19	14,8	94	3,70	4,75	0,78

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,5	1	10,14	1,50
Płoc	8,2	86	55,40	0,10
Leszcz	1,5	2	10,14	0,75
Lin	3,2	3	21,62	1,07
Krap	0,4	2	2,70	0,20

Tabela 101. Sierpienica

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	49	14,7	52	4,90	16,33	0,30

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	9,2	7	62,59	1,31
Płoc	5,5	45	37,41	0,12

Tabela 102. Jezioro Płociczno

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	32	12,6	17	3,15	8,00	0,39

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	3,8	3	30,16	1,27
Okoń	0,5	5	3,97	0,10
Lin	8,3	9	65,87	0,92

Tabela 103. Czarne Baruchowo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	21	11,9	61	3,97	7,00	0,57

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	0,9	3	7,56	0,30
Leszcz	6,9	39	57,98	0,18
Lin	2,5	2	21,01	1,25
Krąp	1,6	17	13,45	0,09

Tabela 104. Basen Brwinów

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	28	11,5	6	2,88	7,00	0,41

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,5	1	13,04	1,50
Karp	10,0	5	86,96	2,00

Tabela 105. Szkwa nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	27	11,1	37	2,78	6,75	0,41

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,6	2	14,41	0,80
Płoc	9,5	35	85,59	0,27

Tabela 106. Glinianka Włochy

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
9	14	10,4	43	1,16	1,56	0,74

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,5	1	14,42	1,50
Karp	4,2	3	40,38	1,40
Płoc	3,7	29	35,58	0,13
Wzdrenga	0,6	6	5,77	0,10
Pozostałe	0,4	4	3,85	0,10

Tabela 107. Jezioro Świesz

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	4	9,9	70	9,90	4,00	2,48

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Płoc	9,9	70	100,00	0,14

Tabela 108. Jezioro Czarno-Czerskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	29	8,1	9	2,70	9,67	0,28

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Lin	8,1	9	100,00	0,90

Tabela 109. Jezioro Średnie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	8	8,0	32	2,67	2,67	1,00

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Płoc	3,3	23	41,25	0,14
Leszcz	4,7	9	58,75	0,52

Tabela 110. Tażyna

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	5	8,0	32	4,00	2,50	1,60

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,5	1	18,75	1,50
Płoc	2,5	23	31,25	0,11
Jaź	4,0	8	50,00	0,50

Tabela 111. Jezioro Radziszewo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	6	7,9	15	3,95	3,00	1,32

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Płoc	3,6	11	45,57	0,33
Lin	4,3	4	54,43	1,08

Tabela 112. Staw Lubraniec

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	6	7,7	20	3,85	3,00	1,28

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Płoc	7,7	20	100,00	0,39

Tabela 113. Basen Kolejniak

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
9	33	7,1	11	0,79	3,67	0,22

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Karp	1,5	1	21,13	1,50
Lin	3,0	4	42,25	0,75
Karaś srebrzysty	2,6	6	36,62	0,43

Tabela 114. Jezioro Jasne

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	6	6,4	5	2,13	2,00	1,07

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	6,4	5	100,00	1,28

Tabela 115. Jezioro Czerskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	10	5,7	11	2,85	5,00	0,57

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,0	1	35,09	2,00
Płoć	1,0	7	17,54	0,14
Lin	2,7	3	47,37	0,90

Tabela 116. Jezioro Zielonka

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	9	5,1	7	2,55	4,50	0,57

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Lin	4,1	5	80,39	0,82
Karaś srebrzysty	1,0	2	19,61	0,50

Tabela 117. Jezioro Nożyce

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
12	28	4,5	25	0,38	2,33	0,16

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,2	2	48,89	1,10
Okoń	1,6	11	35,56	0,15
Płoć	0,7	12	15,55	0,06

Tabela 118. Mołtawa nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	10	4,5	21	2,25	5,00	0,45

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Płoć	2,6	20	57,78	0,13
Leszcz	1,9	1	42,22	1,90

Tabela 119. Staw Ruda

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	20	4,4	32	2,20	10,00	0,22

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Płoć	1,2	11	27,27	0,11
Lin	1,4	3	31,82	0,47
Wzdreęga	1,8	18	40,91	0,10

Tabela 120. Staw Wielgie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	12	4,3	6	4,30	12,00	0,36
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Leszcz		0,8	1	18,60	0,80	
Lin		2,8	3	65,12	0,93	
Karaś pospolity		0,7	2	16,28	0,35	

Tabela 121. Jezioro Trzebowo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	2	2,2	16	1,10	1,00	1,10
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Okoń		2,2	16	100,00	0,14	

Tabela 122. Jezioro Natać

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	4	2,0	2	0,67	1,33	0,50
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Lin		2,0	2	100,00	1,00	

Tabela 123. Jezioro Skonieczne

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	3	2,0	1	2,00	3,00	0,67
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Szczupak		2,0	1	100,00	2,00	

Tabela 124. Młyński Staw

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	3	1,5	7	0,75	1,50	0,50
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Okoń		0,5	2	33,33	0,25	
Płoć		1,0	5	66,67	0,20	

Tabela 125. Radzynek (Paproty)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	1	1,0	2	1,00	1,00	1,00
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Lin		1,0	2	100,00	0,50	

Tabela 126. Wymysłów

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	4	1,0	1	1,00	4,00	0,25
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Karp		1,0	1	100,00	1,00	

Tabela 127. Jezioro Łaźnica

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	1	0,0	0	0,00	1,00	0,00

Tabela 128. Glinianka Bagienice

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	6	0,0	0	0,00	1,20	0,00

Tabela 129. Jezioro Habdzin

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	10	0,0	0	0,00	5,00	0,00

Tabela 130. Glinianka Tłuszcz

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	4	0,0	0	0,00	4,00	0,00

Tabela 131. Zbiornik Garwolin

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	3	0,0	0	0,00	3,00	0,00