

**OCENA PRESJI I POŁOWÓW WĘDKARSKICH W WODACH
UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG MAZOWIECKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
W 2018 ROKU**

Autorzy:

dr inż. Hanna Draszkievicz-Mioduszevska

prof. dr hab. Arkadiusz Wołos

Zakład Bioekonomiki Rybactwa

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

WPROWADZENIE	4
I. DANE OGÓLNE	7
1. ODŁOWY CAŁKOWITE – WYNIKI WĘDKARZY MAZOWIECKIEGO OKRĘGU PZW (TABELA NR I)	7
II. ŁOWISKA WĘDKARSKIE	7
1. OBWODY RYBACKIE.....	7
1.1. <i>Obwód rybacki Narew Nr 7 (Tabela nr 1, Rys. 1)</i>	7
1.2. <i>Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5 (Tabela nr 2, Rys. 2)</i>	8
1.3. <i>Obwód rybacki Wisła Nr 3 (Tabela nr 3, Rys. 3)</i>	9
1.4. <i>Obwód rybacki Narew Nr 8 (Tabela nr 4, Rys. 4)</i>	10
1.5. <i>Obwód rybacki Narew Nr 6 (Tabela nr 5, Rys. 5)</i>	11
1.6. <i>Obwód rybacki Bug Nr 5 (Tabela nr 6, Rys. 6)</i>	11
1.7. <i>Obwód rybacki Wisła Nr 4 (Tabela nr 7, Rys. 7)</i>	12
1.8. <i>Obwód rybacki Skrwa Prawa Nr 1 (Tabela nr 8, Rys. 8)</i>	13
1.9. <i>Obwód rybacki Orzyc Nr 1 (Tabela nr 11, Rys. 9)</i>	14
1.10. <i>Obwód rybacki Bzura Nr 1 (Tabela nr 12, Rys. 10)</i>	14
1.11. <i>Obwód rybacki Rozoga Nr 1 (Tabela nr 14, Rys. 11)</i>	15
1.12. <i>Obwód rybacki Rządza Nr 1 (Tabela nr 19, Rys. 12)</i>	16
1.13. <i>Obwód rybacki Elk Nr 45 (Tabela nr 24, Rys. 13)</i>	16
1.14. <i>Obwód rybacki Nurzec Nr 1 (Tabela nr 25, Rys. 14)</i>	17
1.15. <i>Obwód rybacki Jezioro Nr 1 (Tabela nr 31, Rys. 15)</i>	18
1.16. <i>Obwód rybacki Omulew Nr 1 (Tabela nr 44, Rys. 16)</i>	18
1.17. <i>Obwód rybacki Brok Nr 1 (Tabela nr 48, Rys. 17)</i>	19
1.18. <i>Obwód rybacki Utrata Nr 1 (Tabela nr 55, Rys. 18)</i>	20
1.19. <i>Obwód rybacki Jegrznia Nr 11 (Tabela nr 56)</i>	20
1.20. <i>Obwód rybacki Zgłowiączka Nr 2 (Tabela nr 62)</i>	21
1.21. <i>Obwód rybacki Orz Nr 1 (Tabela nr 73)</i>	21
1.22. <i>Obwód rybacki Świder Nr 1 (Tabela nr 86)</i>	21
1.23. <i>Obwód rybacki Biebrza Nr 3 (Wissa) (Tabela nr 95)</i>	21
1.24. <i>Obwód rybacki Tążyń (Tabela nr 108)</i>	22
1.25. <i>Obwód rybacki Moltawa Nr 1 (Tabela nr 112)</i>	22
1.26. <i>Obwód rybacki Szkwa Nr 1 (Tabela nr 123)</i>	22
2. JEZIORA ZAKŁADU RYBACKIEGO JANOWO	22
2.1. <i>Jezioro Wałpusz (Tabela nr 9, Rys. 19)</i>	22
2.2. <i>Jezioro Sasek Wielki (Kobylocha) (Tabela nr 18, Rys. 20)</i>	23
2.3. <i>Jezioro Sasek Mały (Tabela nr 27, Rys. 21)</i>	24
2.4. <i>Jezioro Świętajno (Narty) (Tabela nr 29)</i>	24
2.5. <i>Jezioro Brajnickie (Tabela nr 33)</i>	24
2.6. <i>Jezioro Piasutno (Tabela nr 40)</i>	25
2.7. <i>Jezioro Małszewskie (Tabela nr 42)</i>	25
2.8. <i>Jezioro Machniacz (Tabela nr 45, Rys. 22)</i>	25
2.9. <i>Pozostałe jeziora Zakładu Rybackiego Janowo</i>	26
3. INNE ŁOWISKA	27

3.1. Jezioro Zdwońskie (Tabela nr 10, Rys. 23).....	27
3.2. Glinianki Zielonka (Tabela nr 13, Rys. 24).....	28
3.3. Staw Krzywie (Tabela nr 15, Rys. 25).....	28
3.4. Glinianki Błonie (Tabela nr 16).....	29
3.5. Jezioro Toczyłowo (Tabela nr 17, Rys. 26).....	29
3.6. Jezioro Ługowskie (Tabela nr 20).....	30
3.7. Jezioro Białe (Tabela nr 21, Rys. 27).....	30
3.8. Glinianki Grodzisk (Tabela nr 22, Rys. 28).....	31
3.9. Jezioro Pomocnia (Tabela nr 23, Rys. 29).....	32
3.10. Jezioro Ostrowąs (Plebanka) (Tabela nr 26, Rys. 30).....	32
3.11. Glinianki Gołków, Głósków, Zalesie (Tabela nr 28).....	33
3.12. Jezioro Przytomne (Tabela nr 30).....	33
3.13. Zalew w Makowie Mazowieckim (Tabela nr 32, Rys. 31).....	34
3.14. Jezioro Górskie (Tabela nr 34).....	34
3.15. Zbiornik Chorzele (Tabela nr 35, Rys. 32).....	35
3.16. Jezioro Ciechomickie (Tabela nr 36, Rys. 33).....	35
3.17. Jezioro Skrzyneckie (Tabela nr 37).....	36
3.18. Jezioro Grójeckie (Tabela nr 38, Rys. 34).....	36
3.19. Staw Talar (Tabela nr 39).....	37
3.20. Stawy w Parku Pruszków (Tabela nr 41).....	37
3.21. Jezioro Lutoborskie (Tabela nr 43).....	37
3.22. Pozostałe łowiska okręgu.....	38
Skoki I (Tabela nr 46), Jeziórko Moczydło (Tabela nr 47), Jezioro Wikaryjskie (Tabela nr 49), Jezioro Mierucie (Tabela nr 50), Jezioro Borowiec (Wildno) (Tabela nr 52), Jezioro Ostrowickie (Tabela nr 53), Jezioro Huta (Tabela nr 57), Jezioro Skrwilno (Tabela nr 58), Zbiornik Niewiadoma (Tabela nr 59), Glinianki Borowe (Tabela nr 60), Jezioro Głęboć (na cieku bez nazwy) (Tabela nr 61), Glinianka Włochy (Tabela nr 63), Jezioro Telążyna (Tabela nr 64), Jezioro Bytoń (Tabela nr 66), Jezioro Lubiechowo (Tabela nr 67), Jezioro Czarne Gostynińskie (Tabela nr 69), Jezioro Chojno (Tabela nr 70), Jezioro Czarne Włocławskie (Tabela nr 71), Jezioro Karaśnia (Tabela nr 72), Jezioro Kępka Szlachecka (Tabela nr 74), Staw Montoprzem (Tabela nr 75), Kocioł (Tabela nr 76), Jezioro Łuba (Tabela nr 78), Basen Kolejniak (Tabela nr 79), Jezioro Świesz (Tabela nr 80), Jezioro Czarno-Czerskie (Tabela nr 81), Jezioro Białobrzegi (Tabela nr 83), Jezioro Brzeźno (Tabela nr 85), Jezioro Okonin (Tabela nr 88), Jezioro Czarne Baruchowo (Tabela nr 89), Jezioro Służewo (Tabela nr 91), Jezioro Szczutkowskie (Tabela nr 92), Jezioro Rybnica (Tabela nr 93), Jezioro Radziszewo (Tabela nr 94), Sierpianica (Tabela nr 96), Jezioro Peł (Tabela nr 98), Glinianki Szczęśliwickie (Tabela nr 100), Jezioro Czerskie (Tabela nr 101), Jezioro Radzynek (Paprotki) (Tabela nr 102), Staw Kocioł Wincenta (Tabela nr 104), Jezioro Łąki Zawistowe (Tabela nr 106), Staw Wielgie (Tabela nr 109), Basen Brwinów (Tabela nr 111), Jezioro Kamionkowskie (Tabela nr 113), Jezioro Widoń (Tabela nr 114), Wymysłów (Tabela nr 116), Jezioro Trzebowo (Tabela nr 117), Staw Ruda (Tabela nr 121), Zbiornik Rogal (Tabela nr 122), Glinianka Bagienice (Tabela nr 125), Jezioro Czerniakowskie (Tabela nr 126), Stawy Skaryszewskie (Tabela nr 127), Łacha Nowomiejska Józefów (Tabela nr 128).	38

III. PODSUMOWANIE 39

IV. TABELE..... 40

WPROWADZENIE

Po zakończeniu sezonu wędkarskiego 2018, do analizy otrzymano prawidłowo wypełnione rejestry z danymi o odłowach wędkarskich uzyskanych przez badanych wędkarzy w następujących obwodach rybackich, użytkowanych przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego:

- **Wisła Nr 3** – odcinek od ujścia rzeki Pilica do ujścia rzeki Narew, jezioro Czerskie, jezioro Gocławskie, jezioro Kamionkowskie, jezioro Rokola, jeziora Wilanowskie, Stawy Skaryszewskie, jezioro Łacha Nowowiejska (Józefów k/Otwocka);
- **Wisła Nr 4** – odcinek od ujścia rzeki Narew do ujścia rzeki Motława;
- **Narew Nr 6** – odcinek od ujścia rzeki Szkwa do ujścia rzeki Orzyc, jezioro Sieluńskie, starorzecze Zimna Woda;
- **Narew Nr 7** – Zbiornik Zegrzyński, rzeka Narew od ujścia rzeki Orzyc, rzeka Bug od ujścia rzeki Liwiec, Kanał Żerański, jezioro Stawinoga, rzeka Prut;
- **Narew Nr 8** – odcinek od czoła zapory zbiornika Zegrzyńskiego do ujścia do rzeki Wisła;
- **Bug Nr 5** – rzeka Bug na odcinku od ujścia rzeki Nurzec do ujścia rzeki Liwiec oraz zbiorniki Sterdyn i Niewiadoma
- **Brok Nr 1** – rzeka Brok od źródeł do ujścia do rzeki Bug;
- **Omulew Nr 1** – rzeka Omulew od wypływu z jeziora Omulew do ujścia do rzeki Narew oraz rzeka Sawica, rzeka Czarka, rzeka Wałpusza, rzeka Lelkowska Struga;
- **Orzyc Nr 1** – rzeka Orzyc od jej źródeł do ujścia do rzeki Narew;
- **Orz Nr 1** – rzeka Orz od źródeł do ujścia do rzeki Narew;
- **Rozoga Nr 1** – rzeka Rozoga od wypływu z jeziora Marksoby do ujścia do rzeki Narew, kanał Wach;
- **Szkwa Nr 1** – rzeka Szkwa od mostu w miejscowości Rozogi do ujścia do rzeki Narew, rzeka Rozoga od wypływu z jeziora Świętajno do mostu w miejscowości Rozogi;
- **Jeziorka Nr 1** – rzeka Jeziorka od źródeł do ujścia do rzeki Wisła, rzeka Kraska oraz zbiorniki Głuchów i Osieczek;
- **Świder Nr 1** – rzeka Świder od źródeł do ujścia do rzeki Wisła;
- **Rządza Nr 1** – rzeka Rządza od źródeł do ujścia do zbiornika Zegrzyńskiego;
- **Utrata Nr 1** – rzeka Utrata od źródeł do ujścia do rzeki Bzura oraz rzeka Rokitnica;
- **Nurzec Nr 1** – rzeka Nurzec od źródeł do ujścia do rzeki Bug;
- **Ełk Nr 45** – rzeka Ełk na odcinku od jazu piętrzącego elektrowni w miejscowości Nowa Wieś Ełcka do granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego (BNP), Kanał Kuwasy na odcinku od osi

podłużnej mostu w miejscowości Czarna Wieś do rzeki Ełk, Kanał Rudzki na odcinku od rzeki Ełk do granicy BNP;

- **Biebrza Nr 3 (Wissa)** – rzeka Kosodka (Golda) na odcinku od źródeł do granicy BPN, rzeka Klimaszewnica na odcinku od źródeł do granicy BPN, rzeka Wissa na odcinku od źródeł do granicy BPN (m. Łoje Awissa);
- **Jęgrznia Nr 11** – rzeka Jęgrznia na odcinku od ujścia cieką Zgniłka do granicy BPN;
- **Skrwa Prawa Nr 1** - rzeka Skrwa Prawa od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki. Uwaga: Rezerwaty przyrody „Sikórz” i „Brudzeńskie Jary” w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym zakaz połowu ryb na rzece Skrwa Prawa od miejscowości Sikórz do piętrzenia w miejscowości Radotki;
- **Zgłowiączka Nr 2** - rzeki Zgłowiączka na odcinku od przekroju poprzecznego w odległości 100 m od wypływu z jeziora Rybiny do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, rzeka Chodeczka na odcinku od 50 m poniżej wypływu z jeziora Krukowskie do ujścia do rzeki Zgłowiączka, rzeka Lubieńka na odcinku od 30 m od jej wypływu z jeziora Kaczawka do jej ujścia do rzeki Zgłowiączka wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki, z wyłączeniem jezior oraz z wyłączeniem odcinka rzeki Rakutówka od źródeł do wypływu z jeziora Rakutowskie;
- **Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5** - Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od ujścia rzeki Motława do granicy regionu wodnego Środkowej Wisły i regionu wodnego Dolnej Wisły stanowiącej linię prostopadłą do przeciwnego brzegu w 684+000 km biegu rzeki Wisła, wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Motława, Skrwa Lewa, Skrwa Prawa, Zgłowiączka, Ruda, Zuzanka, Rybniczanka, Wierzniczka, Bętlewianka i Chemiczka;
- **Moltawa nr 1** - Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Moltawa od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła;
- **Bzura nr 1** - Obwód rybacki obejmuje wody: rzeki Bzura na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Ochnia oraz wody rzeki Ochnia;
- **Tążyna** - Obwód rybacki obejmuje wody: rzeki Tążyna w górnym biegu zwanej Kanał Parchański, z wodami jej dopływów, od źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Służewo.

Oprócz tego, wędkarze zarejestrowali odłowy w innych wodach niebędących składnikami ww. obwodów rybackich. Były to wody:

– jeziora użytkowane przez Zakład Rybacki Janowo:

- **Borówko, Brajnickie, Burdąg, Fręcki, Głębozec** (w obw. J. Rekowe), **Grom, Jasne, Klimek** (Konik), **Lemańskie, Łąznica, Machniacz, Malszeweckie, Malszewskie, Świętajno** (Narty), **Natać, Płociczno, Rekowe, Sasek Wielki, Sasek Mały, Sędańskie, Średnie, Wałpusz, Warchaldzkie, Zielonka, Nożyce** – w zlewni rzeki Szkwa nr 3, **Piasutno** (w obw. Rzeki Szkwa nr 4), **Staw Kobylucha** – m. Szczytno;

– oraz pozostałe wody Okręgu Mazowieckiego PZW:

- jeziora: **Białe** – gm. Gostynin, **Białobrzegi** – gm. Bodzanów, **Borowiec (Wildno)** – na cieku Struga Wilenica, gm. Lipno, **Brzeźno** – gm. Koneck, **Bytoń** – gm. Bytoń, **Chojno** – gm. Chrostkowo, **Ciechomickie** – gm. Łąck, **Czarno-Czerskie** – gm. Wielgie, **Głębozec** (na cieku bez nazwy – gm. Brzuze), **Górskie** – gm. Łąck, **Grójeckie** – gm. Boniewo, **Huta** – gm. Rypin, **Karaśnia** – gm. Izbica Kuj., **Kępka Szlachecka** – gm. Kowal, **Lubiechowo** – gm. Kowal, **Lutoborskie** – gm. Chocień, **Łąki Zawistowe** – gm. Boniewo, **Łuba** – gm. Włocławek, **Ługowskie** (w zlewni rzeki Chodeczka nr 5) – gm. Chocień, **Mierucie** – m. Grajewo, **Okonin** – gm. Brzuze, **Ostrowickie** – gm. Brzuze, **Peł** – gm. Chrostkowo, **Plebanka** (Ostrowąs) – gm. Aleksandrów Kuj., **Pomocnia** – m. Błędowo k/Pomiechówka, **Przytomne** – gm. Gostynin, **Rybnica** – gm. Włocławek, **Skrwilno** – gm. Skrwilno, **Skrzyneckie** – gm. Baruchowo, **Szczutkowskie** – gm. Chocień, **Świesz** – gm. Bytoń, **Telażyna** – gm. Włocławek, **Toczyłowo** w zlewni rzeki Ełk nr 43 – gm. Grajewo, **Widoń** – gm. Włocławek, **Wikaryjskie** – gm. Włocławek, **Zdworskie** – gm. Łąck;
- rzeka: **Sierpienica** – dopływ Skrwy Prawej;
- gliniarki: **Bagienice** – gm. Chorzele, **Błonie** – m. Błonie, **Borowe** – gm. Zaręby Kościelne, **Golków, Głoków, Zalesie** – miejscowość Piaseczno, **Grodzisk** – m. Grodzisk Mazowiecki, **Szczęśliwickie** – m. Warszawa Ochota, **Włochy** – Warszawa Włochy, **Zielonka** – m. Zielonka k/Wołomina);
- stawy: **Jedwabne** – m. Jedwabne, **Koziół Wincenta** – gm. Kolno, **Krzywie** – gm. Zgierz, **Młyński Staw** – gm. Koronowo, **Ruda** – Nadleśnictwo Ruda pow. Włocławek, **Wielgie** – gm. Wielgie, **W Parku Pruszków** – gm. Pruszków, **Talar i Montoprzem** – gm. Dobroń, **Wymysłów** – gm. Dobroń;
- inne zbiorniki: **Basen Brwinów** – m. Brwinów, **Basen Kolejniak** – m. Sulejówek, **Chorzele** – gm. Chorzele, **Czarne Baruchowo** – gm. Baruchowo, **Czarne Gostynińskie** – gm. Gostynin, **Czarne Włocławskie** – gm. Włocławek, **Jeziorko Czerniakowskie** – m. Warszawa Mokotów, **Jeziorko Moczydło** – m. Karczew, **Kocioł** – gm. Gostynin, **Skoki I** – gm. Włocławek, **Służewo** –

gm. Aleksandrów Kuj., **Radziszewo** – gm. Baruchowo, **Radzynek** (Paproty) – gm. Brzuze, **Rogal** – m. Nowe Ostrowy, **Trzebowo** – gm. Baruchowo, **Zalew w Makowie Mazowieckim** – m. Maków Mazowiecki.

Wszystkie dane zawarte w kwestionariuszach ankietowych zostały wprowadzone do bazy danych komputera, a następnie poddane stosownym analizom, których wyniki przedstawione są w niniejszym opracowaniu.

W metodyce badań przyjęto, że dla wiarygodnego opracowania wyników odłowu niezbędne jest dysponowanie zbiorem danych, reprezentujących, co najmniej 3% całej populacji 72091 wędkarzy, członków Okręgu Mazowieckiego w 2018 roku. Zwrócono 54740 rejestrów, z czego 6643 zostało poddanych analizie, w tym 6621 zawierało dane o uzyskanych odłowach, co stanowiło 9,18% ogólnej liczby członków tego okręgu.

I. Dane ogólne

1. Odłowy całkowite – wyniki wędkarzy Mazowieckiego Okręgu PZW (Tabela nr I)

Na 1 wędkarza średnio przypadało 10,97 dni wędkowania w ciągu całego roku, natomiast średni roczny odłów wyniósł 6,69 kg, co daje całkowity zarejestrowany odłów w wysokości 44304 kg ryb. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego osiągnął poziom 0,61 kg.

W odłowach wędkarskich wystąpiło ponad 26 gatunków ryb, z czego trzy w zdecydowanie największych ilościach: leszcz (39,3%), płoć (14,1%) i szczupak (12,4%).

W następnych rozdziałach opracowania, podobnie jak w poprzednich opracowaniach, skupimy się głównie na wynikach dotyczących wszystkich obwodów rybackich wymienionych we „Wprowadzeniu”, następnie jezior będących w gestii Zakładu Rybackiego Janowo i pozostałych łowisk okręgu, gdzie całkowity zarejestrowany odłów był wyższy niż 100 kg.

II. Łowiska wędkarskie


1. Obwody rybackie

1.1. Obwód rybacki Narew Nr 7 (Tabela nr 1, Rys. 1)

Przedstawione poniżej wyniki dotyczą całego obwodu rybackiego Narew Nr 7, w skład którego wchodzi głównie Zbiornik Zegrzyński, ale także dolne odcinki rzek Bug i Narew, jezioro Stawinoga oraz Kanał Żerański i rzeka Prut. W wodach całego obwodu Narew Nr 7 zarejestrowało połowy 1497 wędkarzy. Globalny odłów osiągnął 13675 kg ryb, na 1 wędkującego przypadało średnio 13,78 dni wędkowania w ciągu roku, 9,14 kg złowionych ryb, oraz dzienny odłów w wysokości 0,66 kg.

W odłowach z całego obwodu Narew Nr 7 wystąpiło ponad 21 gatunków ryb, co dość dobrze świadczy o bioróżnorodności występującego w wodach obwodu pogłowia ryb (Rys. 1).

Z wyróżnionych grup gatunków, najliczniejsze były mniej cenne karpiowate – leszcz, płoć i krap, stanowiące odpowiednio 54,7%, 6,8% i 3,8% (łącznie 65,2%), ale – tak jak w poprzednim sezonie – liczną grupą były także podstawowe gatunki drapieżne (łącznie 26,9%), a więc szczupak (11,9%), sum (4,9%), okoń (4,8%), sandacz (4,6%) oraz boleń (0,7%). 4,8% odłowów stanowił lin, karp 1,1%, a udziały pozostałych gatunków nie przekraczały 1%. Sytuacja powyższa świadczy o korzystnych relacjach między gatunkami drapieżnymi a karpiowatymi występującymi w wodach obwodu. Nieznaczne ilości gatunków reofilnych w odłowach wędkarskich wynikają z faktu, że przeważająca część odłowów była rejestrowana w Zbiorniku Zegrzyńskim i Kanale Żerańskim, a więc praktycznie w stagnujących partiach obwodu rybackiego Narew Nr 7. Ich niewielki udział nie przekreśla jednak faktu, że warunki wędkowania panujące w 2018 roku w tych wodach należy ocenić jako korzystne. Wypada stwierdzić za raportem z roku ubiegłego, że pomimo wysokiego poziomu troficznego Zbiornika Zegrzyńskiego, czego wyrazem jest przewaga mniej cennych gatunków karpiowatych w pogłowiu ryb, umiejętnie prowadzona polityka zarybieniowa, a także odpowiednio sterowana eksploatacja narzędziami rybackimi, pozwalają utrzymać pogłowie ryb we względnej równowadze, a także zapewnić relatywnie wysokie walory wędkarskie wód wchodzących w skład obwodu rybackiego rzeki Narew Nr 7.




Rys. 1. Narew nr 7 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 13 675 kg)

1.2. Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5 (Tabela nr 2, Rys. 2)

W roku 2018 w obwodzie rzeki Wisły Nr 5 w Zbiorniku Włocławskim zarejestrowało swoje połowy 515 wędkarzy spędzając na łowisku średnio 13,75 dni. Sumaryczny odłów wyniósł 4931 kg ryb, średni roczny odłów na 1 wędkującego 9,57 kg, a średni odłów dzienny na poziomie 0,70 kg.

Na atrakcyjną strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się ponad 16 gatunków ryb (Rys. 2). W grupie drapieżników na pierwszym miejscu był, jak i przed rokiem sum (19,3%) o średniej masie osobniczej 8,28 kg, a towarzyszyły mu szczupak (9,6%), sandacz (7,1%), boleń (2,7%) i

okoń (1,9%), co wraz z pojedynczo zanotowanymi egzemplarzami węgorza łącznie dało 40,7-procentowy udział tej grupy w odłowach. W grupie karpiovatych leszcz stanowił 35,9%, płoć prawie 3%, karaś srebrzysty 8,8%, krap 1,6%, a cenniejsze karpiovate reprezentował średnio 2,08-kilogramowy karp z odsetkiem 7,9%. Cenne gatunki uzupełniały pojedyncze sztuki reofilnych karpiovatych, a udziały pozostałych gatunków nie przekraczały 1%. Była to atrakcyjna struktura gatunkowa wśród opisywanych łowisk.




Rys. 2. Zbiornik Włocławski - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 4 931 kg)

1.3. Obwód rybacki Wisła Nr 3 (Tabela nr 3, Rys. 3)

W roku 2018 w wodach obwodu rybackiego Wisła Nr 3 zarejestrowało połowy 713 wędkarzy, którzy złowili ogółem 3286 kg ryb, średni roczny odłów uzyskany przez 1 wędkującego wyniósł 4,61 kg, przy 11,25 dniach wędkowania i średnim dziennym odłowem na 1 wędkarza wynoszącym 0,41 kg.

W odłowach odnotowano ponad 22 gatunki ryb, wśród których średnio 0,97-kilogramowy leszcz stanowił 49% masy wszystkich złowionych w omawianym obwodzie ryb (Rys. 3). Łącznie z krapiem (9,5%) i płocią (5,5%) stanowił 63,9%. Łączny udział drapieźników wynosił 22,6%, w tym poza rzadko łowionym węgorzem – szczupak był obecny w 7,6%, sum 6,5%, sandacz 4%, boleń 2,5% i okoń 2%. Udziały reofilnych gatunków karpiovatych były zauważalne w całkowitym odłowem i wynosiły: certy 2,8%, klenia 1,7%, jazia 0,4%, świnki (0,3%) i średnio 2,07-kilogramowej brzany 0,2%. Z innych gatunków warto wymienić karpia (3,2%) i karasia srebrzystego (2,6%), natomiast pozostałe gatunki występowały w odłowach w niewielkich ilościach.




Rys. 3. Wisła nr 3 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 3 286 kg)

1.4. Obwód rybacki Narew Nr 8 (Tabela nr 4, Rys. 4)

W roku 2018 w wodach obwodu rybackiego rzeki Narew Nr 8 swoje połowy zarejestrowało 355 wędkarzy, łowiących ogółem 3042 kg ryb. Średnio na 1 wędkarza przypadało 9,79 dni wędkowania oraz roczny odłów 8,57 kg ryb, co daje wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego na poziomie 0,88 kg.

W odłowach zarejestrowanych w obwodzie Narew Nr 8 łączny udział drapieżników wyniósł jedynie 18,2%, natomiast łączny odsetek mniej cennych karpiovatych wyniósł około 79,1%. W grupie drapieżników poza szczupakiem (7,8%) okoń, sum, sandacz i boleń stanowiły odpowiednio 4,5%, 3,4%, 1,5% i 1%, a węgorze występowały w odłowach, jako pojedyncze sztuki. Wśród mniej cennych karpiovatych, poza 71,4% udziałem dość atrakcyjnego leszcza (średnia masa 1,31 kg), odsetki płoci i krapia wynosiły odpowiednio 4,1% i 3,7% (Rys. 4). Z innych gatunków udział żadnego nie przekroczył 1%.




Rys. 4. Narew nr 8 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 3 042 kg)

1.5. Obwód rybacki Narew Nr 6 (Tabela nr 5, Rys. 5)

W wodach tego obwodu rybackiego w roku 2018 swoje połowy zarejestrowało 431 wędkarzy, a ogólny odłów wyniósł 2716 kg ryb. Przeciętnie na 1 wędkującego przypadało nieco ponad dwa tygodnie wędkowania i odłów roczny w wysokości 6,30 kg ryb, co daje wskaźnik średniego dziennego odłowu na poziomie 0,44 kg.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 17 gatunków ryb, wśród których w większości łowiono mniej cenne karpowate – leszcza, płoć i krapia (Rys. 5), łącznie stanowiące 53,3%, przy czym leszcz stanowił 34,7%, a jego średnia masa osobnicza wynosiła 1,18 kg; płoć stanowiła 11,5%, a krap 7,2%. Jeżeli chodzi o gatunki drapieżne, to stanowiły one odpowiednio: szczupak 23%, okoń 5,3%, sum 4,4%, a boleń, sandacz i miętus to pojedynczo odnotowane sztuki. Ich łączny udział osiągnął 34,1% i był tym samym nieco wyższy od poprzedniego sezonu. Udział lina o średniej masie osobniczej 1,02 kg wynosił 6,6%. Z pozostałych gatunków warto zauważyć klenia, który stanowił 1,9%, karasia srebrzystego (1,8%), karasia pospolitego (1,3%) oraz kilka sztuk karpia (0,4%) o średniej masie pojedynczego osobnika 1,50 kg, co podnosiło bioróżnorodność tego odcinka rzeki Narew i jego walory czysto wędkarskie.

W sumie, tak jak przed rokiem, warunki wędkowania w wodach obwodu Narew Nr 6 były dość korzystne z racji obecności dużych leszczy oraz gatunków drapieżnych, a zwłaszcza szczupaka (średnia masa 1,62 kg), suma (średnia masa 8,44 kg) i bolenia (średnia masa 1,92 kg). Obwód rzeki Narew Nr 6 należał do dość interesujących łowisk Mazowieckiego Okręgu PZW.




Rys. 5. Narew nr 6 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 2 716 kg)

1.6. Obwód rybacki Bug Nr 5 (Tabela nr 6, Rys. 6)

W 2018 roku swoje połowy w wodach obwodu rybackiego rzeki Bug Nr 5 zarejestrowało 372 wędkarzy, którzy złowili ogółem 2194 kg ryb, średnio na 1 wędkarza przypadało 13,10 dni wędkowania. Średni roczny odłów wyniósł 5,90 kg ryb, co daje wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego na poziomie 0,45 kg.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło ponad 16 gatunków ryb. Łączny udział leszcza, krapia i płoci wynosił 55,3% (Rys. 6), przy czym najczęściej łowiono średnio 0,71-kilogramowego leszcza (29,6%), następnie nieco mniej krapia (16,8%) i płoci (8,9%). W grupie gatunków drapieżnych wyróżnić należy średnio 1,58-kilogramowego szczupaka z udziałem 19,8%, a następnie towarzyszące mu: suma (7,3%), okonia (3,4%), sandacza (2,6%) i bolenia (0,8%). Karpiovate reofilne reprezentował kleń z udziałem 2,2%. Ponadto, należy wymienić lina (3,4%), karpia (2,3%) oraz karasie: srebrzystego i pospolitego, które stanowiły po 1,2% każdy. W sumie warunki wędkowania w obwodzie rybackim Bug Nr 5 można uznać za dość korzystne.




Rys. 6. Bug nr 5 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 2 194 kg)

1.7. Obwód rybacki Wisła Nr 4 (Tabela nr 7, Rys. 7)

W roku 2018 w obwodzie Wisły Nr 4 rejestry wypełniło 231 wędkarzy, którzy pojedynczo łowili średnio 0,77 kg ryb na dzień, co dało całkowity zarejestrowany odłów na poziomie 1771 kg ryb. Na każdego z wędkarzy przypadało średnio 9,97 dni wędkowania, a rocznie łowili średnio 7,67 kg ryb.

W zarejestrowanych odłowach wędkarskich wystąpiło ponad 16 gatunków ryb (Rys. 7), z których przeważającą (64,3%) grupą były mniej cenne karpiovate – i identycznie jak w badaniach z lat 2005-2017, zwraca uwagę wysoka średnia masa złowionych osobników leszcza, wynosząca 1,28 kg z udziałem tego gatunku równym 55,1%. W grupie tej zanotowano także płoc (5,4%) i krapia (3,9%). Grupa gatunków drapieżnych, stanowiąca w przeciwstawie łącznie prawie 30%, reprezentowana była głównie przez dwa gatunki: średnio 8,55-kilogramowego suma z udziałem 12,6% oraz średnio 3,18-kilogramowego sandacza z udziałem 8,6%. Kolejne miejsca zajęły: szczupak (5,5%), okon (2,6%), oraz pojedyncze sztuki średnio 2,62-kilogramowego bolenia (0,7%).

Z pozostałych gatunków warto zauważyć karasia srebrzystego, który stanowił 2,7%, oraz rzadziej notowanego klenia, jazia oraz kilka sztuk karpia (0,7%) o atrakcyjnej średniej masie pojedynczego osobnika 2,40 kg.




Rys. 7. Wisła nr 4 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 1 771 kg)

1.8. Obwód rybacki Skrwa Prawa Nr 1 (Tabela nr 8, Rys. 8)

W sezonie 2018 w łowisku tym zarejestrowało swoje połowy 190 wędkarzy, całkowity odłów wyniósł 1450 kg ryb. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego osiągnął 1,40 kg, rocznie 7,63 kg, a statystyczny wędkarz spędzał na łowisku średnio 5,47 dnia.

W odłowach wędkarskich wystąpiło 7 gatunków ryb (Rys. 8), z których cały zanotowany odłów zdecydowanie zdominowała płoć z udziałem 94,2%. Przy takiej przewadze można wspomnieć jedynie o 3,7% szczupaka, natomiast udziały innych gatunków nie przekraczały 1%. Należy jedynie dodać, iż z pozostałych gatunków zanotowano okonie i leszcze oraz pojedynczo klenie, jazie i liny. Strukturę gatunkową odłowów wędkarskich należy określić, jako bardzo monotonną.




Rys. 8. Skrwa Prawa nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 1 450 kg)

1.9. Obwód rybacki Orzyc Nr 1 (Tabela nr 11, Rys. 9)

W sezonie 2018 w łowisku tym zarejestrowało swoje połowy 73 wędkarzy. Całkowity odłów wyniósł 502,9 kg ryb. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego osiągnął 0,66 kg, rocznie 6,89 kg, a wędkarz spędzał na łowisku średnio 10,48 dnia.

W odłowach wędkarskich wystąpiło 16 gatunków ryb (Rys. 9). Grupa drapieżników (łącznie 31,5%) reprezentowana była głównie przez szczupaka o średniej masie osobniczej 1,64 kg stanowiącego 13,3%, w towarzystwie okonia z udziałem 12,7%, sandacza (5,4%) oraz jedyne go egzemplarza bolenia. Grupa mniej cennych karpiowatych (płoc, leszcz i krap) stanowiła łącznie 37,6%, z przewagą płoci z udziałem 31,5% oraz udziałami leszcza (6,1%) i krapia (0,1%). W połowach odnotowano 6,1% średnio 0,81-kilogramowego klenia oraz 2,6% średnio 0,76-kilogramowego jazia. Wśród pozostałych gatunków warto wymienić karpia z udziałem 11,2%, lina z odsetkiem 7,1%, a także karaś srebrzysty (2,4%). Udziały pozostałych gatunków nie przekraczały 1%.




Rys. 9. Orzyc nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 502,9 kg)

1.10. Obwód rybacki Bzura Nr 1 (Tabela nr 12, Rys. 10)

W obwodzie rybackim rzeki Bzura Nr 1 w 2018 roku 60 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 424,0 kg ryb, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 7,07 kg i 0,39 kg. Średnio wędkarz spędził nad wodami omawianego obwołu 18,13 dnia.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano ponad 15 taksonów ryb (Rys. 10). Drapieżniki stanowiły łącznie jedynie 14,2% wszystkich zarejestrowanych ryb. Zdecydowanie najczęściej łowiono szczupaka – 8,5%, któremu towarzyszyły sandacz (2,2%), okoń (1,9%), a rzadziej boleń (1,4%) i węgorz. Grupa gatunków karpiowatych to łącznie 47,9%. Leszcz stanowił 38,3%, płoc 9,4%, a pojedynczo zanotowano wzdręgę i krapia. Karp o średniej masie osobniczej 2,16 kg stanowił 14,8%, lin 14,5%, karaś srebrzysty 4,8%, a amur 3%. Gatunki reofilne odnotowano sporadycznie. W sumie warunki wędkowania w obwodzie rybackim Bzura Nr 1 w roku 2018 można uznać za dość ciekawe.




Rys. 10. Bzura nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 424,0 kg)

1.11. Obwód rybacki Rozoga Nr 1 (Tabela nr 14, Rys. 11)

W wodach tego łowiska swoje połowy zarejestrowało 98 wędkarzy, całkowity odłów wyniósł 399,1 kg ryb, a wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkarza 0,46 kg, co daje średnio 4,07 kg na 1 wędkującego rocznie, przy spędzonych średnio 8,77 dniach nad wodą.

W odłowach wystąpiło 9 gatunków ryb (Rys. 11), z których grupa mniej cennych karpiowatych stanowiła łącznie 59,2% (w tym leszcza 43,8%, płoci 15,1% i kilka sztuk krapia). Wśród drapieźników łącznie stanowiących 19,6% przeważał szczupak z odsetkiem 13,1%, a towarzyszyły mu jedynie okoń stanowiący 3,3% i sandacz z udziałem 3,2%. Ponadto, zanotowano zauważalny odsetek karpia (5,2%) o średniej masie osobniczej 2,96 kg. Z innych łowionych gatunków należy wymienić lina z udziałem 14,2% oraz karasia pospolitego (1,8%).




Rys. 11. Rozoga nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 399,1 kg)

1.12. Obwód rybacki Rządza Nr 1 (Tabela nr 19, Rys. 12)

W obwodzie rybackim Rządza Nr 1 wędkowało 131 wędkarzy, a sumaryczny odłów ryb wyniósł 305,3 kg ryb, co daje średni roczny i dzienny odłów na 1 wędkarza na poziomie odpowiednio 2,33 kg i 0,52 kg, przy 4,47 dniach spędzonych nad wodą w ciągu roku przez pojedynczego wędkarza.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 14 gatunków ryb (Rys. 12). Łączny udział czterech zanotowanych gatunków drapieżnych wynosił 24,3%, przy czym średnio 1,53-kilogramowy szczupak stanowił 13%, okoń 9,6%, a bolenia i sandacza odnotowano jako pojedyncze egzemplarze. Mniej cenne gatunki karpowate łącznie stanowiły 36,3%, przy czym płoć 18,7%, leszcz 12,9%, wzdregą 3,9%, a krap 0,8%. Z pozostałych złowionych gatunków niewątpliwą atrakcją łowiska był ponownie lin (37,2%) o średniej masie 1,12 kg. Zanotowano także 1,2% karpia oraz pojedyncze sztuki jazia, klenia i karasia srebrzystego. Przedstawione wyniki wskazują, że stan ichtiofauny i warunki wędkowania w wodach tego obwodu rybackiego były stosunkowo korzystne.




Rys. 12. Rządza nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 305,3 kg)

1.13. Obwód rybacki Ełk Nr 45 (Tabela nr 24, Rys. 13)

W roku 2018 w omawianym obwodzie rybackim rzeki Ełk Nr 45 swoje połowy zarejestrowało 32 wędkarzy, a całkowity odłów wyniósł 186,4 kg ryb, co daje średnio 5,83 kg na 1 wędkującego rocznie i 1,14 kg w 1 dniu wędkowania, przy spędzonych średnio 5,09 dniach nad wodą.

W odłowach wystąpiło 8 gatunków ryb (Rys. 13). Przeważały drapieżniki (łącznie 58,5%) reprezentowane przez średnio 1,54-kilogramowego szczupaka, który stanowił 40,4% oraz okonia z udziałem 18,1%. Mniej cenne karpowate – głównie płoć z udziałem 23,8%, leszcz 8,2% oraz pozostałe drobne gatunki (krap) – stanowiły łącznie 32,4%. Grupę reofilnych reprezentowały: średnio 1,08-kilogramowy kleń (6,9%) i jedna sztuka 1-kilogramowego jazia. Z odnotowanych pozostałych gatunków wymienić należy jedynie dwie sztuki lina (1,6%).




Rys. 13. Elk nr 45 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 186,4 kg)

1.14. Obwód rybacki Nurzec Nr 1 (Tabela nr 25, Rys. 14)

W roku 2018 w obwodzie Nurzec Nr 1 zarejestrowało swoje połowy 57 wędkarzy spędzając nad wodą średnio 9,47 dni, a sumaryczny odłów osiągnął 182,7 kg ryb, przy średnim rocznym odłowieniu na 1 wędkującego 3,21 kg i odłowieniu dziennym na poziomie 0,34 kg.

Na dość atrakcyjną strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 9 gatunków ryb (Rys. 14). Grupa mniej cennych karpiowatych (płoć, leszcz, krap i ukleja) stanowiła łącznie 48%, w tym z 23,5% udziałem płoci, 20,1% leszcza, 3,3% ukleja oraz 1,2% krapia. Wśród drapieżników (łącznie 31,1%) przeważał średnio 1,62-kilogramowy szczupak stanowiący 22,1%, a towarzyszył mu jedynie okoń z udziałem 9%. W połowach odnotowano także lina (8,9%), karpia (6,1%) oraz jazia (6%).




Rys. 14. Nurzec nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 182,7 kg)

1.15. Obwód rybacki Jezioroka Nr 1 (Tabela nr 31, Rys. 15)

W łowisku tym zarejestrowało swoje połowy 47 wędkarzy, a sumaryczny odłów wyniósł 145,8 kg ryb, co daje średnio 3,10 kg na 1 wędkarza rocznie i 0,39 kg w jednym dniu wędkowania.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 11 gatunków ryb, a strukturę gatunkową tych odłowów przedstawiono na Rys. 15. Znaczącą część odłowów (łącznie 46,4%) stanowiły mniej cenne karpowate, a w tym płoć 27,3%, leszcz 9,7%, oraz krap (5,8%) i wzdręga (3,6%). W grupie drapieżników (łącznie 35,9%) średnio 1,57-kilogramowy szczupak stanowił 16,2%, sandacz 11,1%, a okoń 8,6% masy zarejestrowanych ryb. Gatunki reofilne reprezentowane były przez klenia (4,5%) i jazia (2,1%) i. Ponadto, odnotowano 8,6% karasia srebrzystego i kilka sztuk lina (2,5%). Jeziorokę w omawianym obwodzie można określić, jako rzekę atrakcyjną dla wędkujących.




Rys. 15. Jezioroka nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 145,8 kg)

1.16. Obwód rybacki Omulew Nr 1 (Tabela nr 44, Rys. 16)

W obwodzie rybackim rzeki Omulew Nr 1 w roku 2018 parametry wędkowania były następujące: swoje połowy zarejestrowało 31 wędkarzy, łowiących w sumie 110,0 kg ryb przez średnio 6,10 dnia w roku. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkarza wyniósł 0,58 kg.

W odłowach wystąpiło 9 gatunków ryb (Rys. 16). Grupa mniej cennych gatunków karpowatych (płoć, leszcz i krap) łącznie stanowiła 36,8%, przy czym płoć 31%, leszcz 5,5%, a krap 0,4%. Gatunki reofilne łącznie stanowiły 14,5% i reprezentowane były przez średnio 1,01-kilogramowego jazia z odsetkiem 10,1% oraz klenia z udziałem 4,4%. Grupę drapieżników (łącznie 32,4%) reprezentowały dwa gatunki – szczupak z udziałem 17,1% i okoń stanowiący 15,3%. Wymienione trzy grupy gatunków uzupełniane były przez występujące w nieco mniejszych ilościach karasie pospolite (15%) i liny (1,4%). Struktura pozostała zbliżona w porównaniu do dwóch poprzednich sezonów 2016 i 2017.




Rys. 16. Omulew nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 110,0 kg)

1.17. Obwód rybacki Brok Nr 1 (Tabela nr 48, Rys. 17)

W 2018 roku w łowisku tym zarejestrowało swoje połowy 46 wędkarzy. Całkowity odłów osiągnął 81,9 kg ryb. Średni roczny odłów na 1 wędkującego wyniósł 1,78 kg, a średni odłów dzienny osiągnął poziom 0,29 kg, w ciągu średnio 6,22 dni spędzonych nad wodą w ciągu roku.

W odłowach zanotowano 9 gatunków ryb (Rys. 17). W omawianym sezonie w równowadze pozostawały dwie znaczące grupy: mniej cenne karpowate (płoc i leszcz) stanowiące łącznie 44,1%, przy czym udział płoci wynosił 40,3% a leszcza 3,8% oraz drapieżniki (szczupak i okoń) stanowiące łącznie 44,9% wszystkich zarejestrowanych ryb, z czego 24,2% przypadało na okonia, a 20,8% na szczupaka. Ponadto, zanotowano 6,1% jazia, 1,8% lina, karasie obu gatunków (z udziałami po 1,2% każdy) oraz pojedyncze sztuki klenia.




Rys. 17. Brok nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 81,9 kg)

1.18. Obwód rybacki Utrata Nr 1 (Tabela nr 55, Rys. 18)

W obwodzie rybackim rzeki Utrata Nr 1 swoje połowy zarejestrowało 47 wędkarzy, łowiących w sumie 68,6 kg ryb, co daje średnio 1,46 kg na 1 wędkującego rocznie i jedynie 0,24 kg w 1 dniu wędkowania, przy spędzonych średnio 6,11 dniach nad wodą.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 8 gatunków ryb, wśród których można wyróżnić 3 uzupełniające się grupy. Największym udziałem charakteryzowały się drapieżniki, których łączny udział osiągnął 33,7%, a w tym szczupak 18,4%, okoń 10,9% i sum 4,4%. Mniej cenne karpowate – płoć, leszcz i krap (Rys. 18) łącznie stanowiły 32,2%, przy czym płoć 17,2%, a leszcz 14,6%. Udział reprezentanta trzeciej grupy – karasia srebrzystego wynosił 30,2%. Z pozostałych gatunków zanotowano jedynie 3 sztuki lina (3,9%).



Rys. 18. Utrata nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 68,6 kg)

1.19. Obwód rybacki Jegrznia Nr 11 (Tabela nr 56)

W obwodzie rybackim rzeki Jegrznia Nr 11 w 2018 roku 15 wędkarzy spędzając średnio 3,80 dnia nad wodą, zarejestrowało swoje połowy w ilości 68,1 kg ryb, co daje średnio 4,54 kg na 1 wędkarza rocznie i 1,19 kg w jednym dniu wędkowania.

W omawianym obwodzie w strukturze gatunkowej odłowów odnotowano 7 taksonów ryb. Wśród odnotowanych gatunków przeważała grupa drapieżników (łącznie 42,5%) reprezentowana przez dwa gatunki – szczupaka stanowiącego 40,4% odłowów oraz okonia z udziałem 2,1%. Drobną płoć z udziałem 34,1%, wraz z leszczem (8,7%), wzdręgą (5,1%) i krapem (3,5%) łącznie stanowiły 51,4% wszystkich zarejestrowanych w obwodzie Jegrzni ryb. Warto zaznaczyć także obecność atrakcyjnego średnio 1,40-kilogramowego lina (6,2%).

1.20. Obwód rybacki Zgłowiączka Nr 2 (Tabela nr 62)

W obwodzie rybackim Zgłowiączka Nr 2 wędkowało 11 wędkarzy, a sumaryczny odłów ryb wyniósł 59,4 kg ryb, co daje średni roczny i dzienny odłów na 1 wędkarza na poziomie odpowiednio 5,40 kg i 0,97 kg, przy 5,55 dniach spędzonych nad wodą w ciągu roku przez pojedynczego wędkarza.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 6 gatunków ryb. Łączny udział dwóch zanotowanych gatunków drapieżnych – okonia i szczupaka wynosił 18,9%, przy czym średnio 1,45-kilogramowy szczupak stanowił 9,8%, a okoń 9,1%. Z mniej cennych gatunków karpiowatych należy wymienić płóc z udziałem 61,5%. Z pozostałych złowionych gatunków zanotowano także karasia srebrzystego (9,3%) oraz pojedyncze sztuki jazia (6,7%), i lina (3,7%). Struktura gatunkowa zanotowanych taksonów ryb była bardzo zbliżona do tej, którą omówiono w poprzednim sezonie.

1.21. Obwód rybacki Orz Nr 1 (Tabela nr 73)

W obwodzie rybackim Orz Nr 1 swoje połowy zarejestrowało 22 wędkarzy, a całkowity odłów zanotowany w roku 2018 wyniósł jedynie 35,9 kg ryb, co daje średnio jedynie 1,63 kg na 1 wędkującego rocznie i 0,29 kg w 1 dniu wędkowania. Pojedynczy wędkarz spędził średnio na łowisku 5,59 dnia.

W odłowach wystąpiło 6 gatunków ryb, przy czym przeważały mniej cenne karpioвате – głównie płóc z udziałem 32,6% oraz kilkanaście sztuk leszcza (20,6%). W grupie drapieżników (łącznie 31,5%) zarejestrowano: średnio 1,67-kilogramowego szczupaka, którego udział wynosił 27,9% oraz kilka sztuk okonia (3,6%). Z pozostałych gatunków wymienić należy lina (14,2%) oraz karasia srebrzystego (1,1%).

1.22. Obwód rybacki Świder Nr 1 (Tabela nr 86)

W obwodzie rybackim rzeki Świder Nr 1 swoje połowy zarejestrowało 10 wędkarzy, łowiących w sumie 24,7 kg ryb, wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkarza wynosił tylko 0,21 kg, co daje średnio 2,47 kg na 1 wędkującego rocznie, przy spędzonych średnio 11,70 dniach nad wodą.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło jedynie 5 gatunków ryb, które zdominowane były przez mniej cenne karpioвате – bardzo drobną płóc oraz leszcza (łącznie 86,2%), przy czym leszcz stanowił 44,1%, a płóc 42,1%. Drapieżnik zanotowany przez łowiących, to tylko średnio kilogramowy szczupak z udziałem 8,1%. Udział karpia wynosił 3,6%, a lina 2%.

1.23. Obwód rybacki Biebrza Nr 3 (Wissa) (Tabela nr 95)

W obwodzie rybackim rzeki Biebrza (Wissa) Nr 3 w 2018 roku jedynie 3 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 18,4 kg ryb, spędzając na łowisku średnio 5,00 dni, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 6,13 kg i 1,23 kg.

W omawianym obwodzie w strukturze gatunkowej odłowów odnotowano 3 taksony ryb. Kilka sztuk szczupaka stanowiło 53,3% odłowów a okoń 8,2%. Pozostałe 38,6% należało do płoci. W przypadku tego łowiska trudno omówić strukturę tak niewielkiej puli złowionych w tym łowisku ryb, na podstawie tak niewielkiej liczby analizowanych rejestrów.

1.24. Obwód rybacki Tążyna (Tabela nr 108)

W obwodzie rybackim rzeki Tążyna dwóch wędkarzy zanotowało odłów 8,7 kg (kilka sztuk szczupaka i jazia) i bardzo trudno jest omówić stan pogłowia ryb w tym obwodzie.

1.25. Obwód rybacki Mołtawa Nr 1 (Tabela nr 112)

W obwodzie rybackim rzeki Mołtawa Nr 1 jeden wędkarz zanotował odłów 6,9 kg ryb, i tym samym i na tym łowisku, bardzo trudno jest omówić stan pogłowia ryb tego obwodu.

1.26. Obwód rybacki Szkwa Nr 1 (Tabela nr 123)


W obwodzie rybackim rzeki Szkwa Nr 1 czterech wędkarzy nie zanotowało złowionych ryb, co nie pozwala, omówić stanu pogłowia ryb.

2. Jeziora Zakładu Rybackiego Janowo

2.1. Jezioro Wałpusz (Tabela nr 9, Rys. 19)

W jeziorze Wałpusz 43 wędkarzy zarejestrowało swe połowy w ilości 757,3 kg ryb, spędzając na łowisku średnio 5,21 dni, natomiast średni odłów roczny i dzienny w przeliczeniu na 1 wędkarza wynosił odpowiednio aż 17,63 kg i 3,38 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 8 taksonów (Rys. 19). Z grupy mniej cennych karpiowatych, które łącznie stanowiły 89,2% wszystkich zarejestrowanych w Wałpuszu ryb, a tym samym zdominowały udziały innych gatunków, płoć stanowiła 87,1%, leszcz 1,2%, wzdręga 0,8%, a ukleja 0,1%. Z drapieżników, które stanowiły 10,7% zdecydowanie najwięcej łowiono szczupaka – 6,9%, w drugiej kolejności okonia – 3,6% i 3 sztuki miętusa. Udział lina zaznaczył się w znikomych ilościach.




Rys. 19. Jezioro Wałpusz - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 757,3 kg)

2.2. Jezioro Sasek Wielki (Kobylocha) (Tabela nr 18, Rys. 20)

W roku 2018 w jeziorze Sasek Wielki całkowity zarejestrowany odłów wyniósł 312,1 kg ryb, a frekwencja na łowisku – 52 wędkarzy, którzy średnio łowili 1,22 kg ryb dziennie oraz rocznie 6,00 kg, spędzając na łowisku średnio 4,92 dnia.

W omawianym sezonie w składzie odłowów wędkarskich z jeziora Sasek Wielki wystąpiło 8 gatunków ryb (Rys. 20). Łączny udział mniej cennych karpiowatych wynosił 62,1%. Najwięcej złowiono leszcza (30,7%) i płoci (27,2%), mniej krapia (3%), uklei (0,8%) i wzdręgi (0,5%). Grupa drapieżników reprezentowana tylko przez okonia (23,4%) i szczupaka (9,6%) stanowiła łącznie 33% odłowów. Udziały średnio prawie jednokilogramowego lina wynosiły 4,9%. W stosunku do poprzedniego sezonu warunki wędkowania w jeziorze Sasek Wielki były porównywalne.




Rys. 20. Jezioro Sasek Wielki - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 312,1 kg)

2.3. Jezioro Sasek Mały (Tabela nr 27, Rys. 21)

W jeziorze Sasek Mały w roku 2018 zarejestrowało swoje połowy 42 wędkarzy, a sumaryczny odłów osiągnął 177,6 kg ryb, przy średnim rocznym odłowie na 1 wędkującego 4,23 kg i odłowie dziennym na poziomie 1,14 kg. Wędkarze spędzali średnio 3,71 dni nad wodą w ciągu roku.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 7 taksonów ryb (Rys. 21). Na mniej cenne gatunki karpiozłote rejestrowane najczęściej (łącznie stanowiące 64,6%) składały się bardzo drobna płoć (37,4%), leszcz z udziałem 20,2%, krap 5,7% i ukleja 1,4%. Drapieżniki, to tylko szczupak stanowiący 19,5% złowionych ryb, a pozostałe gatunki, to karasie srebrzysty i pospolity z udziałami odpowiednio: 11,2% i 4,7%.



Rys. 21. Jezioro Sasek Mały- struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 177,6 kg)

2.4. Jezioro Świętajno (Narty) (Tabela nr 29)

W omawianym sezonie 101 wędkarzy odłowiło i zarejestrowało połowy na poziomie 166,0 kg ryb, spędzając średnio 5,32 dnia i łowiąc 1,64 kg ryb, co w ciągu roku przekłada się na 8,74 kg średnio na 1 wędkującego.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 6 taksonów. W wędkarskich połowach z jeziora Świętajno przeważały drapieżniki, które łącznie stanowiły 65,4%, w tym okoń 43,5%, a szczupak 21,9%. Płoć stanowiła 20,5%, wzdręga 11,8%, lin 1,5% i ukleja 0,9%. Opisana struktura odłowów wędkarskich należała do bardzo atrakcyjnych.

2.5. Jezioro Brajnickie (Tabela nr 33)

W sezonie 2018 w jeziorze Brajnickim całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 140,8 kg ryb, a na jednego z 37 wędkarzy, którzy zarejestrowali swoje połowy dziennie przypadało średnio 0,62 kg ryb. Pozostałe parametry opisujące łowisko, to średni roczny odłów na 1 wędkującego na poziomie 3,81 kg i dni spędzane nad wodą w ciągu roku przez pojedynczego wędkarza średnio 6,11.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska, składająca się z 10 gatunków, była następująca: podobnie jak w poprzednim sezonie największym udziałem charakteryzowała się grupa mniej cennych karpiovatych, które łącznie stanowiły 74,4% wszystkich zarejestrowanych w Brajnikach ryb. Leszcz stanowił 34,1%, płoć 25,7%, krap 8,4% i ukleja 6,2%. Z grupy drapieźników wymienić można jedynie okonia (4,8%) i po jednej sztuce sandacza (2,1%) i szczupaka (1,1%). Pozostałe gatunki występowały w znacznie mniejszości: karaś srebrzysty 12,1%, lin 4,3%, a karaś pospolity 1,3%. Opisana struktura odłowów wędkarskich była jedną z mniej atrakcyjnych wśród analizowanych łowisk.

2.6. Jezioro Piasutno (Tabela nr 40)

W jeziorze Piasutno w roku 2018 zarejestrowało swoje połowy 14 wędkarzy, a sumaryczny odłów osiągnął 117,3 kg ryb, przy średnim rocznym odłowieniu na 1 wędkującego 8,38 kg i odłowieniu dziennym na poziomie 1,17 kg oraz 7,14 dniach spędzonych na omawianym łowisku.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 8 taksonów ryb. Łączny udział mniej cennych karpiovatych wynosił 54,1%, z czego najwięcej złowiono płoci (36,5%), leszcza 17,2%, a uklei 0,4%. Drapieźniki – szczupak z okoniem stanowiły 24,2% złowionych ryb, z czego udział szczupaka wyniósł 19,2%, a okonia 5%. Z pozostałych gatunków należy wymienić 19,3% średnio 1,13-kilogramowego lina oraz jedną sztukę karpia (1,5%).

2.7. Jezioro Małszewskie (Tabela nr 42)

W jeziorze Małszewskim w roku 2018 zarejestrowało swoje połowy, spędzając średnio prawie tydzień, 15 wędkarzy. Sumaryczny odłów osiągnął 109,3 kg ryb, przy średnim rocznym odłowieniu na 1 wędkującego 7,29 kg i odłowieniu dziennym na poziomie 1,06 kg.


Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 6 gatunków ryb. Łączny udział mniej cennych karpiovatych wynosił aż 93%, z czego najwięcej złowiono drobnej płoci (68,7%), a mniej leszcza (19,8%) i wzdręgi (4,5%). Drapieźniki – to tylko okoń stanowiący 4,8% złowionych ryb. Z pozostałych gatunków należy wymienić po kilka osobników karasia pospolitego (1,4%) i lina (0,9%).

2.8. Jezioro Machniacz (Tabela nr 45, Rys. 22)

W omawianym sezonie 8 wędkarzy odłowiło i zarejestrowało swoje połowy na poziomie 102,3 kg ryb, spędzając średnio 4,00 dni i łowiąc 3,20 kg ryb dziennie, co w ciągu roku przekłada się na 12,79 kg średnio na 1 wędkującego.

Na strukturę gatunkową odłowów wędkarskich złożyło się 6 taksonów (Rys. 22). Na pierwszym miejscu znalazł się szczupak o średniej masie 1,59 kg z udziałem 46,7%. Z pozostałych gatunków można

wymienić 34,7% płoci, 7% okonia, po 5,3% leszcza i lina oraz 1% karasia srebrzystego. Była to bardzo atrakcyjna dla wędkarzy struktura odłowów, głównie ze względu na szczupaka.



Rys. 22. Jezioro Machniacz- struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 102,3 kg)

2.9. Pozostałe jeziora Zakładu Rybackiego Janowo

Jezioro Malszeweckie (Tabela nr 51), Jezioro Burdąg (Tabela nr 54), Jezioro Warchaldzkie (Tabela nr 65), Jezioro Sędańskie (Tabela nr 68), Młyński Staw (Tabela nr 77), Staw Kobylucha (Tabela nr 82), Jezioro Nożyce (Tabela nr 84), Jezioro Rekowe (Tabela nr 87), Jezioro Grom (Tabela nr 90), Jezioro Płociczno (Tabela nr 97), Jezioro Klimek (Konik) (Tabela nr 99), Jezioro Jasne (Tabela nr 103), Jezioro Zielonka (Tabela nr 105), Jezioro Średnie (Tabela nr 107), Jezioro Lemańskie (Tabela nr 110), Jezioro Łażnica (Tabela nr 115), Jezioro Głębozeczek (w obw. J. Rekowe, Tabela nr 118), Jezioro Fręcki (Tabela nr 119), Jezioro Natać (Tabela nr 120), Jezioro Borówko (Tabela nr 124), Staw Jedwabne (Tabela nr 129).

Na wymienionych jeziorach będących w użytkowaniu Zakładu Rybackiego Janowo w nadesłanych rejestrach odłowy wędkarskie nie przekraczały 100 kg. Poszczególne z ww. łowisk charakteryzowały się następująco:

- **Malszeweckie** – przewaga mniej cennych gatunków karpiowatych (89,1%);
- **Burdąg** – przewaga mniej cennych gatunków karpiowatych (80,2%);
- **Warchaldzkie** – przewaga drapieźników, głównie szczupaka (54,5%) oraz lina (11,3%);
- **Sędańskie** – przewaga mniej cennych gatunków karpiowatych (76,1%);
- **Młyński Staw** – przewaga drapieźników, głównie okonia (30,2%) i szczupaka (20,1%) oraz 20,1% lina;
- **Staw Kobylucha** – przewaga drapieźników (65,6%), głównie okonia (57,9%) oraz 12,9% karpia;
- **Nożyce** – przewaga mniej cennych gatunków karpiowatych (89,3%);


– jeziora: **Rekowe, Grom, Płociczno, Klimek (Konik), Jasne, Zielonka, Średnie, Lemańskie, Łażnica, Głębozec (w obw. J. Rekowe), Fręcki, Natać** – zarejestrowane tu odłowy wynoszą poniżej 25 kg, stąd też można jedynie wspomnieć o znaczących udziałach drapieżników (głównie szczupaka i okonia) w tych łowiskach (55,6% w jeziorze Płociczno, 50,2% w jeziorze Grom, czy 40,3% w jeziorze Klimek (Konik)); w łowiskach jezioro **Borówko** i **Staw Jedwabne** nie zanotowano żadnych odłowów, a jedynie obecność znikomej liczby wędkarzy.

3. Inne łowiska

3.1. Jezioro Zdrowskie (Tabela nr 10, Rys. 23)

W sezonie 2018 w jeziorze Zdrowskim całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 542,4 kg ryb, a na jednego z 60 wędkarzy, którzy zarejestrowali swe połowy dziennie przypadało średnio 0,72 kg, przy średnim rocznym odłowie na 1 wędkującego 9,04 kg i średnio 12,50 dniach spędzonych na łowisku.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska składała się z 13 taksonów (Rys. 23). Największym łącznym udziałem (51,7%) charakteryzowała się grupa drapieżników, a w grupie tej wyróżniał się ponownie szczupak (21,7%) o średniej masie pojedynczego osobnika 1,84 kg i średnio 2,54-kilogramowy sandacz (21,5%), a towarzyszyły im węgorz (3,4%), sum (3,2%), okoń (1,8%) oraz jedna sztuka bolenia. Mniej cenione karpowate łącznie stanowiły 34,4%, a w tym 24,2% leszcz, płoć 6,2%, krap 3,9% a wzdręga 0,2%. Ponadto, zanotowano 11,3% karasia srebrzystego oraz pojedyncze sztuki lina (1,8%) i karpia, które podnosiły dodatkowo atrakcyjność tego łowiska.




Rys. 23. Jezioro Zdrowskie - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 542,4 kg)

3.2. Glinianki Zielonka (Tabela nr 13, Rys. 24)

W sezonie 2018 Glinianki w Zielonce k/Wołomina odwiedziło 113 wędkarzy, którzy zarejestrowali swe połowy na poziomie 412,1 kg ryb, a na 1 wędkarza spędzającego nad wodą średnio 9,28 dnia, dziennie przypadało średnio 0,39 kg ryb, a rocznie 3,65 kg.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska składała się z 12 taksonów (Rys. 24). Grupa drapieźników – szczupak (13,3%), sandacz (1,8%), okoń (1,5%) oraz pojedyncze sztuki węgorza – łącznie stanowiła 17,5% połowów i pozostawała w podobnej równowadze z grupą mniej cenionych karpiowatych, które łącznie stanowiły niemal 19% (leszcz 9,2%, płoć 6,8% krap (2,9%) oraz kilka sztuk uklei). Drapieźniki i grupę mniej cenionych karpiowatych z odsetkiem 40,7% równoważył z kolei średnio dwukilogramowy karp. Lin o średniej masie 0,93 kg z udziałem 11,3%, amur (6%; średnia masa 4,12 kg) oraz karaś srebrzysty (5,5%) uzupełniały pulę odłowów z tego łowiska, czyniąc je dość urozmaiconym i ciekawym pod względem wędkarskim.




Rys. 24. Glinianki Zielonka - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 412,1 kg)

3.3. Staw Krzywie (Tabela nr 15, Rys. 25)

W omawianym łowisku w roku 2018 zarejestrowało swoje połowy 54 wędkarzy, a sumaryczny odłów osiągnął 387,6 kg ryb, przy średnim rocznym odłowieniu na 1 wędkującego 7,18 kg i odłowieniu dziennym na poziomie 0,54 kg. Wędkarze spędzali średnio 13,28 dni nad wodą w ciągu roku.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 9 taksonów ryb (Rys. 25). Atrakcją łowiska był niewątpliwie 64,8% udział średnio 1,47-kilogramowego karpia. Drapieźniki – szczupak z sandaczem i okoniem stanowiły łącznie 15,9% złowionych ryb, z czego udziałowi szczupaka wynoszącemu 12,8% towarzyszyły 2,7% sandacza i 10 sztuk okonia. Na mniej cenne gatunki karpioвате składały się leszcz (7,5%) i płoć (3,6%). Udział średnio 0,86-kilogramowego lina wynosił 3,8%, karasia srebrzystego 2,3% a amura 2,2%.



Rys. 25. Staw Krzywie - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 387,6 kg)

3.4. Glinianki Błonie (Tabela nr 16)


Warunki wędkowania w omawianych Gliniankach w roku 2018 charakteryzowały następujące parametry: swoje połowy zarejestrowało tutaj 54 wędkarzy na poziomie 356,9 kg ryb, co dało wskaźnik średnio 0,33 kg w 1 dniu wędkowania oraz 6,61 kg w ciągu roku, a pojedynczy wędkarz spędzał na łowisku prawie 3 tygodnie (20,20 dni).

Struktura gatunkowa zarejestrowanych odłowów składała się z 10 taksonów ryb, z czego najczęściej złowiono średnio 1,77-kilogramowego karpia (55,1%). Wobec tej przewagi z pozostałych gatunków warto wymienić 14,1% leszcza, 12,5% karasia srebrzystego, 5,5% lina, a rzadziej zanotowane to amur (2%), wzdręga (1,1%), płoć i krąp. Ze sporadycznie łwionej grupy drapieżników odnotowano jedynie 8% szczupaka oraz łwione pojedynczo okonie.

3.5. Jezioro Toczyłowo (Tabela nr 17, Rys. 26)

W jeziorze Toczyłowo w roku 2018 całkowite zarejestrowane przez 44 wędkarzy odłowu wędkarskie wyniosły 325,1 kg ryb. Wędkarze spędzali średnio 8,25 dnia na łowisku i zarejestrowali swe połowy na dziennym poziomie średnio 0,90 kg, a w ciągu roku po 7,39 kg.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska składała się z 14 taksonów (Rys. 26). Leszcz, płoć, wzdręga stanowiły odpowiednio 28,9%, 12,6%, 6,8%, co łącznie z krapiem i ukleją dało odsetek 48,7%. Łwiono tu łącznie 29,3% drapieżników, przy czym ponownie najczęściej było okonia z udziałem 11,4%, szczupaka 10,2%, sandacza 3,7%, bolenia 3,6%, a udział węgorza nie przekraczał 1%. Ciekawym urozmaiceniem składu gatunkowego odłowów były: średnio 1,07-kilogramowy lin (15,2%), średnio 1,27-kilogramowy karp (2,7%), 3,3% karasia pospolitego oraz kilka sztuk jazia.



Rys. 26. Jezioro Toczyłowo - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 325,1 kg)

3.6. Jezioro Ługowskie (Tabela nr 20)


W roku 2018 w jeziorze Ługowskim całkowity zarejestrowany przez 41 wędkarzy odłów wyniósł 242,4 kg ryb, którzy średnio łowili 0,67 kg ryb dziennie oraz rocznie 5,91 kg.

W omawianym sezonie w składzie odłowów wędkarskich z omawianego jeziora wystąpiło 10 gatunków ryb. Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska zdominowana była przez mniej cenione karpiołate (76,1%), a głównie płoc (61,4%), leszcza (10,9%), krąpia (2%), wzdręgę (1,6%) i ukleję. Wobec takiej dominacji odnotowano jedynie 12,8% okonia oraz po kilka sztuk szczupaka (5,1%) i węgorza. Kilkanaście sztuk lina (4,4%) oraz pojedyncze egzemplarze karasia srebrzystego uzupełniały pulę taksonów w jeziorze.

3.7. Jezioro Białe (Tabela nr 21, Rys. 27)

W jeziorze Białym zarejestrowało swoje połowy 36 wędkarzy, a łączny odłów wyniósł 214,7 kg, co dało średni wskaźnik dziennego odłowu na 1 wędkarza na poziomie 0,64 kg i roczny 5,96 kg, przy 9,39 dniach spędzonych nad wodą.

W odłowach wśród 8 zarejestrowanych gatunków (Rys. 27) przeważały mniej cenione karpiołate (55,9%). Była to głównie płoc (35,1%), leszcz (19,2%) oraz w mniejszych ilościach krąp, wzdręga i ukleja. Drapieżniki stanowiły łącznie 34,2% zarejestrowanych ryb. Były to tylko dwa taksony – średnio 1,77-kilogramowy szczupak (28,1%) i okoń (6,1%). W odłowach zanotowano także średnio 1,01-kilogramowego lina (9,9%). Łowisko można uznać za dość ciekawe pod względem wędkarskim.




Rys. 27. Jezioro Białe - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 214,7 kg)

3.8. Glinianki Grodzisk (Tabela nr 22, Rys. 28)

Warunki wędkowania w omawianym łowisku w roku 2018 charakteryzowały następujące parametry: swoje połowy zarejestrowało 91 wędkarzy na poziomie 209,5 kg ryb, co dało bardzo niski wskaźnik średnio 0,17 kg w 1 dniu wędkowania oraz 2,30 kg w ciągu roku, a pojedynczy wędkarz spędzał na łowisku 13,92 dni.

Struktura gatunkowa zarejestrowanych odłowów składała się z 12 taksonów ryb (Rys. 28), z czego najwięcej złowiono średnio 1,49-kilogramowego karpia (58,9%). Grupa drapieżników stanowiła łącznie 10,1%, przy czym udział szczupaka wyniósł 5,8%, sandacza 2,5%, okonia 1,3%, a węgorza 0,5%. Poza tym, z pozostałych gatunków warto wymienić 9,2% karasia srebrzystego, 8,2% płoci, 7,3% amura, 3,1% lina. Można określić omawiane łowisko dość urozmaiconym i ciekawym pod względem wędkarskim.




Rys. 28. Glinianki Grodzisk - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 209,5 kg)

3.9. Jezioro Pomocnia (Tabela nr 23, Rys. 29)

W jeziorze Pomocnia w 2018 roku 39 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 196,9 kg ryb ogółem, spędzając na łowisku średnio 6,85 dnia, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 5,05 kg i 0,74 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 8 taksonów (Rys. 29). Z grupy mniej cennych karpiovatych, które łącznie stanowiły 45,9% wszystkich zarejestrowanych w opisywanym jeziorze ryb płoć stanowiła 38,6%, a leszcz 7,1%. W odłowach z tego łowiska wyróżniały się ponadto, karp o średniej masie 2,92 kg z udziałem 28,1% oraz jedna 28-kilogramowa sztuka tołpygi (19,3%). Drapieżniki reprezentowane były przez średnio 0,28-kilogramowego okonia (3,8%), średnio 2,50-kilogramowego szczupaka (2,5%) oraz pojedynczego węgorza.




Rys. 29. Jezioro Pomocnia - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 196,9 kg)

3.10. Jezioro Ostrowąs (Plebanka) (Tabela nr 26, Rys. 30)

W roku 2018 w omawianym jeziorze swoje połowy zarejestrowało 16 wędkarzy, łowiących w sumie 179,2 kg ryb, średnio 11,20 kg w ciągu roku i 1,23 kg w 1 dniu wędkowania, spędzając nad wodą średnio 9,13 dnia.

Struktura gatunkowa zarejestrowanych odłowów składała się z 8 taksonów (Rys. 30). Pierwsze w kolejności, to drapieżniki (łączy udział 40,9%), z których najczęściej złowiono średnio 1,64-kilogramowego szczupaka (35,6%), a dalej sandacza (5,3%). Na grupę mniej cennych karpiovatych składały się leszcz (14,2%) i płoć (11,9%). W odłowach zanotowano także karasia pospolitego (23,3%) oraz pojedyncze sztuki lina (4,5%) oraz karasia srebrzystego (1%). Warunki wędkowania w jeziorze Ostrowąs można określić, jako dość ciekawe.



Rys. 30. Jezioro Ostrowas (Plebanka) - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 179,2 kg)

3.11. Glinianki Gołków, Głusków, Zalesie (Tabela nr 28)

W 2018 roku 47 wędkarzy odłowiło i zarejestrowało na omawianym łowisku swe połowy na poziomie 169,7 kg ryb, spędzając dziennie nad wodą średnio 7,64 dni, przy średnim rocznym i dziennym odłowieniu na 1 wędkującego w wysokości odpowiednio 3,61 kg i 0,47 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano nieco ponad 10 taksonów. Jeżeli chodzi o drapieżniki łącznie stanowiące 12,9% odłowionych ryb, to szczupak stanowił 8,2%, węgorz 3,8%, a okoń 0,9%. Ponadto, łowiono gatunki charakterystyczne dla tego typu wód – średnio 1,54-kilogramowego karpia (37,2%) będącego zdecydowaną atrakcją omawianego łowiska, a także leszcza (32,5%), karasia srebrzystego (6,1%), lina (4,5%), płoc (2,7%), jednego amura (1,9%) oraz krapia (1,5%).

3.12. Jezioro Przytomne (Tabela nr 30)


W jeziorze Przytomne w 2018 roku 27 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 160,7 kg ryb ogółem, spędzając na łowisku średnio 7,07 dni, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosiły odpowiednio 5,95 kg i 0,84 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano tylko 6 taksonów. Z grupy mniej cennych karpiowatych, które łącznie stanowiły 77,7% wszystkich zarejestrowanych w opisywanym jeziorze ryb leszcz stanowił 58,9% a płoc 18,8%. Drapieżniki, które stanowiły łącznie 20,2% reprezentowane były przez średnio 1,55-kilogramowego szczupaka (18,4%) oraz okonia (1,9%). Należy podkreślić obecność pojedynczych egzemplarzy lina, który stanowił 1,3% oraz karpia.

3.13. Zalew w Makowie Mazowieckim (Tabela nr 32, Rys. 31)

W sezonie 2018 w omawianym zbiorniku całkowite zanotowane odłowy wędkarskie wyniosły 142,1 kg ryb, każdy z 15 wędkarzy, którzy spędzali średnio 6,60 dni na łowisku zarejestrował swe połowy na średnim poziomie 1,44 kg ryb dziennie i 9,47 kg rocznie.

W strukturze odłowów wędkarskich z omawianego zbiornika zarejestrowano 9 gatunków ryb (Rys. 31). Na pierwszym miejscu znalazł się średnio 0,38-kilogramowy karaś srebrzysty z udziałem 58,4%, a zaraz za nim średnio 3,43-kilogramowy karp (19,3%). Drapieżniki stanowiły łącznie 11,2%, z czego najwięcej złowiono średnio 1,64-kilogramowego szczupaka (9,2%), a suma tylko 2%. Grupa mniej cennych karpiowatych, reprezentowana była przez leszcza z udziałem 4,3%, płoć (3,8%), krapia (1,6%) oraz ukleję. W odłowach zanotowano także pojedynczo występującego klenia (1,4%).



Rys. 31. Zalew w Makowie Mazowieckim- struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 142,1 kg)

3.14. Jezioro Górskie (Tabela nr 34)


W roku 2018 w jeziorze Górskim całkowity zarejestrowany odłów wyniósł 137,7 kg ryb, a to za sprawą 31 wędkarzy, którzy średnio łowili 0,50 kg ryb dziennie oraz rocznie 4,44 kg, spędzając na łowisku 8,87 dnia.

W strukturze odłowów wędkarskich z omawianego jeziora wystąpiło 9 gatunków ryb. Pierwsza grupa mniej cennych karpiowatych, reprezentowana była przez dość atrakcyjnego (średnio 1,10 kg) leszcza z udziałem 22,4% i drobną płoć z odsetkiem 14,5%. Grupa ta stanowiła łącznie 37% odłowów. Wobec tych udziałów w niewielkiej przeciwwadze pozostawał łączny udział drapieżników (29,2%), przy czym najwięcej złowiono średnio 1,32-kilogramowego szczupaka (18,2%), dalej 8,6% okonia oraz pojedyncze sztuki sandacza (1,6%) i węgorza. W odłowach zanotowano ponadto karasia srebrzystego (15,9%), karpia (11,2%) oraz kilka osobników lina (6,8%). Można uznać omawiane łowisko, jako dość ciekawe pod względem wędkarskim.

3.15. Zbiornik Chorzele (Tabela nr 35, Rys. 32)

W sezonie 2018 w omawianym zbiorniku całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 137,7 kg ryb, każdy z 19 wędkarzy, którzy spędzali średnio 12,68 dni na łowisku zarejestrował swe połowy na średnim poziomie 0,57 kg ryb dziennie i 7,25 kg rocznie.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska, składała się z 7 gatunków (Rys. 32). Najwyższym udziałem (55,5%) odznaczył się ponownie karp o średniej masie 3,32 kg. Wobec tej dominacji pozostałe gatunki występowały w mniejszości. Grupa mniej cennych karpiowatych, to jedynie leszcz z udziałem 7,8% i kilkanaście sztuk płoci (0,9%). Drapieżniki reprezentował jedynie szczupak i stanowił 10,2% zarejestrowanych ryb. W odłowach zanotowano znaczący udział karasia srebrzystego – 17,7% oraz po 4% lina i karasia pospolitego.




Rys. 32. Zbiornik Chorzele - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 137,7 kg)

3.16. Jezioro Ciechomickie (Tabela nr 36, Rys. 33)

W sezonie 2018 w jeziorze Ciechomickim całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 134,7 kg ryb, a na jednego z 28 wędkarzy, którzy spędzali średnio 11,54 dni na łowisku oraz zarejestrowali swe połowy, dziennie przypadało średnio 0,42 kg ryb, a rocznie 4,81 kg.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska, składała się z 9 gatunków (Rys. 33). W połowach przeważały drapieżniki stanowiące łącznie 68,7%, w tym średnio 1,62-kilogramowy szczupak z udziałem 40,9%, sandacz (24,1%) i okoń (3,7%). Należy ponadto wymienić średnio 1,43-kilogramowego karpia (13,8%), leszcza (7,4%), płoć (4,5%), lina (3%) oraz po kilka sztuk karasia srebrzystego (2,0%) i wzdreği.



Rys. 33. Jezioro Ciechomiczkie - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 134,7 kg)

3.17. Jezioro Skrzyneckie (Tabela nr 37)

W sezonie 2018 w jeziorze Skrzyneckim całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 126,7 kg ryb. Średnio każdy z 25 wędkarzy zarejestrował połowy na poziomie 0,83 kg dziennie, a w ciągu roku po 5,07 kg, spędzając na łowisku 6,12 dnia.


Struktura gatunkowa odłowów składała się z 8 taksonów. Najwięcej (32,7%) złowiono tu płoci, a poza nią w grupie mniej cenionych karpiowatych udział leszcza wynosił 7,9%, a wzdregi 1,8%. Na drapieźniki łącznie stanowiące 17% połowów z jeziora Skrzyneckiego składały się udziały 2,42-kilogramowego szczupaka (11,4%), któremu towarzyszył jedynie okoń (5,6%). Ponadto, zanotowano 2,35-kilogramowego karpia z odsetkiem 22,3%, lina (13,8%) i karasia srebrzystego (4,5%), które uzupełniały pulę odłowów z omawianego jeziora.

3.18. Jezioro Grójeckie (Tabela nr 38, Rys. 34)

W roku 2018 w omawianym zbiorniku wodnym całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 119,3 kg ryb, średni roczny i dzienny odłów na jednego z 20 wędkarzy, przebywających średnio 6,60 dni na łowisku, osiągnął odpowiednio 5,97 kg i 0,90 kg.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska, składająca się z 12 taksonów, była dość zróżnicowana (Rys. 33). Najwyższym – 27,8% – udziałem wśród wszystkich zanotowanych gatunków charakteryzował się średnio 1,14-kilogramowy lin. Dość znaczącym udziałem (35,6%) charakteryzowała się grupa mniej cenionych karpiowatych, gdzie płoc stanowiła 21%, leszcz 14,1%, a odsetki wzdregi i uklei nie przekraczały 1%. Przy takim stosunku drapieźniki stanowiły łącznie 28,9% zarejestrowanych ryb, i były to: szczupak (20%), sandacz (3,4%), węgorz (3,1%) i okoń (2,4%). W odłowach zanotowano

także kilkanaście osobników karasia srebrzystego (4,5%) oraz pojedynczo karpia (2,1%) i karasia pospolitego (1,2%).



Rys. 34. Jezioro Grójeckie - struktura odłowów wędkarskich w roku 2018 (100% = 119,3 kg)

3.19. Staw Talar (Tabela nr 39)

W omawianym łowisku w roku 2018 zarejestrowało swoje połowy 17 wędkarzy, a sumaryczny odłów osiągnął 118,8 kg ryb, przy średnim rocznym odłowie na 1 wędkującego 6,99 kg i odłowie dziennym na poziomie 0,74 kg. Wędkarze spędzali średnio 9,41 dni nad wodą w ciągu roku.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 9 taksonów ryb. Atrakcją łowiska był niewątpliwie 54,1% udział średnio 1,53-kilogramowego karpia. Na pozostałe gatunki rejestrowane składały się płoc (21,5%), lin (10%), szczupak (7,2%), leszcz (3,4%), jaź (1,5%), węgorz (1,3%) oraz po jednej sztuce okonia i sandacza.

3.20. Stawy w Parku Pruszków (Tabela nr 41)

W sezonie 2018 w omawianym zbiorniku całkowite zanotowane odłowy wędkarskie wyniosły 113,2 kg ryb, każdy z 25 wędkarzy, którzy spędzali średnio 11,04 dni na łowisku zarejestrował swe połowy na średnim poziomie 0,41 kg ryb dziennie i 4,53 kg rocznie.

W strukturze odłowów wędkarskich z omawianego zbiornika zarejestrowano 10 gatunków ryb. Na pierwszym miejscu znalazł się średnio 1,51-kilogramowy karp z udziałem 49,5%, a dalej w kolejności karas srebrzysty (17,1%), lin (16,3%), płoc (9,6%), leszcz (3,1%) oraz z grupy mniej cennych karpiowatych wzdręga, krap i ukleja. Drapieżniki stanowiły łącznie jedynie 3,4%, z czego szczupak stanowił 2,2%, a okoń 1,2%.

3.21. Jezioro Lutoborskie (Tabela nr 43)

W jeziorze Lutoborskim w 2018 roku 19 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 106,3 kg ryb ogółem, spędzając na łowisku średnio 8,74 dni, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 5,59 kg i 0,64 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 8 taksonów. Z grupy mniej cennych karpiowatych, które łącznie stanowiły 58,8% wszystkich zarejestrowanych w opisywanym jeziorze ryb leszcz stanowił 48,3%, a płoć 10,5%. Grupa drapieżników, które stanowiły łącznie 16,7% reprezentowana była przez szczupaka (7,9%), pojedyncze węgorze (5,1%) oraz kilkanaście sztuk okonia (3,8%). Należy podkreślić udział średnio 1,30-kilogramowego lina (17,1%), karasia srebrzystego (6,4%) oraz karpia (1%). W sumie jezioro Lutoborskie należy ocenić jako dość ciekawe łowisko Mazowieckiego Okręgu PZW.

3.22. Pozostałe łowiska okręgu

Skoki I (Tabela nr 46), Jeziórko Moczydło (Tabela nr 47), Jezioro Wikaryjskie (Tabela nr 49), Jezioro Mierucie (Tabela nr 50), Jezioro Borowiec (Wildno) (Tabela nr 52), Jezioro Ostrowickie (Tabela nr 53), Jezioro Huta (Tabela nr 57), Jezioro Skrwilno (Tabela nr 58), Zbiornik Niewiadoma (Tabela nr 59), Glinianki Borowe (Tabela nr 60), Jezioro Głębozeczek (na cieku bez nazwy) (Tabela nr 61), Glinianka Włochy (Tabela nr 63), Jezioro Telążyna (Tabela nr 64), Jezioro Bytoń (Tabela nr 66), Jezioro Lubiechowo (Tabela nr 67), Jezioro Czarne Gostynińskie (Tabela nr 69), Jezioro Chojno (Tabela nr 70), Jezioro Czarne Włocławskie (Tabela nr 71), Jezioro Karaśnia (Tabela nr 72), Jezioro Kępka Szlachecka (Tabela nr 74), Staw Montoprzem (Tabela nr 75), Kocioł (Tabela nr 76), Jezioro Łuba (Tabela nr 78), Basen Kolejniak (Tabela nr 79), Jezioro Świesz (Tabela nr 80), Jezioro Czarno-Czerskie (Tabela nr 81), Jezioro Białobrzegi (Tabela nr 83), Jezioro Brzeźno (Tabela nr 85), Jezioro Okonin (Tabela nr 88), Jezioro Czarne Baruchowo (Tabela nr 89), Jezioro Służewo (Tabela nr 91), Jezioro Szczutkowskie (Tabela nr 92), Jezioro Rybnica (Tabela nr 93), Jezioro Radziszewo (Tabela nr 94), Sierpienica (Tabela nr 96), Jezioro Peł (Tabela nr 98), Glinianki Szczęśliwickie (Tabela nr 100), Jezioro Czerskie (Tabela nr 101), Jezioro Radzynek (Paprotki) (Tabela nr 102), Staw Koziół Wincenta (Tabela nr 104), Jezioro Łąki Zawistowe (Tabela nr 106), Staw Wielgie (Tabela nr 109), Basen Brwinów (Tabela nr 111), Jezioro Kamionkowskie (Tabela nr 113), Jezioro Widoń (Tabela nr 114), Wymysłów (Tabela nr 116), Jezioro Trzebowo (Tabela nr 117), Staw Ruda (Tabela nr 121), Zbiornik Rogal (Tabela nr 122), Glinianka Bagienice (Tabela nr 125), Jezioro Czerniakowskie (Tabela nr 126), Stawy Skaryszewskie (Tabela nr 127), Łacha Nowomiejska Józefów (Tabela nr 128).

Na wymienionych zbiornikach będących w użytkowaniu okręgu w nadesłanych rejestrach odłowu wędkarskie nie przekraczały 100 kg. Wśród ww. łowisk wyróżnić można jedynie te, które charakteryzuje znaczący udział gatunków atrakcyjnych wędkarsko:

- wysoki odsetek szczupaka – **J. Widoń** (100%), **Sierpienica** (79,6%), **J. Telążyna** (69,6%), **Wymysłów** (61,2%), **J. Łuba** (59,8%), **J. Bytoń** (51,9%), **J. Kamionkowskie** (50,8%), **J. Radzynek (Paprotki)** (46,3%), **J. Radziszewo** (42%), **J. Brzeźno** (34,7%), **J. Czarne Baruchowo** (34,6%), **J. Głębozeczek (na cieku bez nazwy)** (32,4%);
- wysoki odsetek karpia – **Glinianki Borowe** (78,2%), **Basen Kolejniak** (71,3%), **J. Świesz** (69,8%), **Kocioł** (61,5%), **Staw Koziół Wincenta** (54,2%), **Basen Brwinów** (52,1%), **Jeziórko Moczydło** (49,5%), **Glinianki Szczęśliwickie** (40,3%), **Staw Montoprzem** (40%), **Wymysłów** (38,8%);

– wysoki odsetek lina – **Zbiornik Rogal** (100%), **Staw Wielgie** (70,1%), **J. Czarno-Czerskie** (65,9%), **J. Radziszewo** (51,3%), **J. Łąki Zawistowe** (49,4%), **J. Chojno** (39%), **J. Radzynek (Paproty)** (35,2%), **Glinianka Włochy** (33,9%), **J. Lubiechowo** (33,3%), **Zbiornik Niewiadoma** (33%), **J. Czerskie** (31,3%).

III. Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki analizy rejestrów połowów uzyskanych przez członków Okręgu Mazowieckiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 2018 roku pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków natury ogólniejszej:

- Całkowity odłów zarejestrowany we wszystkich objętych opracowaniem wodach, osiągnięty przez badaną populację wędkarzy wyniósł w 2018 roku prawie 44,3 ton ryb, na jednego wędkarza przypadła średni roczny odłów w wysokości 6,69 kg, zaś średni dzienny odłów uzyskany przez 1 wędkującego osiągnął poziom 0,61 kg ryb.
- Wyniki analizy rejestrów z 2018 roku potwierdziły większość wniosków wypływających z analizy rejestrów połowów z 2017 roku i lat wcześniejszych. W badaniach tych podobnie wyglądała hierarchia najważniejszych łowisk, w większości z nich uzyskano zbieżne wyniki charakteryzujące struktury gatunkowe odłowów, a zatem i zbieżne oceny wędkarskiej atrakcyjności poszczególnych łowisk. Po obwodzie rybackim Narew Nr 7 najważniejsze łowiska Okręgu są następujące: Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5, Wisła Nr 3, Narew Nr 8, Narew Nr 6, Bug Nr 5, Wisła Nr 4, Skrwa Prawa Nr 1. W większości z wymienionych w opracowaniu obwodów rybackich uzyskano atrakcyjne struktury odłowów wędkarskich, w których wystąpiły poprawne relacje między najbardziej cennymi i atrakcyjnymi gatunkami drapieżnymi a grupą mniej cennych gatunków karpiowatych, reprezentowaną przez leszcza, płoć i krapia. Do najbardziej atrakcyjnych łowisk zaliczamy te, w których zanotowano największe udziały gatunków drapieżnych – **szczupaka, sandacza, okonia, suma, bolenia, miętusa i węgorza**. Najwyższe odsetki tych gatunków zanotowaliśmy w następujących obwodach: Biebrza Nr 3 (Wissa) (61,4%), Ełk Nr 45 (58,5%), Brok Nr 1 (44,9%), Jegrznia Nr 11 (42,4%) i Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5 (40,7%), gdzie udział drapieżników przekraczał 40% zarejestrowanych odłowów. Poza tymi obwodami we wszystkich pozostałych: Szkwa nr 1, Skrwa Prawa Nr 1, Bzura Nr 1, Narew Nr 8, Zgłowiączka nr 2, Utrata Nr 1, Omulew Nr 1, Orz Nr 1, Mołtawa nr 1, Nurzec Nr 1, Świder nr 1, Orzyc Nr 1, Rządza Nr 1, Narew Nr 6, Jeziorka Nr 1, Wisła Nr 3, Wisła Nr 4, Rozoga Nr 1 i Bug Nr 5 udziały drapieżników były znacznie niższe. W najważniejszym dla wędkarzy obwodzie Narew Nr 7 odsetek drapieżników w odłowach wędkarskich wynosił 26,9%. Warto zaznaczyć, że w przypadku większości rozpatrywanych obwodów rybackich udziały gatunków drapieżnych były wysokie, co dobrze świadczy o gospodarce zarybieniowej prowadzonej przez Okręg Mazowiecki.

IV. TABELE

WSZYSTKIE ŁOWISKA

L.p.	Łowisko	Pow. zbiornika (ha)	Liczba wędkarzy	Presja (dni)	Całkowity odłów (kg)	Kg ryb na wędkarza	Liczba dni na wędkarza	Kg ryb na 1 dzień wędkowania	Kg/ha	Presja dni/ha
1	Narew 7 (Zbiornik Zegrzyński)	3852,00	1497	20624	13675,1	9,14	13,78	0,66	3,55	5,35
2	Zbiornik Włocławski	7911,34	515	7080	4930,7	9,57	13,75	0,70	0,62	0,89
3	Wisła 3	4744,00	713	8024	3286,1	4,61	11,25	0,41	0,69	1,69
4	Narew 8	487,00	355	3476	3042,0	8,57	9,79	0,88	6,25	7,14
5	Narew 6	1025,00	431	6122	2715,6	6,30	14,20	0,44	2,65	5,97
6	Bug 5	1226,00	372	4874	2194,3	5,90	13,10	0,45	1,79	3,98
7	Wisła 4	3240,00	231	2302	1771,0	7,67	9,97	0,77	0,55	0,71
8	Skrwa Prawa	139,75	190	1039	1450,2	7,63	5,47	1,40	10,38	7,43
9	J. Wałpusz	431,60	43	224	757,9	17,63	5,21	3,38	1,76	0,52
10	J. Zdworskie	340,00	60	750	542,4	9,04	12,50	0,72	1,60	2,21
11	Orzyc 1	209,00	73	765	502,9	6,89	10,48	0,66	2,41	3,66
12	Bzura 1	86,00	60	1088	424,0	7,07	18,13	0,39	4,93	12,65
13	Glinianki Zielonka	26,00	113	1049	412,1	3,65	9,28	0,39	15,85	40,35
14	Rozoga 1	104,00	98	859	399,1	4,07	8,77	0,46	3,84	8,26
15	Krzywie	21,00	54	717	387,6	7,18	13,28	0,54	18,46	34,14
16	Glinianki Błonie	6,00	54	1091	356,9	6,61	20,20	0,33	59,48	181,83
17	J. Toczyłowo	105,00	44	363	325,1	7,39	8,25	0,90	3,10	3,46
18	J. Sasek Wielki	887,90	52	256	312,1	6,00	4,92	1,22	0,35	0,29
19	Rządza 1	42,00	131	586	305,3	2,33	4,47	0,52	7,27	13,95
20	J. Ługowskie	62,20	41	364	242,4	5,91	8,88	0,67	3,90	5,85
21	J. Białe	148,00	36	338	214,7	5,96	9,39	0,64	1,45	2,28
22	Glinianki Grodzisk	19,00	91	1267	209,5	2,30	13,92	0,17	11,03	66,68
23	J. Pomocnia	9,00	39	267	196,9	5,05	6,85	0,74	21,88	29,67
24	Elk 45	112,00	32	163	186,4	5,83	5,09	1,14	1,66	1,46
25	Nurzec 1	153,00	57	540	182,7	3,21	9,47	0,34	1,19	3,53
26	J. Ostrowąs (Plebanka)	42,10	16	146	179,2	11,20	9,13	1,23	4,26	3,47
27	J. Sasek Mały	332,40	42	156	177,6	4,23	3,71	1,14	0,53	0,47
28	Glinianki Gołków, Głosków, Zalesie	26,00	47	359	169,7	3,61	7,64	0,47	6,53	13,81
29	J. Świętajno (Narty)	217,19	19	101	166,0	8,74	5,32	1,64	0,76	0,47
30	J. Przymotne	38,00	27	191	160,7	5,95	7,07	0,84	4,23	5,03
31	Jeziorka 1	120,00	47	377	145,8	3,10	8,02	0,39	1,22	3,14
32	Zalew w Makowie Mazowieckim	17,00	15	99	142,1	9,47	6,60	1,44	8,36	5,82
33	J. Brajnickie	211,00	37	226	140,8	3,81	6,11	0,62	0,67	1,07
34	J. Górskie	45,00	31	275	137,7	4,44	8,87	0,50	3,06	6,11
35	Zbiornik Chorzele	5,00	19	241	137,7	7,25	12,68	0,57	27,54	48,20
36	J. Ciechomickie	47,00	28	323	134,7	4,81	11,54	0,42	2,87	6,87
37	J. Skrzyneckie	26,90	25	153	126,7	5,07	6,12	0,83	4,71	5,69
38	J. Grójeckie	27,90	20	132	119,3	5,97	6,60	0,90	4,28	4,73
39	Staw Talar	3,40	17	160	118,8	6,99	9,41	0,74	34,94	47,06
40	J. Piasutno	49,00	14	100	117,3	8,38	7,14	1,17	2,39	2,04
41	Stawy w Parku	7,00	25	276	113,2	4,53	11,04	0,41	16,17	39,43
42	J. Małszewskie	208,80	15	103	109,3	7,29	6,87	1,06	0,52	0,49
43	J. Lutoborskie	22,30	19	166	106,3	5,59	8,74	0,64	4,77	7,44
44	Omulew 1	189,00	31	189	110,0	3,55	6,10	0,58	0,58	1,00
45	J. Machniacz	12,04	8	32	102,3	12,79	4,00	3,20	8,50	2,66
46	Skoki I	24,00	27	254	96,0	3,56	9,41	0,38	4,00	10,58
47	Jeziórko Moczydło	4,00	42	372	94,2	2,24	8,86	0,25	23,55	93,00
48	Brok 1	45,00	46	286	81,9	1,78	6,22	0,29	1,82	6,36
49	J. Wikaryjskie	66,50	33	137	80,6	2,44	4,15	0,59	1,21	2,06
50	J. Mierucie	32,00	9	53	80,5	8,94	5,89	1,52	2,52	1,66
51	J. Małszewskie	36,61	16	73	78,0	4,88	4,56	1,07	2,13	1,99
52	J. Borowiec (Wildno)	12,80	14	127	77,5	5,54	9,07	0,61	6,05	9,92
53	J. Ostrowickie	55,10	18	90	73,0	4,06	5,00	0,81	1,32	1,63

54	J. Burda	38,92	7	38	72,2	10,31	5,43	1,90	1,86	0,98
55	Utrata 1	46,00	47	287	68,6	1,46	6,11	0,24	1,49	6,24
56	Jegrznia 11	6,00	15	57	68,1	4,54	3,80	1,19	11,35	9,50
57	J. Huta	34,50	17	123	66,9	3,94	7,24	0,54	1,94	3,57
58	J. Skrwilno	87,70	8	82	64,4	8,05	10,25	0,79	0,73	0,94
59	Zbiornik Niewiadoma	42,00	15	120	63,3	4,22	8,00	0,53	1,51	2,86
60	Glinianki Borowe	4,00	9	59	62,7	6,97	6,56	1,06	15,68	14,75
61	J. Głęboczek (na cieku bez nazwy)	12,00	10	65	61,2	6,12	6,50	0,94	5,10	5,42
62	Zgłowiączka	23,00	11	61	59,4	5,40	5,55	0,97	2,58	2,65
63	Glinianka Włochy	3,00	16	102	58,2	3,64	6,38	0,57	19,40	34,00
64	J. Telażyna	25,40	8	51	57,3	7,16	6,38	1,12	2,26	2,01
65	J. Warchałdzkie	46,42	13	63	56,9	4,38	4,85	0,90	1,23	1,36
66	J. Bytoń	10,30	10	77	47,2	4,72	7,70	0,61	4,58	7,48
67	J. Lubiechowo	19,40	10	90	44,2	4,42	9,00	0,49	2,28	4,64
68	J. Sędańskie	185,99	12	35	41,9	3,49	2,92	1,20	0,23	0,19
69	Czarne Gostynińskie	4,00	10	90	40,5	4,05	9,00	0,45	10,13	22,50
70	J. Chojno	10,20	4	25	37,4	9,35	6,25	1,50	3,67	2,45
71	Czarne Włocławskie	6,80	13	138	36,7	2,82	10,62	0,27	5,40	20,29
72	J. Karaśnia	46,00	11	61	36,2	3,29	5,55	0,59	0,79	1,33
73	Orz 1	23,00	22	123	35,9	1,63	5,59	0,29	1,56	5,35
74	J. Kępka Szlachecka	12,90	7	33	35,0	5,00	4,71	1,06	2,71	2,56
75	Staw Montoprzem	2,00	8	65	34,5	4,31	8,13	0,53	17,25	32,50
76	Kocioł	4,00	3	20	34,5	11,50	6,67	1,73	8,63	5,00
77	Młyński Staw	12,30	5	23	34,4	6,88	4,60	1,50	2,80	1,87
78	J. Łuba	12,00	13	97	34,3	2,64	7,46	0,35	2,86	8,08
79	Basen Kolejniak	4,00	13	106	34,1	2,62	8,15	0,32	8,53	26,50
80	J. Świesz	18,50	4	57	34,1	8,53	14,25	0,60	1,84	3,08
81	J. Czarno-Czerskie	10,10	5	30	32,8	6,56	6,00	1,09	3,25	2,97
82	Staw Kobylucha	39,16	14	53	31,1	2,22	3,79	0,59	0,79	1,35
83	J. Białobrzegi	10,00	6	53	29,3	4,88	8,83	0,55	2,93	5,30
84	J. Nożyce	55,00	13	30	27,0	2,08	2,31	0,90	0,49	0,55
85	J. Brzeźno	16,40	9	52	26,2	2,91	5,78	0,50	1,60	3,17
86	Świder 1	90,00	10	117	24,7	2,47	11,70	0,21	0,27	1,30
87	J. Rekowe	70,84	12	39	24,5	2,04	3,25	0,63	0,35	0,55
88	J. Okonin	10,30	11	48	24,4	2,22	4,36	0,51	2,37	4,66
89	Czarne Baruchowo	6,70	4	16	23,1	5,78	4,00	1,44	3,45	2,39
90	J. Grom	216,18	10	32	22,9	2,29	3,20	0,72	0,11	0,15
91	J. Służewo	4,70	7	41	22,7	3,24	5,86	0,55	4,83	8,72
92	J. Szczutkowskie	9,00	3	5	20,8	6,93	1,67	4,16	2,31	0,56
93	J. Rybnica	7,60	8	27	19,5	2,44	3,38	0,72	2,57	3,55
94	J. Radziszewo	7,00	5	30	19,3	3,86	6,00	0,64	2,76	4,29
95	Biebrza 3 (Wissa)	17,00	3	15	18,4	6,13	5,00	1,23	1,08	0,88
96	Sierpienica	2,00	4	44	18,1	4,53	11,00	0,41	9,05	22,00
97	J. Płociczno	21,67	3	12	16,2	5,40	4,00	1,35	0,75	0,55
98	J. Peł	12,00	4	13	14,1	3,53	3,25	1,08	1,18	1,08
99	J. Klimek (Konik)	35,92	10	25	13,9	1,39	2,50	0,56	0,39	0,70
100	Glinianki Szczęśliwickie	7,00	9	62	13,9	1,54	6,89	0,22	1,99	8,86
101	J. Czerskie	9,00	6	44	11,2	1,87	7,33	0,25	1,24	4,89
102	J. Radzynek (Paproty)	7,50	3	9	10,8	3,60	3,00	1,20	1,44	1,20
103	J. Jasne	18,28	2	5	9,7	4,85	2,50	1,94	0,53	0,27
104	Staw Kozioł Wincenta	0,35	1	8	9,6	9,60	8,00	1,20	27,43	22,86
105	J. Zielonka	6,37	3	5	9,4	3,13	1,67	1,88	1,48	0,78
106	J. Łąki Zawistowe	10,30	3	16	8,9	2,97	5,33	0,56	0,86	1,55
107	J. Średnie	29,10	2	17	8,7	4,35	8,50	0,51	0,30	0,58
108	Tażyna	9,30	2	3	8,7	4,35	1,50	2,90	0,94	0,32
109	Staw Wielgie	4,20	2	5	8,7	4,35	2,50	1,74	2,07	1,19
110	J. Lemańskie	23,52	3	7	7,2	2,40	2,33	1,03	0,31	0,30
111	Basen Brwinów	2,00	5	51	7,1	1,42	10,20	0,14	3,55	25,50

112	Mołtawa	12,60	1	6	6,9	6,90	6,00	1,15	0,55	0,48
113	J. Kamionkowskie	8,00	8	80	6,1	0,76	10,00	0,08	0,76	10,00
114	J. Widoń	10,00	2	4	5,5	2,75	2,00	1,38	0,55	0,40
115	J. Łażnica	25,86	1	1	5,0	5,00	1,00	5,00	0,19	0,04
116	Wymysłów	4,50	5	9	4,9	0,98	1,80	0,54	1,09	2,00
117	J. Trzebowo	9,70	2	14	3,0	1,50	7,00	0,21	0,31	1,44
118	J. Głębołek (w obw. J. Rekowe)	25,05	3	5	3,0	1,00	1,67	0,60	0,12	0,20
119	J. Fręcki	18,97	4	6	2,5	0,63	1,50	0,42	0,13	0,32
120	J. Natać	21,77	1	1	1,5	1,50	1,00	1,50	0,07	0,05
121	Staw Ruda	3,00	1	11	1,2	1,20	11,00	0,11	0,40	3,67
122	Zbiornik Rogal	1,00	1	4	1,1	1,10	4,00	0,28	1,10	4,00
123	Szkwa 1	33,00	4	6	0,0	0,00	0,00	1,50	0,00	0,18
124	J. Borówko	9,10	3	4	0,0	0,00	0,00	1,33	0,00	0,44
125	Glinianki Bagienice	3,00	2	2	0,0	0,00	0,00	1,00	0,00	0,67
126	J. Czerniakowskie	19,50	1	1	0,0	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05
127	Stawy Skaryszewskie	b.d.	2	8	0,0	0,00	0,00	4,00	b.d.	b.d.
128	Łacha Józefów	b.d.	9	30	0,0	0,00	0,00	3,33	b.d.	b.d.
129	Staw Jedwabne	2,00	1	3	0,0	0,00	0,00	3,00	0,00	1,50

Tabela I. Wyniki wędkarzy okręgu mazowieckiego

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
6621	72628	44304	103879	6,69	10,97	0,61

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5490,7	3297	12,39	1,67
Sandacz	1664,7	710	3,76	2,34
Sum	2462,8	310	5,56	7,94
Okoń	1962,5	9793	4,43	0,20
Boleń	404,4	177	0,91	2,28
Miętus	5,1	11	0,01	0,46
Węgorz	69,8	70	0,16	1,00
Karp	2324,9	1231	5,25	1,89
Płoc	6224,4	46876	14,05	0,13
Leszcz	17393,3	19497	39,26	0,89
Lin	1988,5	2028	4,49	0,98
Karaś pospolity	192,6	447	0,43	0,43
Karaś srebrzysty	1282,9	3491	2,90	0,37
Amur	109,1	42	0,25	2,60
Brzana	10,7	4	0,02	2,68
Świnka	11,1	17	0,03	0,65
Certa	142,1	383	0,32	0,37
Kleń	283,9	494	0,64	0,57
Jaź	136,3	172	0,31	0,79
Jelec	0,6	7	0,00	0,09
Krap	1766,4	10956	3,98	0,16
Wzdreğa	242,1	1795	0,55	0,13
Jazgarz	4,5	195	0,01	0,02
Ukleja	56,3	1657	0,13	0,03
Sterlet	2,0	1	0,00	2,00
Tołpyga	38,00	1,00	0,09	38,00
Pozostałe	33,9	217	0,07	0,16

Tabela 1. Rzeka Narew nr 7 (Zbiornik Zegrzyński)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1497	20624	13675,1	24740	9,14	13,78	0,66

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1630,2	863	11,92	1,89
Sandacz	624,8	264	4,57	2,37
Sum	671,7	75	4,91	8,96
Okoń	652,0	3259	4,77	0,20
Boleń	93,6	39	0,68	2,40
Karp	148,8	68	1,09	2,19
Płoc	923,8	6149	6,76	0,15
Leszcz	7478	9198	54,68	0,81
Lin	657,2	591	4,81	1,11
Karaś pospolity	24,0	42	0,18	0,57
Karaś srebrzysty	97,1	485	0,71	0,20
Amur	7,7	8	0,06	0,96
Brzana	4,5	1	0,03	4,50
Świnka	1,2	1	0,01	1,20
Certa	5,0	12	0,04	0,42
Kleń	40,2	53	0,29	0,76
Jaź	19,8	23	0,14	0,86
Krąp	514,2	2698	3,76	0,19
Wzdreęga	65,6	451	0,48	0,15
Jazgarz	4,4	175	0,03	0,03
Ukleja	7,8	269	0,05	0,03
Pozostałe	3,5	16	0,03	0,22

Tabela 2. Zbiornik Włocławski na rzece Wisła nr 5

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
515	7080	4930,7	5460	9,57	13,75	0,70

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	475,5	201	9,64	2,37
Sandacz	350,2	147	7,10	2,38
Sum	952,5	115	19,32	8,28
Okoń	92,0	455	1,87	0,20
Boleń	130,6	64	2,65	2,04
Węgorz	6,2	6	0,13	1,03
Karp	390,6	188	7,92	2,08
Płoc	146,2	916	2,96	0,16
Leszcz	1768,9	1599	35,87	1,11
Lin	35,4	27	0,72	1,31
Karaś srebrzysty	431,8	1119	8,76	0,39
Certa	28,6	78	0,58	0,37
Kleń	5,4	7	0,11	0,77
Jaź	2,5	1	0,05	2,50
Krąp	77,4	329	1,57	0,24
Wzdreęga	27,5	171	0,56	0,16
Pozostałe	9,4	37	0,19	0,25

Tabela 3. Rzeka Wisła nr 3

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
713	8024	3286,1	7051	4,61	11,25	0,41

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	250,6	136	7,63	1,84
Sandacz	130,6	66	3,97	1,98
Sum	212,1	42	6,45	5,05
Okoń	65,1	296	1,98	0,22
Boleń	80,7	32	2,46	2,52
Węgorz	1,9	2	0,06	0,95
Karp	105,3	49	3,20	2,15
Płoc	180,3	1187	5,49	0,15
Leszcz	1609,5	1655	48,97	0,97
Lin	51,0	78	1,55	0,65
Karaś pospolity	0,9	3	0,03	0,30
Karaś srebrzysty	85,2	204	2,59	0,42
Amur	4,4	5	0,13	0,88
Brzana	6,2	3	0,19	2,07
Świnka	9,7	15	0,30	0,65
Certa	91,3	258	2,78	0,35
Kleń	56,1	106	1,71	0,53
Jaź	14,0	32	0,43	0,44
Krap	311,0	2592	9,46	0,12
Wzdreęga	2,9	18	0,09	0,16
Jazgarz	0,1	20	0,00	0,01
Ukleja	4,5	190	0,14	0,02
Pozostałe	12,7	62	0,39	0,20

Tabela 4. Rzeka Narew nr 8

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
355	3476	3042,0	3952	8,57	9,79	0,88

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	235,7	104	7,75	2,27
Sandacz	45,2	19	1,49	2,38
Sum	103,2	14	3,39	7,37
Okoń	137,5	794	4,52	0,17
Boleń	29,2	12	0,96	2,43
Węgorz	3,3	4	0,11	0,83
Karp	18,0	6	0,59	3,00
Płoc	124,6	611	4,10	0,20
Leszcz	2170,9	1656	71,35	1,31
Lin	16,9	68	0,56	0,25
Karaś srebrzysty	13,5	45	0,44	0,30
Świnka	0,2	1	0,01	0,20
Certa	12,7	29	0,42	0,44
Kleń	9,0	12	0,30	0,75
Jaź	11,0	11	0,36	1,00
Jelec	0,1	1	0,00	0,10
Krap	110,9	549	3,65	0,20
Ukleja	0,1	16	0,00	0,01

Tabela 5. Rzeka Narew nr 6

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
431	6122	2715,6	5549	6,30	14,20	0,44

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	625,4	387	23,03	1,62
Sandacz	17,1	9	0,63	1,90
Sum	118,1	14	4,35	8,44
Okoń	144,4	716	5,32	0,20
Boleń	17,3	9	0,64	1,92
Miętus	3,8	7	0,14	0,54
Karp	10,5	7	0,39	1,50
Płoć	311,4	1825	11,47	0,17
Leszcz	941,0	800	34,65	1,18
Lin	179,1	175	6,60	1,02
Karaś pospolity	35,3	143	1,30	0,25
Karaś srebrzysty	48,8	116	1,80	0,42
Kleń	50,8	173	1,87	0,29
Jaź	11,8	13	0,43	0,91
Krąp	194,5	1082	7,16	0,18
Wzdreğa	4,9	47	0,17	0,10
Ukleja	1,4	26	0,05	0,05

Tabela 6. Rzeka Bug nr 5

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
372	4874	2194,3	6278	5,90	13,10	0,45

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	433,4	275	19,75	1,58
Sandacz	56,5	24	2,57	2,35
Sum	159,6	19	7,27	8,40
Okoń	73,8	346	3,36	0,21
Boleń	16,9	7	0,77	2,41
Karp	50,3	26	2,29	1,93
Płoć	194,7	1453	8,87	0,13
Leszcz	650,5	912	29,64	0,71
Lin	74,2	65	3,38	1,14
Karaś pospolity	25,8	61	1,18	0,42
Karaś srebrzysty	26,5	100	1,22	0,27
Kleń	48,5	49	2,21	0,99
Jaź	5,8	6	0,26	0,97
Krąp	368,4	2643	16,79	0,14
Wzdreğa	1,1	10	0,05	0,11
Ukleja	7,8	272	0,36	0,03
Pozostałe	0,5	10	0,03	0,05

Tabela 7. Rzeka Wisła nr 4

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
231	2302	1771,0	2321	7,67	9,97	0,77

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	97,0	193	5,48	0,50
Sandacz	152,4	48	8,61	3,18
Sum	222,3	26	12,55	8,55
Okoń	46,1	200	2,60	0,23
Boleń	13,1	5	0,74	2,62
Karp	12,0	5	0,68	2,40
Płoć	95,0	635	5,36	0,15
Leszcz	975,4	760	55,08	1,28
Lin	1,0	1	0,06	1,00
Karaś srebrzysty	48,5	96	2,74	0,51
Amur	10,0	1	0,56	10,00
Certa	4,5	6	0,25	0,75
Kleń	7,8	10	0,44	0,78
Jaź	8,5	10	0,48	0,85
Krąp	68,3	281	3,86	0,24
Wzdrenga	2,9	30	0,16	0,10
Pozostałe	6,2	14	0,35	0,44

Tabela 8. Rzeka Skrwa Prawa nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
190	1039	1450,2	8790	7,63	5,47	1,40

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	53,3	31	3,68	1,72
Okoń	8,0	54	0,55	0,15
Płoć	1366,4	8669	94,22	0,16
Leszcz	12,4	27	0,86	0,46
Lin	0,7	1	0,05	0,70
Kleń	6,3	6	0,43	1,05
Jaź	3,1	2	0,21	1,55

Tabela 9. Jezioro Walpusz

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
43	224	757,3	4803	17,63	5,21	3,38

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	52,6	48	6,94	1,10
Okoń	27,5	133	3,63	0,21
Miętus	0,8	3	0,11	0,27
Płoć	660,2	4550	87,11	0,15
Leszcz	9,2	21	1,21	0,44
Lin	1,3	1	0,17	1,30
Wzdrenga	5,7	42	0,75	0,14
Ukleja	0,6	5	0,08	0,12

Tabela 10. Jezioro Zdrowskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
60	750	542,4	861	9,04	12,50	0,72

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	117,5	64	21,66	1,84
Sandacz	116,7	46	21,52	2,54
Sum	17,5	3	3,23	5,83
Okoń	9,5	32	1,75	0,30
Boleń	1,0	1	0,18	1,00
Węgorz	18,4	18	3,39	1,02
Karp	4,2	2	0,77	2,10
Płoc	33,7	190	6,22	0,18
Leszcz	131,1	333	24,17	0,39
Lin	10,0	10	1,84	1,00
Karaś srebrzysty	61,0	100	11,25	0,61
Krąp	21,0	58	3,87	0,36
Wzdreęga	0,8	4	0,15	0,20

Tabela 11. Rzeka Orzyc nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
73	765	502,9	2208	6,89	10,48	0,66

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	67,1	41	13,34	1,64
Sandacz	27,0	13	5,37	2,08
Okoń	64,0	342	12,73	0,19
Miętus	0,5	1	0,10	0,50
Karp	56,5	34	11,23	1,66
Płoc	158,2	1439	31,46	0,11
Leszcz	30,6	40	6,08	0,77
Lin	35,5	41	7,06	0,87
Karaś pospolity	0,5	1	0,10	0,50
Karaś srebrzysty	11,9	29	2,37	0,41
Kleń	30,6	38	6,08	0,81
Jaź	12,9	17	2,57	0,76
Jelec	0,5	6	0,10	0,08
Krąp	0,4	5	0,08	0,08
Wzdreęga	2,5	32	0,50	0,08
Ukleja	4,2	129	0,83	0,03

Tabela 12. Rzeka Bzura 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
60	1088	424,0	848	7,07	18,13	0,39

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	36,1	28	8,51	1,29
Sandacz	9,2	5	2,17	1,84
Okoń	8,0	31	1,89	0,26
Boleń	6,0	1	1,42	6,00
Węgorz	0,7	1	0,17	0,70
Karp	62,7	29	14,79	2,16
Płoc	40,0	357	9,43	0,11
Leszcz	162,4	194	38,31	0,84
Lin	61,4	80	14,48	0,77
Karaś srebrzysty	20,4	95	4,81	0,21
Amur	12,6	9	2,97	1,40
Kleń	0,9	2	0,21	0,45
Jaź	1,8	1	0,42	1,80
Krap	0,2	2	0,05	0,10
Wzdreęga	1,2	11	0,28	0,11
Pozostałe	0,4	2	0,09	0,20

Tabela 13. Glinianki Zielonka

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
113	1049	412,1	722	3,65	9,28	0,39

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	54,7	28	13,27	1,95
Sandacz	7,5	1	1,82	7,50
Okoń	6,2	33	1,51	0,19
Węgorz	3,6	3	0,87	1,20
Karp	167,9	84	40,74	2,00
Płoc	28,1	365	6,82	0,08
Leszcz	37,7	44	9,15	0,86
Lin	46,7	50	11,33	0,93
Karaś srebrzysty	22,6	56	5,48	0,40
Amur	24,7	6	5,99	4,12
Krap	11,9	47	2,89	0,25
Ukleja	0,5	5	0,13	0,10

Tabela 14. Rzeka Rozoga nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
98	859	399,1	905	4,07	8,77	0,46

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	52,3	32	13,10	1,63
Sandacz	12,9	7	3,23	1,84
Okoń	13,1	62	3,28	0,21
Karp	20,7	7	5,19	2,96
Płoc	60,3	516	15,11	0,12
Leszcz	174,6	195	43,75	0,90
Lin	56,7	62	14,21	0,91
Karaś pospolity	7,0	19	1,75	0,37
Krap	1,5	5	0,38	0,30

Tabela 15. Staw Krzywiewie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
54	717	387,6	422	7,18	13,28	0,54

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	49,6	32	12,80	1,55
Sandacz	10,5	4	2,71	2,63
Okoń	1,5	10	0,38	0,15
Karp	251,0	171	64,76	1,47
Płoć	14,0	116	3,61	0,12
Leszcz	28,9	50	7,46	0,58
Lin	14,7	17	3,79	0,86
Karaś srebrzysty	9,0	18	2,32	0,50
Amur	8,4	4	2,17	2,10

Tabela 16. Glinianki Błonie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
54	1091	356,9	385	6,61	20,20	0,33

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	28,4	15	7,96	1,89
Okoń	1,8	6	0,50	0,30
Karp	196,8	111	55,14	1,77
Płoć	3,2	18	0,91	0,18
Leszcz	50,4	64	14,12	0,79
Lin	19,6	28	5,49	0,70
Karaś srebrzysty	44,7	100	12,52	0,45
Amur	7,1	1	1,99	7,10
Krap	1,0	4	0,28	0,25
Wzdreęga	3,9	38	1,09	0,10

Tabela 17. Jezioro Toczyłowo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
44	363	325,1	1057	7,39	8,25	0,90

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	33,3	33	10,24	1,01
Sandacz	12,1	8	3,72	1,51
Okoń	37,0	164	11,38	0,23
Boleń	11,8	5	3,63	2,36
Węgorz	1,0	1	0,31	1,00
Karp	8,9	7	2,74	1,27
Płoć	40,9	365	12,58	0,11
Leszcz	94,1	154	28,94	0,61
Lin	49,4	46	15,20	1,07
Karaś pospolity	10,7	26	3,29	0,41
Jaź	2,5	4	0,77	0,63
Krap	1,1	17	0,34	0,06
Wzdreęga	22,2	224	6,83	0,10
Ukleja	0,1	3	0,03	0,03

Tabela 18. Jezioro Sasek Wielki

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
52	256	312,1	1456	6,00	4,92	1,22

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	29,9	23	9,58	1,30
Okoń	73,1	267	23,42	0,27
Płoć	84,8	792	27,17	0,11
Leszcz	95,9	206	30,73	0,47
Lin	15,2	16	4,87	0,95
Krap	9,4	107	3,01	0,09
Wzdreğa	1,4	5	0,45	0,28
Ukleja	2,4	40	0,77	0,06

Tabela 19. Rzeka Rządza nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
131	586	305,3	685	2,33	4,47	0,52

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	39,7	26	13,00	1,53
Sandacz	2,3	1	0,75	2,30
Okoń	29,4	75	9,63	0,39
Boleń	2,8	1	0,92	2,80
Karp	3,8	3	1,24	1,27
Płoć	57,0	326	18,67	0,17
Leszcz	39,4	43	12,91	0,92
Lin	113,5	101	37,18	1,12
Karaś srebrzysty	0,3	1	0,10	0,30
Kleń	0,5	1	0,16	0,50
Jaź	1,8	2	0,59	0,90
Krap	2,5	23	0,82	0,11
Wzdreğa	11,9	67	3,90	0,18
Ukleja	0,4	15	0,13	0,03

Tabela 20. Jezioro Ługowskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
41	364	242,4	1563	5,91	8,88	0,67

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	12,3	7	5,07	1,76
Okoń	31,1	214	12,83	0,15
Węgorz	1,5	2	0,62	0,75
Płoć	148,9	1221	61,43	0,12
Leszcz	26,5	41	10,93	0,65
Lin	10,7	11	4,41	0,97
Karaś srebrzysty	2,3	3	0,95	0,77
Krap	4,8	33	1,98	0,15
Wzdreğa	3,9	19	1,61	0,21
Ukleja	0,4	12	0,17	0,03

Tabela 21. Jezioro Białe

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
36	338	214,7	743	5,96	9,39	0,64

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	60,3	34	28,09	1,77
Okoń	13,1	46	6,11	0,28
Płoc	75,3	577	35,07	0,13
Leszcz	41,2	23	19,19	1,79
Lin	21,2	21	9,87	1,01
Krap	1,9	13	0,88	0,15
Wzdreęga	0,9	9	0,42	0,10
Ukleja	0,8	20	0,37	0,04

Tabela 22. Glinianki Grodzisk

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
91	1267	209,5	382	2,30	13,92	0,17

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	12,2	10	5,82	1,22
Sandacz	5,3	3	2,53	1,77
Okoń	2,7	14	1,29	0,19
Węgorz	1,0	1	0,48	1,00
Karp	123,3	83	58,85	1,49
Płoc	17,1	172	8,16	0,10
Leszcz	3,4	5	1,62	0,68
Lin	6,5	6	3,10	1,08
Karaś srebrzysty	19,2	54	9,16	0,36
Amur	15,2	5	7,26	3,04
Krap	2,3	16	1,11	0,14
Wzdreęga	1,3	13	0,62	0,10

Tabela 23. Jezioro Pomocnia

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
39	267	196,9	889	5,05	6,85	0,74

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,0	2	2,54	2,50
Okoń	7,4	26	3,76	0,28
Węgorz	0,7	1	0,35	0,70
Karp	55,4	19	28,14	2,92
Płoc	76,0	802	38,60	0,09
Leszcz	14,0	20	7,11	0,70
Krap	0,4	18	0,20	0,02
Tołpyga	38,0	1	19,30	38,00

Tabela 24. Rzeka Ełk nr 45

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
32	163	186,4	656	5,83	5,09	1,14

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	75,3	49	40,40	1,54
Okoń	33,8	143	18,13	0,24
Płoc	44,4	402	23,82	0,11
Leszcz	15,3	32	8,21	0,48
Lin	3,0	2	1,61	1,50
Kleń	12,9	12	6,92	1,08
Jaź	1,0	1	0,54	1,00
Krap	0,7	15	0,37	0,05

Tabela 25. Rzeka Nurzec nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
57	540	182,7	551	3,21	9,47	0,34

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	40,4	25	22,11	1,62
Okoń	16,4	80	8,98	0,21
Karp	11,1	9	6,08	1,23
Płoc	42,9	296	23,48	0,14
Leszcz	36,7	35	20,09	1,05
Lin	16,2	24	8,87	0,68
Jaź	10,9	14	5,97	0,78
Krap	2,1	11	1,15	0,19
Ukleja	6,0	57	3,27	0,11

Tabela 26. Jezioro Ostrowąs (Plebanka)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
16	146	179,2	471	11,20	9,13	1,23

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	63,8	39	35,60	1,64
Sandacz	9,5	6	5,30	1,58
Karp	7,5	5	4,19	1,50
Płoc	21,3	235	11,89	0,09
Leszcz	25,5	124	14,23	0,21
Lin	8,1	9	4,52	0,90
Karaś pospolity	41,7	52	23,27	0,80
Karaś srebrzysty	1,8	1	1,00	1,80

Tabela 27. Jezioro Sasek Mały

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
42	156	177,6	1512	4,23	3,71	1,14

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	34,7	324	19,54	0,11
Płoc	66,4	814	37,39	0,08
Leszcz	35,9	103	20,21	0,35
Karaś pospolity	8,3	21	4,67	0,40
Karaś srebrzysty	19,8	32	11,15	0,62
Krap	10,1	104	5,69	0,10
Ukleja	2,4	114	1,35	0,02

Tabela 28. Glinianki Gołków, Głusków, Zalesie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
47	359	169,7	334	3,61	7,64	0,47

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	13,9	8	8,19	1,74
Okoń	1,6	9	0,94	0,18
Węgorz	6,4	8	3,77	0,80
Karp	63,2	41	37,24	1,54
Płoć	4,5	38	2,65	0,12
Leszcz	55,2	96	32,53	0,58
Lin	7,6	12	4,48	0,63
Karaś srebrzysty	10,4	38	6,13	0,27
Amur	3,2	1	1,89	3,20
Krąp	2,5	7	1,47	0,36
Pozostałe	1,2	76	0,71	0,02

Tabela 29. Jezioro Świętajno (Narty)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
19	101	166,0	753	8,74	5,32	1,64

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	36,3	23	21,87	1,58
Okoń	72,2	355	43,49	0,20
Płoć	34,0	216	20,48	0,16
Lin	2,5	2	1,51	1,25
Wzdrenga	19,5	132	11,75	0,15
Ukleja	1,5	25	0,90	0,06

Tabela 30. Jezioro Przytomne

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
27	191	160,7	501	5,95	7,07	0,84

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	29,5	19	18,36	1,55
Okoń	3,0	26	1,87	0,12
Karp	1,3	1	0,81	1,30
Płoć	30,2	236	18,79	0,13
Leszcz	94,6	217	58,86	0,44
Lin	2,1	2	1,31	1,05

Tabela 31. Rzeka Jeziorka nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
47	377	145,8	616	3,10	8,02	0,39

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	23,6	15	16,19	1,57
Sandacz	16,2	7	11,11	2,31
Okoń	12,6	37	8,64	0,34
Płoc	39,8	403	27,30	0,10
Leszcz	14,2	21	9,74	0,68
Lin	3,6	8	2,47	0,45
Karaś srebrzysty	12,6	47	8,64	0,27
Kleń	6,5	12	4,46	0,54
Jaź	3,1	6	2,13	0,52
Krap	8,4	40	5,75	0,21
Wzdreęga	5,2	20	3,57	0,26

Tabela 32. Zalew w Makowie Mazowieckim

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
15	99	142,1	308	9,47	6,60	1,44

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	13,1	8	9,22	1,64
Sum	2,8	1	1,97	2,80
Karp	27,4	8	19,28	3,43
Płoc	5,4	42	3,80	0,13
Leszcz	6,1	14	4,29	0,44
Karaś srebrzysty	83,0	217	58,41	0,38
Kleń	2,0	1	1,41	2,00
Krap	2,2	14	1,55	0,16
Ukleja	0,1	3	0,07	0,03

Tabela 33. Jezioro Brajnackie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
37	226	140,8	756	3,81	6,11	0,62

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,5	1	1,07	1,50
Sandacz	3,0	1	2,13	3,00
Okoń	6,8	46	4,83	0,15
Płoc	36,2	344	25,71	0,11
Leszcz	48,0	72	34,09	0,67
Lin	6,0	7	4,26	0,86
Karaś pospolity	1,8	4	1,28	0,45
Karaś srebrzysty	17,0	18	12,07	0,94
Krap	11,8	55	8,38	0,21
Ukleja	8,7	208	6,18	0,04

Tabela 34. Jezioro Górskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
31	275	137,7	429	4,44	8,87	0,50

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	25,1	19	18,23	1,32
Sandacz	2,2	2	1,60	1,10
Okoń	11,9	56	8,64	0,21
Węgorz	1,0	1	0,73	1,00
Karp	15,4	6	11,18	2,57
Płóć	20,0	249	14,52	0,08
Leszcz	30,9	28	22,44	1,10
Lin	9,3	9	6,75	1,03
Karaś srebrzysty	21,9	59	15,91	0,37

Tabela 35. Zbiornik Chorzele

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
19	241	137,7	129	7,25	12,68	0,57

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	14,0	8	10,17	1,75
Karp	76,4	23	55,48	3,32
Płóć	1,2	11	0,87	0,11
Leszcz	10,8	17	7,84	0,64
Lin	5,5	10	3,99	0,55
Karaś pospolity	5,5	11	3,99	0,50
Karaś srebrzysty	24,3	49	17,66	0,50

Tabela 36. Jezioro Ciechomickie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
28	323	134,7	163	4,81	11,54	0,42

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	55,1	34	40,91	1,62
Sandacz	32,4	18	24,05	1,80
Okoń	5,0	17	3,71	0,29
Karp	18,6	13	13,81	1,43
Płóć	6,0	57	4,45	0,11
Leszcz	10,0	11	7,42	0,91
Lin	4,1	4	3,04	1,03
Karaś srebrzysty	2,7	5	2,02	0,54
Wzdreńga	0,8	4	0,59	0,20

Tabela 37. Jezioro Skrzyneckie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
25	153	126,7	404	5,07	6,12	0,83

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	14,5	6	11,44	2,42
Okoń	7,1	30	5,60	0,24
Karp	28,2	12	22,26	2,35
Płóć	41,4	319	32,68	0,13
Leszcz	10,0	7	7,89	1,43
Lin	17,5	18	13,81	0,97
Karaś srebrzysty	5,7	9	4,50	0,63
Wzdreńga	2,3	3	1,82	0,77

Tabela 38. Jezioro Grójeckie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
20	132	119,3	327	5,97	6,60	0,90

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	23,9	15	20,03	1,59
Sandacz	4,0	2	3,35	2,00
Okoń	2,9	6	2,43	0,48
Węgorz	3,7	3	3,10	1,23
Karp	2,5	1	2,10	2,50
Płoć	25,0	229	20,96	0,11
Leszcz	16,8	21	14,08	0,80
Lin	33,1	29	27,75	1,14
Karaś pospolity	1,4	1	1,17	1,40
Karaś srebrzysty	5,4	11	4,53	0,49
Wzdreęga	0,4	3	0,34	0,13
Ukleja	0,2	6	0,16	0,03

Tabela 39. Staw Talar

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
17	160	118,8	315	6,99	9,41	0,74

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	8,5	6	7,15	1,42
Sandacz	1,0	1	0,84	1,00
Okoń	0,3	1	0,25	0,30
Węgorz	1,5	1	1,26	1,50
Karp	64,3	42	54,13	1,53
Płoć	25,5	250	21,46	0,10
Leszcz	4,0	5	3,37	0,80
Lin	11,9	7	10,02	1,70
Jaź	1,8	2	1,52	0,90

Tabela 40. Jezioro Piasutno

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
14	100	117,3	355	8,38	7,14	1,17

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	22,5	17	19,18	1,32
Okoń	5,9	15	5,03	0,39
Karp	1,8	1	1,53	1,80
Płoć	42,8	243	36,49	0,18
Leszcz	20,2	45	17,22	0,45
Lin	22,6	20	19,27	1,13
Karaś srebrzysty	1,0	2	0,85	0,50
Ukleja	0,5	12	0,43	0,04

Tabela 41. Stawy w Parku Pruszków

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
25	276	113,2	243	4,53	11,04	0,41

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,5	1	2,21	2,50
Okoń	1,3	11	1,15	0,12
Karp	56,0	37	49,47	1,51
Płóć	10,9	102	9,63	0,11
Leszcz	3,5	6	3,09	0,58
Lin	18,4	19	16,25	0,97
Karaś srebrzysty	19,3	46	17,05	0,42
Krąp	0,3	2	0,27	0,15
Wzdreęga	0,8	10	0,71	0,08
Ukleja	0,2	9	0,17	0,02

Tabela 42. Jezioro Małszewskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
15	103	109,3	938	7,29	6,87	1,06

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	5,2	26	4,76	0,20
Płóć	75,1	823	68,72	0,09
Leszcz	21,6	40	19,76	0,54
Lin	1,0	2	0,91	0,50
Karaś pospolity	1,5	6	1,37	0,25
Wzdreęga	4,9	41	4,48	0,12

Tabela 43. Jezioro Lutoborskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
19	166	106,3	215	5,59	8,74	0,64

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	8,4	6	7,90	1,40
Okoń	4,0	18	3,76	0,22
Węgorz	5,4	6	5,08	0,90
Karp	1,0	1	0,94	1,00
Płóć	11,2	70	10,54	0,16
Leszcz	51,3	87	48,26	0,59
Lin	18,2	14	17,12	1,30
Karaś srebrzysty	6,8	13	6,40	0,52

Tabela 44. Rzeka Omulew nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
31	189	110,0	395	3,55	6,10	0,58

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	18,8	15	17,09	1,25
Okoń	16,8	103	15,27	0,16
Płóć	34,1	207	31,00	0,16
Leszcz	6,0	19	5,45	0,32
Lin	1,5	3	1,36	0,50
Karaś pospolity	16,5	27	15,00	0,61
Kleń	4,8	8	4,36	0,60
Jaź	11,1	11	10,09	1,01
Krąp	0,4	2	0,38	0,20

Tabela 45. Jezioro Machniacz

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
8	32	102,3	460	12,79	4,00	3,20

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	47,8	30	46,73	1,59
Okoń	7,2	45	7,04	0,16
Płoc	35,5	365	34,70	0,10
Leszcz	5,4	7	5,28	0,77
Lin	5,4	5	5,28	1,08
Karaś srebrzysty	1,0	8	0,97	0,13

Tabela 46. Skoki I

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
27	254	96,0	210	3,56	9,41	0,38

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	9,1	6	9,48	1,52
Sandacz	2,3	1	2,40	2,30
Okoń	8,0	38	8,33	0,21
Węgorz	0,9	1	0,94	0,90
Karp	2,5	2	2,60	1,25
Płoc	24,8	114	25,83	0,22
Leszcz	32,9	28	34,27	1,18
Karaś srebrzysty	13,6	9	14,17	1,51
Jaź	1,2	1	1,25	1,20
Wzdreęga	0,5	3	0,52	0,17
Ukleja	0,2	7	0,21	0,03

Tabela 47. Jeziórko Moczydło

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
42	372	94,2	130	2,24	8,86	0,25

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	11,7	6	12,42	1,95
Sandacz	2,1	1	2,23	2,10
Okoń	13,3	49	14,12	0,27
Boleń	1,4	1	1,49	1,40
Karp	46,6	26	49,47	1,79
Płoc	5,6	29	5,94	0,19
Lin	4,4	6	4,67	0,73
Karaś srebrzysty	3,3	6	3,50	0,55
Amur	4,3	1	4,56	4,30
Jaź	1,0	1	1,06	1,00
Krap	0,5	4	0,54	0,13

Tabela 48. Rzeka Brok nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
46	286	81,9	378	1,78	6,22	0,29

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	17,0	10	20,76	1,70
Okoń	19,8	97	24,18	0,20
Płoc	33,0	254	40,29	0,13
Leszcz	3,1	2	3,78	1,55
Lin	1,5	2	1,83	0,75
Karaś pospolity	1,0	3	1,22	0,33
Karaś srebrzysty	1,0	3	1,22	0,33
Kleń	0,5	1	0,61	0,50
Jaź	5,0	6	6,11	0,83

Tabela 49. Jezioro Wikaryjskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
33	137	80,6	343	2,45	4,15	0,59

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	17,8	12	22,08	1,48
Okoń	0,9	4	1,12	0,23
Węgorz	2,6	3	3,23	0,87
Karp	2,1	1	2,61	2,10
Płoc	15,8	271	19,60	0,06
Leszcz	28,3	37	35,11	0,76
Lin	11,8	9	14,64	1,31
Wzdreęga	1,3	6	1,61	0,22

Tabela 50. Jezioro Mierucie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
9	53	80,5	165	8,94	5,89	1,52

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	19,6	15	24,35	1,31
Okoń	3,4	7	4,22	0,49
Karp	7,6	7	9,44	1,09
Płoc	12,9	99	16,03	0,13
Leszcz	15,0	22	18,63	0,68
Lin	22,0	15	27,33	1,47

Tabela 51. Jezioro Małszewckie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
16	73	78,0	833	4,88	4,56	1,07

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	4,0	3	5,13	1,33
Okoń	4,5	39	5,77	0,12
Płoc	68,5	790	87,82	0,09
Leszcz	1,0	1	1,28	1,00

Tabela 52. Jezioro Borowiec (Wildno)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
14	127	77,5	304	5,54	9,07	0,61

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	23,0	19	29,68	1,21
Płoć	18,8	229	24,26	0,08
Leszcz	5,5	7	7,10	0,79
Lin	11,2	13	14,45	0,86
Karaś srebrzysty	18,5	32	23,86	0,58
Wzdreęga	0,5	4	0,65	0,13

Tabela 53. Jezioro Ostrowickie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
18	90	73,0	616	4,06	5,00	0,81

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,2	1	1,64	1,20
Karp	6,5	3	8,91	2,17
Płoć	42,9	514	58,77	0,08
Leszcz	1,5	2	2,05	0,75
Lin	8,9	9	12,19	0,99
Karaś srebrzysty	6,5	10	8,91	0,65
Wzdreęga	5,5	77	7,53	0,07

Tabela 54. Jezioro Burdąg

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
7	38	72,2	529	10,31	5,43	1,90

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	6,4	18	8,86	0,36
Płoć	44,0	457	60,94	0,10
Leszcz	10,4	12	14,41	0,87
Lin	6,4	7	8,86	0,91
Karaś pospolity	1,5	3	2,08	0,50
Krap	3,5	32	4,85	0,11

Tabela 55. Rzeka Utrata nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
47	287	68,6	250	1,46	6,11	0,24

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	12,6	6	18,37	2,10
Sum	3,0	1	4,37	3,00
Okoń	7,5	30	10,93	0,25
Płoć	11,8	126	17,20	0,09
Leszcz	10,0	16	14,58	0,63
Lin	2,7	3	3,94	0,90
Karaś srebrzysty	20,7	66	30,17	0,31
Krap	0,3	2	0,44	0,15

Tabela 56. Rzeka Jegrznia nr 11

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
15	57	68,1	335	4,54	3,80	1,19

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	27,5	16	40,38	1,72
Okoń	1,4	4	2,06	0,35
Płoć	23,2	252	34,07	0,09
Leszcz	5,9	6	8,66	0,98
Lin	4,2	3	6,17	1,40
Krap	2,4	17	3,52	0,14
Wzdreęga	3,5	37	5,14	0,09

Tabela 57. Jezioro Huta

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
17	123	66,9	279	3,94	7,24	0,54

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	8,9	6	13,30	1,48
Okoń	0,5	2	0,75	0,25
Węgorz	1,5	1	2,24	1,50
Płoć	31,5	242	47,09	0,13
Leszcz	18,5	23	27,65	0,80
Lin	6,0	5	8,97	1,20

Tabela 58. Jezioro Skrwilno

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
8	82	64,4	482	8,05	10,25	0,79

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	10,3	6	15,99	1,72
Karp	9,8	1	15,22	9,80
Płoć	30,4	470	47,20	0,06
Lin	2,0	3	3,11	0,67
Karaś srebrzysty	0,4	1	0,62	0,40
Amur	11,5	1	17,86	11,50

Tabela 59. Zbiornik Niewiadoma

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
15	120	63,3	228	4,22	8,00	0,53

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	4,5	1	7,11	4,50
Okoń	0,7	5	1,11	0,14
Karp	3,6	1	5,69	3,60
Płoć	26	175	41,07	0,15
Leszcz	2,4	2	3,79	1,20
Lin	20,9	18	33,02	1,16
Karaś srebrzysty	3,0	8	4,74	0,38
Wzdreęga	2,2	18	3,47	0,12

Tabela 60. Glinianki Borowe

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
9	59	62,7	70	6,97	6,56	1,06

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,0	2	3,19	1,00
Karp	49,0	21	78,15	2,33
Płoc	2,9	29	4,63	0,10
Lin	1,5	3	2,39	0,50
Karaś srebrzysty	7,3	15	11,64	0,49

Tabela 61. Jezioro Głębozec (na cieku bez nazwy)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	65	61,2	113	6,12	6,50	0,94

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	19,8	12	32,35	1,65
Okoń	0,5	1	0,82	0,50
Płoc	8,2	61	13,40	0,13
Leszcz	27,8	35	45,42	0,79
Lin	4,9	4	8,01	1,23

Tabela 62. Rzeka Zgłowiączka nr 2

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
11	61	59,4	438	5,40	5,55	0,97

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,8	4	9,76	1,45
Okoń	5,4	27	9,09	0,20
Płoc	36,5	363	61,45	0,10
Lin	2,2	4	3,71	0,55
Karaś srebrzysty	5,5	34	9,26	0,16
Jaź	4,0	6	6,73	0,67

Tabela 63. Glinianka Włochy

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
16	102	58,2	108	3,64	6,38	0,57

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,4	1	4,12	2,40
Karp	4,1	3	7,04	1,37
Płoc	3,1	22	5,33	0,14
Leszcz	26,0	32	44,67	0,81
Lin	19,7	18	33,85	1,09
Karaś srebrzysty	0,8	4	1,37	0,20
Wzdreęga	2,1	28	3,62	0,08

Tabela 64. Jezioro Telążyzna

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
8	51	57,3	116	7,16	6,38	1,12

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	39,9	25	69,63	1,60
Płoć	3,7	49	6,46	0,08
Lin	11,0	8	19,20	1,38
Karaś srebrzysty	0,7	1	1,22	0,70
Wzdreńga	2,0	33	3,49	0,06

Tabela 65. Jezioro Warchałdzkie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
13	63	56,9	143	4,38	4,85	0,90

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	31,0	25	54,48	1,24
Okoń	3,0	11	5,27	0,27
Węgorz	2,5	2	4,39	1,25
Płoć	9,1	84	15,99	0,11
Leszcz	4,8	14	8,44	0,34
Lin	6,4	6	11,25	1,07
Wzdreńga	0,1	1	0,18	0,10

Tabela 66. Jezioro Bytoń

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	77	47,2	178	4,72	7,70	0,61

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	24,5	18	51,91	1,36
Okoń	6,1	41	12,92	0,15
Karp	2,1	1	4,45	2,10
Płoć	5,1	43	10,81	0,12
Lin	1,5	1	3,18	1,50
Wzdreńga	7,9	74	16,73	0,11

Tabela 67. Jezioro Lubiechowo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	90	44,2	168	4,42	9,00	0,49

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,6	3	5,88	0,87
Okoń	4,1	20	9,28	0,21
Karp	1,5	1	3,39	1,50
Płoć	9,4	65	21,27	0,14
Lin	14,7	18	33,26	0,82
Karaś pospolity	1,1	3	2,48	0,37
Karaś srebrzysty	3,5	8	7,92	0,44
Wzdreńga	7,3	50	16,52	0,15

Tabela 68. Jezioro Sędańskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
12	35	41,9	587	3,49	2,92	1,20

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	6,0	6	14,32	1,00
Okoń	2,0	44	4,77	0,05
Płoc	19,0	296	45,35	0,06
Leszcz	3,7	19	8,83	0,19
Lin	2,0	4	4,77	0,50
Krap	5,7	43	13,61	0,13
Ukleja	3,5	175	8,35	0,02

Tabela 69. Czarne Gostynińskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	90	40,5	170	4,05	9,00	0,45

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	9,5	5	23,46	1,90
Okoń	0,5	1	1,23	0,50
Karp	5,7	4	14,07	1,43
Płoc	10,3	132	25,43	0,08
Leszcz	1,0	1	2,47	1,00
Lin	10,5	11	25,93	0,95
Karaś pospolity	0,7	2	1,73	0,35
Karaś srebrzysty	0,7	1	1,73	0,70
Krap	0,5	5	1,23	0,10
Wzdreęga	1,1	8	2,72	0,14

Tabela 70. Jezioro Chojno

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	25	37,4	205	9,35	6,25	1,50

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	8,3	7	22,19	1,19
Okoń	1,9	9	5,08	0,21
Płoc	12,6	171	33,69	0,07
Lin	14,6	18	39,04	0,81

Tabela 71. Czarne Włocławskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
13	138	36,7	164	2,82	10,62	0,27

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	4,0	1	10,90	4,00
Okoń	1,8	8	4,90	0,23
Karp	6,0	4	16,35	1,50
Płoc	9,5	120	25,89	0,08
Leszcz	7,4	12	20,16	0,62
Lin	1,9	4	5,18	0,48
Karaś srebrzysty	4,1	8	11,17	0,51
Krap	2,0	7	5,45	0,29

Tabela 72. Jezioro Karaśnia

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
11	61	36,2	138	3,29	5,55	0,59

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	6,2	4	17,13	1,55
Sandacz	3,0	1	8,29	3,00
Węgorz	5,3	4	14,64	1,33
Karp	3,3	2	9,12	1,65
Płoc	4,8	75	13,26	0,06
Leszcz	6,8	24	18,78	0,28
Lin	2,8	3	7,73	0,93
Krap	2,6	19	7,18	0,14
Wzdreęga	1,4	6	3,87	0,23

Tabela 73. Rzeka Orz nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
22	123	35,9	105	1,63	5,59	0,29

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	10,0	6	27,86	1,67
Okoń	1,3	6	3,62	0,22
Płoc	11,7	73	32,59	0,16
Leszcz	7,4	11	20,61	0,67
Lin	5,1	8	14,21	0,64
Karaś srebrzysty	0,4	1	1,11	0,40

Tabela 74. Jezioro Kępka Szlachecka

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
7	33	35,0	159	5,00	4,71	1,06

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,1	1	3,14	1,10
Okoń	2,5	17	7,14	0,15
Płoc	15,7	82	44,86	0,19
Leszcz	5,8	4	16,57	1,45
Lin	1,0	1	2,86	1,00
Krap	4,8	37	13,72	0,13
Wzdreęga	4,1	17	11,71	0,24

Tabela 75. Staw Montoprzem

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
8	65	34,5	119	4,31	8,13	0,53

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,0	2	5,80	1,00
Karp	13,8	7	40,00	1,97
Płoc	9,2	95	26,67	0,10
Leszcz	8,5	14	24,64	0,61
Lin	1,0	1	2,89	1,00

Tabela 76. Kocioł

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	20	34,5	68	11,50	6,67	1,73

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Karp	21,2	5	61,45	4,24
Płoć	4,8	54	13,91	0,09
Leszcz	7,5	8	21,74	0,94
Lin	1,0	1	2,90	1,00

Tabela 77. Młyński Staw

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	23	34,4	126	6,88	4,60	1,50

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	6,9	6	20,06	1,15
Okoń	10,4	58	30,23	0,18
Płoć	8,5	52	24,71	0,16
Lin	6,9	9	20,06	0,77
Wzdręga	1,7	3	4,94	0,57

Tabela 78. Jezioro Łuba

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
13	97	34,3	173	2,64	7,46	0,35

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	20,5	15	59,77	1,37
Okoń	3,6	24	10,50	0,15
Płoć	6,8	124	19,83	0,05
Leszcz	1,3	2	3,78	0,65
Lin	1,7	3	4,96	0,57
Wzdręga	0,4	5	1,16	0,08

Tabela 79. Basen Kolejniak

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
13	106	34,1	57	2,62	8,15	0,32

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Karp	24,3	15	71,26	1,62
Płoć	0,6	5	1,76	0,12
Lin	3,2	4	9,38	0,80
Karaś srebrzysty	6,0	33	17,60	0,18

Tabela 80. Jezioro Świesz

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	57	34,1	53	8,53	14,25	0,60

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Karp	23,8	8	69,79	2,98
Płoć	0,5	3	1,47	0,17
Leszcz	1,3	3	3,81	0,43
Karaś srebrzysty	8,5	39	24,93	0,22

Tabela 81. Jezioro Czarno-Czerskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	30	32,8	70	6,56	6,00	1,09

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	3,4	2	10,37	1,70
Okoń	2,5	8	7,62	0,31
Karp	1,8	1	5,49	1,80
Płoc	2,5	38	7,62	0,07
Leszcz	1,0	2	3,05	0,50
Lin	21,6	19	65,85	1,14

Tabela 82. Staw Kobylucha

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
14	53	31,1	143	2,22	3,79	0,59

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,4	2	7,72	1,20
Okoń	18,0	97	57,88	0,19
Karp	4,0	3	12,86	1,33
Płoc	4,1	35	13,18	0,12
Leszcz	2,1	5	6,75	0,42
Lin	0,5	1	1,61	0,50

Tabela 83. Jezioro Białobrzegi

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
6	53	29,3	139	4,88	8,83	0,55

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	4,7	3	16,04	1,57
Okoń	2,0	22	6,83	0,09
Płoc	8,8	77	30,03	0,11
Leszcz	8,5	9	29,01	0,94
Lin	3,1	4	10,58	0,78
Karaś pospolity	1,0	1	3,41	1,00
Ukleja	1,2	23	4,10	0,05

Tabela 84. Jezioro Nożyce

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
13	30	27,0	65	2,08	2,31	0,90

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	0,9	1	3,33	0,90
Okoń	1,0	5	3,71	0,20
Płoc	10,1	44	37,41	0,23
Leszcz	10,0	4	37,04	2,50
Lin	1,0	1	3,70	1,00
Wzdreęga	4,0	10	14,81	0,40

Tabela 85. Jezioro Brzeźno

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
9	52	26,2	100	2,91	5,78	0,50

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	9,1	6	34,73	1,52
Okoń	4,3	31	16,41	0,14
Płoć	6,5	53	24,81	0,12
Leszcz	2,1	3	8,02	0,70
Lin	2,6	4	9,92	0,65
Karaś srebrzysty	1,6	3	6,11	0,53

Tabela 86. Rzeka Świder nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	117	24,7	192	2,47	11,70	0,21

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,0	2	8,10	1,00
Karp	0,9	1	3,64	0,90
Płoć	10,4	151	42,11	0,07
Leszcz	10,9	37	44,13	0,29
Kleń	0,5	1	2,02	0,50

Tabela 87. Jezioro Rekowe

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
12	39	24,5	109	2,04	3,25	0,63

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,5	1	6,12	1,50
Sandacz	1,2	1	4,90	1,20
Okoń	3,2	15	13,06	0,21
Płoć	8,6	70	35,10	0,12
Leszcz	9,5	15	38,78	0,63
Krap	0,5	7	2,04	0,07

Tabela 88. Jezioro Okonin

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
11	48	24,4	149	2,22	4,36	0,51

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,5	1	6,15	1,50
Węgorz	0,7	1	2,87	0,70
Płoć	8,9	133	36,47	0,07
Leszcz	6,4	7	26,23	0,91
Lin	6,9	7	28,28	0,99

Tabela 89. Czarne Baruchowo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	16	23,1	30	5,78	4,00	1,44

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	8,0	2	34,63	4,00
Okoń	5,8	13	25,12	0,45
Leszcz	7,0	5	30,30	1,40
Lin	0,5	1	2,16	0,50
Krąp	1,8	9	7,79	0,20

Tabela 90. Jezioro Grom

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	32	22,9	141	2,29	3,20	0,72

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,2	4	22,71	1,30
Okoń	6,3	25	27,51	0,25
Płoć	11,4	112	49,78	0,10

Tabela 91. Służewo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
7	41	22,7	121	3,24	5,86	0,55

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,3	1	10,13	2,30
Karp	2,0	1	8,81	2,00
Płoć	7,7	105	33,93	0,07
Lin	6,4	7	28,19	0,91
Karaś srebrzysty	4,3	7	18,94	0,61

Tabela 92. Jezioro Szczutkowskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	5	20,8	17	6,93	1,67	4,16

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	6,0	2	28,85	3,00
Leszcz	11,7	11	56,25	1,06
Karaś srebrzysty	3,1	4	14,90	0,78

Tabela 93. Jezioro Rybnica

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
8	27	19,5	213	2,44	3,38	0,72

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Karp	4,9	2	25,13	2,45
Płoć	12,0	188	61,54	0,06
Lin	0,7	1	3,59	0,70
Wzdreęga	1,1	6	5,64	0,18
Ukleja	0,8	16	4,10	0,05

Tabela 94. Jezioro Radziszewo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	30	19,3	26	3,86	6,00	0,64

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	8,1	6	41,97	1,35
Okoń	0,5	2	2,58	0,25
Płoć	0,8	6	4,15	0,13
Lin	9,9	12	51,30	0,83

Tabela 95. Rzeka Biebrza nr 3 (Wissa)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	15	18,4	78	6,13	5,00	1,23

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	9,8	9	53,26	1,09
Okoń	1,5	10	8,15	0,15
Płoć	7,1	59	38,59	0,12

Tabela 96. Sierpienica

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	44	18,1	34	4,53	11,00	0,41

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	14,4	12	79,56	1,20
Okoń	1,3	6	7,18	0,22
Płoć	2,4	16	13,26	0,15

Tabela 97. Jezioro Płociczno

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	12	16,2	95	5,40	4,00	1,35

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	9,0	5	55,56	1,80
Płoć	7,2	90	44,44	0,08

Tabela 98. Jezioro Peł

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	13	14,1	279	3,53	3,25	1,08

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	0,7	1	4,96	0,70
Okoń	0,5	14	3,55	0,04
Płoć	12,1	262	85,82	0,05
Lin	0,8	2	5,67	0,40

Tabela 99. Jezioro Klimek (Konik)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	25	13,9	44	1,39	2,50	0,56

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,8	1	12,95	1,80
Sandacz	0,8	1	5,76	0,80
Okoń	3,0	9	21,58	0,33
Płoc	5,8	28	41,73	0,21
Leszcz	2,5	5	17,98	0,50

Tabela 100. Glinianki Szczęśliwickie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
9	62	13,9	23	1,54	6,89	0,22

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	3,2	7	23,02	0,46
Karp	5,6	4	40,29	1,40
Płoc	2,6	10	18,70	0,26
Lin	0,5	1	3,60	0,50
Sterlet	2,0	1	14,39	2,00

Tabela 101. Jezioro Czerskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
6	44	11,2	12	1,87	7,33	0,25

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,4	1	12,50	1,40
Leszcz	6,3	6	56,25	1,05
Lin	3,5	5	31,25	0,70

Tabela 102. Radzynek (Paproty)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	9	10,8	18	3,60	3,00	1,20

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,0	3	46,30	1,67
Płoc	1,0	10	9,26	0,10
Lin	3,8	4	35,18	0,95
Karaś pospolity	1,0	1	9,26	1,00

Tabela 103. Jezioro Jasne

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	5	9,7	7	4,85	2,50	1,94

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	9,7	7	100,00	1,39

Tabela 104. Staw Kozioł Wincenta

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	8	9,6	32	9,60	8,00	1,20

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	0,6	2	6,25	0,30
Karp	5,2	5	54,17	1,04
Płoć	1,3	15	13,54	0,09
Lin	1,1	2	11,46	0,55
Karaś pospolity	1,4	8	14,58	0,18

Tabela 105. Jezioro Zielonka

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	5	9,4	10	3,13	1,67	1,88

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,5	1	15,96	1,50
Płoć	3,7	4	39,35	0,93
Lin	2,5	3	26,60	0,83
Karaś pospolity	1,7	2	18,09	0,85

Tabela 106. Jezioro Łąki Zawistowe

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	16	8,9	33	2,97	5,33	0,56

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Płoć	1,0	11	11,23	0,09
Leszcz	1,0	1	11,24	1,00
Lin	4,4	7	49,44	0,63
Karaś srebrzysty	2,5	14	28,09	0,18

Tabela 107. Jezioro Średnie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	17	8,7	81	4,35	8,50	0,51

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,4	2	27,59	1,20
Płoć	6,3	79	72,41	0,08

Tabela 108. Tążyna

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	3	8,7	8	4,35	1,50	2,90

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	7,0	6	80,46	1,17
Jaź	1,7	2	19,54	0,85

Tabela 109. Staw Wielgie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	5	8,7	7	4,35	2,50	1,74

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	2,6	2	29,89	1,30
Lin	6,1	5	70,11	1,22

Tabela 110. Jezioro Lemańskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	7	7,2	25	2,40	2,33	1,03

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,5	1	20,83	1,50
Okoń	0,5	2	6,94	0,25
Płoć	2,9	15	40,29	0,19
Karaś pospolity	2,3	7	31,94	0,33

Tabela 111. Basen Brwinów

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	51	7,1	5	1,42	10,20	0,14

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	1,4	1	19,72	1,40
Karp	3,7	2	52,11	1,85
Leszcz	2,0	2	28,17	1,00

Tabela 112. Mołtawa nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	6	6,9	19	6,90	6,00	1,15

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Płoć	1,1	6	15,94	0,18
Lin	4,3	6	62,32	0,72
Kleń	0,6	2	8,70	0,30
Wzdreğa	0,9	5	13,04	0,18

Tabela 113. Jezioro Kamionkowskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
8	80	6,1	6	0,76	10,00	0,08

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	3,1	2	50,82	1,55
Sandacz	2,2	2	36,07	1,10
Okoń	0,3	1	4,92	0,30
Leszcz	0,5	1	8,19	0,50

Tabela 114. Jezioro Widoń

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	4	5,5	3	2,75	2,00	1,38

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,5	3	100,00	1,83

Tabela 115. Jezioro Łażnica

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	1	5,0	17	3,97	2,33	1,70

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Karaś srebrzysty	5,0	17	100,00	0,29

Tabela 116. Wymysłów

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	9	4,9	2	0,98	1,80	0,54
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Szczupak		3,0	1	61,22	3,00	
Karp		1,9	1	38,78	1,90	

Tabela 117. Jezioro Trzebowo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	14	3,0	32	1,50	7,00	0,21
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Okoń		3,0	32	100,00	0,09	

Tabela 118. Jezioro Głębocek (w obw. J. Rekowe)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	5	3,0	21	1,00	1,67	0,60
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Okoń		1,3	3	43,33	0,43	
Płoc		1,5	16	50,00	0,09	
Krap		0,2	2	6,67	0,10	

Tabela 119. Jezioro Fręcki

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	6	2,5	2	0,63	1,50	0,42
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Lin		2,5	2	100,00	1,25	

Tabela 120. Jezioro Natać

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	1	1,5	21	1,50	1,00	1,50
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Płoc		1,5	21	100,00	0,07	

Tabela 121. Staw Ruda

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	11	1,2	6	1,20	11,00	0,11
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Okoń		1,2	6	100,00	0,20	

Tabela 122. Zbiornik Rogal

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	4	1,1	1	1,10	4,00	0,28
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Lin		1,1	1	100,00	1,10	

Tabela 123. Szkwa nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	6	0,0	0	0,00	1,50	0,00

Tabela 124. Jezioro Borówko

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	4	0,0	0	0,00	1,33	0,00

Tabela 125. Glinianka Bagienice

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	2	0,0	0	0,00	1,00	0,00

Tabela 126. Jezioro Czerniakowskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	1	0,0	0	0,00	1,00	0,00

Tabela 127. Stawy Skaryszewskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	8	0,0	0	0,00	4,00	0,00

Tabela 128. Łacha Józefów

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
9	30	0,0	0	0,00	3,33	0,00

Tabela 129. Staw Jedwabne

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	3	0,0	0	0,00	3,00	0,00